

STEPHEN HAWKING

DAS
UNIVERSUM
IN DER
NUßSCHALE



HOFFMANN UND CAMPE

STEPHEN HAWKING

**DAS UNIVERSUM
IN DER NUßSCHALE**

**AUS DEM ENGLISCHEN VON HAINER KOBER
FACHLICHE BERATUNG MARKUS PÖSSEL**

HOFFMANN UND CAMPE

INHALT

VORWORT 7

KAPITEL 1 - SEITE 11

EINE KURZE GESCHICHTE DER RELATIVITÄTSTHEORIE

Wie Einstein die Grundlagen für die beiden fundamentalen Theorien des 20. Jahrhunderts schuf - die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantentheorie



KAPITEL 2 - SEITE 37

DIE FORM DER ZEIT

Einsteins allgemeine Relativitätstheorie verlieh der Zeit eine Form. Wie sich das mit der Quantentheorie vereinbaren läßt



KAPITEL 3 - SEITE 75

DAS UNIVERSUM IN EINER NUSSCHALE

Das Universum hat viele Geschichten, von denen jede durch eine winzige Nuß bestimmt wird.



KAPITEL 4 - SEITE 109

DIE ZUKUNFT VORHERSAGEN

Wie der Informationsverlust in Schwarzen Löchern unsere Fähigkeit beeinträchtigen könnte, die Zukunft vorherzusagen



KAPITEL 5 - SEITE 139

DIE VERGANGENHEIT SCHÜTZEN

Sind Zeitreisen möglich? Könnte eine fortgeschrittene Zivilisation in die Vergangenheit reisen und sie verändern?



KAPITEL 6 - SEITE 163

UNSERE ZUKUNFT: STAR TREK ODER NICHT?


Wie sich biologisches und elektronisches Leben in immer schnellerem Tempo zu wachsender Komplexität entfaltet



KAPITEL 7 - SEITE 181

SCHÖNE NEUE BRANWELT

Leben wir auf einer Bran, oder sind wir einfach Hologramme?



ANHANG 210

Glossar

Zum Lesen empfohlen

Abbildungsnachweis


Register





Stephen Hawking 2001

© Stewart Cohen



VORWORT

Nie hätte ich damit gerechnet, dass mein populärwissenschaftliches Buch *Eine kurze Geschichte der Zeit* ein solcher Erfolg werden würde. Mehr als vier Jahre stand es auf der Bestsellerliste der Londoner *Sunday Times*, länger als irgendein anderes Buch, was für ein Werk, das sich mit Wissenschaft befaßt und nicht gerade zur leichten Kost zählt, recht bemerkenswert ist. Danach bin ich ständig gefragt worden, wann ich eine Fortsetzung zu schreiben gedächte. Das habe ich immer abgelehnt, weil ich keine Lust hatte, einen *Sohn der kurzen Geschichte* oder *Eine etwas längere kurze Geschichte der Zeit* zu schreiben. Doch im Laufe der Jahre kam mir ein Buch anderer Art in den Sinn, eines, das leichter zu verstehen ist. Die *Kurze Geschichte* war linear konzipiert, die meisten Kapitel bauten logisch auf den vorangehenden auf. Einigen Lesern gefiel das, aber andere blieben in den ersten Kapiteln stecken und kamen nie zu den interessanten Dingen, die in den späteren folgen. Im Gegensatz dazu gleicht das neue Buch in seinem Aufbau eher einem Baum: Die Kapitel 1 und 2 bilden den Stamm, von dem die anderen Kapitel abzweigen.

Die Äste sind ziemlich unabhängig voneinander und können nach dem zentralen Stamm in beliebiger Reihenfolge gelesen werden. Sie behandeln Gebiete, über die ich seit der Veröffentlichung der *Kurzen Geschichte* gearbeitet oder nachgedacht habe. So zeichnen sie ein Bild von einigen der aktivsten Felder gegenwärtiger Forschung. Auch innerhalb der Kapitel habe ich eine eingleisige, lineare Struktur zu vermeiden versucht. Die Abbildungen mit ihren Erläuterungen eröffnen einen alternativen Zugang zum Text, ähnlich wie in der 1996 erschienenen *Illustrierten Kurzen Geschichte der Zeit*, während die Kästen und Einschübe Gelegenheit bieten, bestimmte Themen etwas ausführlicher zu behandeln als im Haupttext.

Als *Eine kurze Geschichte der Zeit* 1988 erstmals veröffentlicht wurde, schien sich die Weltformel, eine »Theorie für Alles«, am Horizont abzu-




zeichnen. Wie hat sich die Situation seither verändert? Sind wir unserem Ziel nähergekommen? Wie ich in diesem Buch erläutern werde, haben wir inzwischen große Fortschritte gemacht. Aber die Reise dauert noch an, und ein Ende ist nicht abzusehen. Man sagt, es sei besser, voller Hoffnung zu reisen als anzukommen. Unser Forschungsdrang beflügelt die Kreativität auf allen Gebieten, nicht nur in der Wissenschaft. Sollte es uns wirklich gelingen, den Bereich des Erforschbaren ganz zu durchmessen, würde der menschliche Geist verkümmern und sterben. Aber ich glaube nicht, daß es jemals Stillstand geben wird: Wenn nicht an Tiefe, so werden wir an Komplexität gewinnen und uns immer von einem expandierenden Horizont des Möglichen umgeben sehen.

Ich möchte dem Leser einen Eindruck von der Faszination der Entdeckungen verschaffen, die gegenwärtig gemacht werden, und von dem Bild der Wirklichkeit, das sich herauszukristallisieren beginnt. Damit das Gefühl der Unmittelbarkeit stärker zum Tragen kommt, konzentriere ich mich dabei auf Bereiche, in denen ich selbst gearbeitet habe. Die Einzelheiten dieser Arbeit sind sehr wissenschaftlich, doch ich glaube, die Ideen lassen sich in ihren Grundzügen ohne großen mathematischen Ballast mitteilen. Ich hoffe, es ist mir gelungen.

Ich hatte viel Hilfe bei diesem Buch. Mein Dank gilt insbesondere Thomas Hertog und Neel Shearer, die mich bei den Abbildungen, Beschriftungen und Kästen unterstützten, Ann Harris und Kitty Ferguson, die das Manuskript überarbeiteten (genauer: die Computerdateien, denn alles, was ich schreibe, ist elektronisch), und Philip Dünn von Book Laboratory und Moonrunner Design, die die Abbildungen kreierten. Darüber hinaus möchte ich jedoch all den Menschen danken, die es mir ermöglicht haben, ein weitgehend normales Leben zu führen und meine wissenschaftliche Tätigkeit fortzusetzen. Ohne sie hätte dieses Buch nicht geschrieben werden können.

Stephen Hawking
Cambridge, 2. Mai 2001



KAPITEL 1

EINE KURZE GESCHICHTE DER RELATIVITÄTSTHEORIE

*Wie Einstein die Grundlagen für die beiden fundamentalen Theorien
des 20. Jahrhunderts schuf- die allgemeine Relativitätstheorie
und die Quantentheorie*

Portrait Einstein




LOW

A. Einstein

Albert Einstein, der Begründer der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie, wurde 1879 in Ulm geboren, aber schon im Jahr darauf zog die Familie nach München, wo der Vater Hermann und der Onkel Jakob eine kleine, nicht sehr erfolgreiche »Electrotechnische Fabrik« gründeten. Albert war kein Wunderkind, aber die Behauptung, er sei ein schlechter Schüler gewesen, ist sicherlich übertrieben. 1894 geriet die väterliche Firma in die roten Zahlen, und die Familie zog nach Mailand, um ein neues Unternehmen aufzubauen. Auf Wunsch seiner Eltern blieb er in München, um die Schule zu beenden, aber sie war ihm zu autoritär. Daher verließ er sie nach wenigen Monaten ohne Abschluß und reiste der Familie hinterher. Später erwarb er an der Kantonsschule Aarau in der Schweiz die Hochschulreife, nahm dann das Studium am angesehenen Zürcher Polytechnikum - später umbenannt in Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) - auf und schloß es im Jahr 1900 ab. Sein Eigensinn und die Abneigung gegen jede Form von Autorität machten ihn bei den Professoren des Polytechnikums nicht gerade beliebt, und keiner von ihnen bot ihm einen Assistentenposten an, der im Regelfall den Zugang zur akademischen Laufbahn eröffnete. Zwei Jahre später trat er schließlich dank der Vermittlung eines Freundes eine bescheidene Stellung am Schweizerischen Patentamt in Bern an. Während er diesen Posten innehatte, schrieb er im Jahr 1905 drei Arbeiten, mit denen er sich einerseits als einer der bedeutendsten Wissenschaftler der Welt auswies und andererseits zwei theoretische Revolutionen auslöste - Revolutionen, die unser Verständnis von Zeit, Raum und Wirklichkeit grundlegend verändert haben.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts glaubten die Naturwissenschaftler, eine vollständige Beschreibung des Universums sei zum Greifen nah. Nach ihrer Vorstellung war der Raum mit einem kontinuierlichen Medium, dem »Äther«, angefüllt. Lichtstrahlen und die gerade entdeckten Radiowellen, so dachte man, seien Wellen in diesem Äther, so wie der Schallübertragung Druckwellen in der Luft zugrunde liegen. Um zu einer vollständigen Theorie zu gelangen, schien nur noch als letzter Schritt erforderlich zu sein, die elastischen Eigenschaften des Äthers sorgfältig zu messen. In Erwartung solcher Messungen wurde beispielsweise das Jefferson-Laboratorium an der Harvard University ganz ohne Eisennägel erbaut, um die empfindlichen magnetischen Messungen nicht zu beeinträchtigen. Allerdings vergaßen die Planer, daß die rotbraunen Ziegelsteine, aus denen das Labor und der größte Teil Harvards bestehen, gro-



Albert Einstein 1920



(Abb. 1.1, oben)
THEORIE DES LICHTÄTHERS
 Wäre Licht eine Welle in einem elastischen Stoff, dem Äther, müßte die Lichtgeschwindigkeit jemandem in einem Raumschiff A, das sich auf das Licht zu bewegt, höher erscheinen als einem Beobachter in einem Raumschiff B, das sich in die gleiche Richtung bewegt wie das Licht.


(Abb. 1.2, gegenüber)
 Man entdeckte keinen Unterschied zwischen der Lichtgeschwindigkeit in Richtung der Erdbahn und in einer Richtung senkrecht dazu.


große Mengen an Eisen enthalten. Das Gebäude wird heute noch benutzt, obwohl sich die Universitätsverwaltung nach wie vor nicht ganz sicher ist, wie viele Bücher ein Bibliotheksfußboden ohne Eisennägel tragen kann.

Kurz vor der Jahrhundertwende traten die Unstimmigkeiten, die der Idee eines alles durchdringenden Äthers innewohnten, allmählich zutage. Man erwartete, daß sich das Licht mit konstanter Geschwindigkeit im Äther ausbreite, daß jedoch seine Bewegung einem Beobachter, der in der gleichen Richtung wie das Licht durch den Äther reiste, langsamer erscheinen müßte, während sie einem Beobachter, der dem Licht entgegen reiste, höher erschiene (Abb. 1.1).

Doch zahlreiche Experimente, die diese Auffassung bestätigen sollten, blieben ohne Erfolg. Die sorgfältigsten und genauesten Messungen führten 1887 Albert Michelson und Edward Morley von der Gase School of Applied Science in Cleveland, Ohio, durch. Sie verglichen die Lichtgeschwindigkeit in zwei Strahlen, die rechtwinklig zueinander verliefen. Während sich die Erde zum einen um ihre Achse drehte und sie zum anderen die Sonne umkreiste, hätte sich die Meßapparatur mit wechselnder Geschwindigkeit und Orientierung durch den Äther bewegen müssen (Abb. 1.2). Doch Michelson und Morley fanden weder tägliche noch jährliche Unterschiede zwischen den beiden Lichtstrahlen. Es war, als breitete sich das Licht relativ zum Beobachter - wie schnell und in welcher Richtung auch immer er sich bewegte - stets mit der gleichen Geschwindigkeit aus (Abb. 1.3, S. 16).

Aufgrund des Michelson-Morley-Experiments gelangten der irische Physiker George FitzGerald und der holländische Physiker Hendrik Lorentz zu dem Schluß, bei der Bewegung durch den Äther verkürzten sich materielle Körper, und Uhren gingen langsamer. Dabei seien Kontrakti-







(Abb. 1.3) MESSUNG VON UNTERSCHIEDEN IN DER LICHTGESCHWINDIGKEIT

Im Michelson-Morley-Interferometer wird das Licht einer Quelle durch eine halbverspiegelte Glasscheibe in zwei Strahlen aufgeteilt. Das Licht der beiden Strahlen bewegt sich recht winklig zueinander und wird am Ende wieder zu einem einzigen Strahl vereinigt, indem es abermals zu der halbverspiegelten Scheibe gelenkt wird. Je nach Strahllänge und nach der Lichtgeschwindigkeit in den beiden Strahlen überlagern sich diese in unterschiedlicher Weise: Trifft Wellenberg auf Wellenberg, verstärken sich die Wellen gegenseitig, trifft Wellenberg auf Wellental, löschen sich die Teilstrahlen aus. Veränderungen, etwa der Übergang von Auslöschung zu Verstärkung, lassen sich beobachten und zeigen an, wenn die relative Lichtgeschwindigkeit in den Teilstrahlen variiert.

Rechts: Diagramm des Experiments nach der Abbildung, die 1887 im Scientific American erschien.



Auf der Uhr im Flugzeug, das nach Westen fliegt, verstreicht mehr Zeit als auf ihrem Zwillingsspendant, das in die entgegengesetzte Richtung fliegt.


Die Zeit für die Passagiere in dem Flugzeug, das nach Osten fliegt, ist kürzer als für die Passagiere der Richtung Westen fliegenden Maschine.

on und Uhrenverlangsamung so beschaffen, daß alle Beobachter die gleiche Lichtgeschwindigkeit mäßen, egal, wie sie sich relativ zum Äther bewegten. (FitzGerald und Lorentz hielten den Äther noch immer für eine reale Substanz.) Doch in einem Aufsatz vom Juni 1905 schrieb Einstein, der Begriff des Äthers erübrige sich, wenn man überhaupt nicht feststellen könne, ob man sich durch den Raum bewege oder nicht. Statt dessen ging er von dem Postulat aus, dem zufolge die Naturgesetze allen Beobachtern in freier Bewegung gleich erscheinen müßten. Insbesondere müßten sie alle die gleiche Lichtgeschwindigkeit messen, egal, wie rasch sie sich bewegten. Die Lichtgeschwindigkeit sei unabhängig von der Bewegung der Beobachter und von der Ausbreitungsrichtung des Lichts stets dieselbe.

Das bedeutete allerdings den Verzicht auf die Vorstellung, es gäbe eine universelle Größe namens Zeit, die von allen Uhren in gleicher Weise gemessen würde. Statt dessen hätte jedermann seine eigene Zeit. Übereinstimmen würden die Zeiten zweier Menschen, wenn sich diese relativ zueinander in Ruhe befänden, nicht aber, wenn sie in relativer Bewegung wären.


Dieses Phänomen konnte in zahlreichen Experimenten nachgewiesen werden, etwa indem man zwei genau gehende Uhren in entgegengesetzter Richtung um die Erde flog, die bei der Landung der Maschinen leicht unterschiedliche Zeiten anzeigten (Abb. 1.4). Dieser Umstand könnte

(Abb. 1.4) Eine Version des Zwillingsproblems (vgl. auch Abb. 1.5, S. 18) wurde experimentell überprüft, indem man zwei genau gehende Uhren in entgegengesetzter Richtung um die Erde fliegen ließ. Als sie sich wieder begegneten, zeigte die Uhr, die nach Westen geflogen war, etwas weniger Zeit an.



(Abb. 1.5, links)
DAS ZWILLINGSPROBLEM
 In der Relativitätstheorie hat jeder Beobachter sein eigenes Zeitmaß. Das kann zum sogenannten Zwillingsproblem führen.
 Ein Zwilling A bricht zu einer Raumfahrt auf, in deren Verlauf er fast Lichtgeschwindigkeit erreicht (c), während der andere Zwilling B auf der Erde bleibt.
 Infolge der Bewegung des Raumschiffs verstreicht die Zeit in ihm langsamer als für den auf der Erde gebliebenen Bruder.
 Daher stellt der Raumreisende (A2) bei seiner Rückkehr fest, daß sein Bruder (B2) in höherem Maße als er selbst gealtert ist.
 Obwohl es dem gesunden Menschenverstand zu widersprechen scheint, lassen zahlreiche Experimente darauf schließen, daß in diesem Szenario der reisende Zwilling tatsächlich jünger wäre als der daheimgebliebene.

(Abb. 1.6, rechts)
 Ein Raumschiff fliegt von links nach rechts mit vier Fünftel der Lichtgeschwindigkeit vorbei. Ein Lichtimpuls wird an einem Ende der Kabine emittiert und zum anderen Ende reflektiert (a).
 Das Licht wird von Menschen auf der Erde und im Raumschiff beobachtet. Infolge der Bewegung des Raumschiffs erzielen sie hinsichtlich der Entfernung, die das reflektierte Licht zurückgelegt hat, keine Einigung (b). Sie müssen dann auch unterschiedlicher Meinung darüber sein, wieviel Zeit das Licht gebraucht hat - wenn wir Einsteins Postulat zugrunde legen, daß die Lichtgeschwindigkeit für alle frei bewegten Beobachter gleich ist.



einen klugen Menschen auf die Idee bringen, er sollte, um länger zu leben, den Rest seiner Tage in stetem Flug gen Osten verbringen, so daß sich die Flugzeuggeschwindigkeit und die Erdrotation addierten. Allerdings würde der winzige Sekundenbruchteil Lebenszeit, den er gewönne, mehr als wettgemacht durch den Verzehr des Essens, das die Fluggesellschaften servieren.

Einsteins Postulat, wonach die Naturgesetze allen Beobachtern in freier Bewegung gleich erscheinen, bildete die Grundlage der Relativitätstheorie, die ihren Namen dem Umstand verdankt, daß ihr zufolge nur relative Bewegung von Bedeutung ist (Abb. 1.6). Ihre Schönheit und Einfachheit überzeugten viele Wissenschaftler, aber sie stieß auch auf allerlei Widerstände. Einstein hatte zwei »Absolute« des 19. Jahrhunderts entthront: die absolute Ruhe, die der Äther verkörpert, und die absolute oder universelle Zeit, die von allen Uhren in gleicher Weise gemessen wird. Viele Menschen fanden die Vorstellung beunruhigend: Bedeute dies, so fragten sie, daß alles relativ sei, daß es nun auch keine absoluten moralischen Maßstäbe mehr gebe? Dieses Unbehagen hielt bis in die zwanziger und dreißiger Jahre an. Als Einstein 1921 mit dem Nobelpreis geehrt wurde, erhielt er ihn für eine wichtige, aber



(Abb. 1.7)

nach seiner eigenen Einschätzung weniger bedeutende Arbeit, die er ebenfalls 1905 verfaßt hatte. In der Begründung wurde die als zu kontrovers geltende Relativitätstheorie nicht einmal erwähnt. (Noch immer bekomme ich zwei bis drei Briefe pro Woche, in denen ich darüber aufgeklärt werde, daß sich Einstein geirrt hat.) Heute findet die Relativitätstheorie allerdings rückhaltlose Zustimmung in der Gemeinschaft der Wissenschaftler, denn die aus ihr abgeleiteten Vorhersagen haben sich in zahllosen Experimenten und Anwendungen bestätigt.

Eine sehr wichtige Konsequenz der Relativitätstheorie ist die Beziehung zwischen Masse und Energie. Aus Einsteins Postulat, dem zufolge die Lichtgeschwindigkeit jedem Beobachter gleich erscheinen sollte, ergibt sich bei genauerer Betrachtung der Schluß, daß nichts schneller als das Licht sein kann. Wenn man Energie aufwendet, um irgend etwas - sei es ein Teilchen oder ein Raumschiff - zu beschleunigen, so wächst seine Masse an, was die weitere Beschleunigung erschwert. Das Teilchen auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen ist unmöglich, weil dazu eine unendliche Energiemenge erforderlich wäre. Masse und Energie sind äquivalent - so der Inhalt von Einsteins berühmter Gleichung $E = mc^2$ (Abb. 1.7). Dies ist wahrscheinlich die einzige physikalische Gleichung, der man auf der Straße begegnen kann. Zu ihren Konsequenzen gehörte die Erkenntnis, daß eine ungeheure Energiemenge freigesetzt wird,



AUS EINSTEINS
PROPHETISCHEN BRIEF AN
PRÄSIDENT ROOSEVELT AUS
DEM JAHR 1939


»Im Verlauf der letzten vier Monate wurde es wahrscheinlich - durch die Arbeiten von Joliot in Frankreich und von Fermi und Szilard in den Vereinigten Staaten -, daß es möglich werden könnte, nukleare Kettenreaktionen in einer großen Menge Uran auszulösen, wodurch gewaltige Energiemengen und große Quantitäten neuer radiumähnlicher Elemente erzeugt werden. Es scheint jetzt fast sicher, daß dies in der unmittelbaren Zukunft erreicht werden könnte. Das neue Phänomen würde auch zum Bau von Bomben führen, und es ist vorstellbar - obwohl sehr viel weniger gewiß -, daß extrem starke Bomben eines neuen Typs auf diesem Wege konstruiert werden können.«

wenn sich der Kern eines Uranatoms in zwei Kerne mit etwas geringerer Gesamtmasse aufspaltet (vgl. Abb. 1.8, Seite 22/23).

Als sich 1939 ein neuer Weltkrieg abzeichnete, überredete eine Gruppe von Wissenschaftlern, die diese Implikationen erkannt hatten, Einstein, seine pazifistischen Skrupel zu überwinden und einen Brief an Präsident Roosevelt zu unterzeichnen, in dem die Vereinigten Staaten aufgefordert wurden, ein Kernforschungsprogramm ins Leben zu rufen.

Diese Intervention führte zum Manhattan Project und letztlich zu den Bomben, die 1945 über Hiroshima und Nagasaki explodierten. Manche haben Einstein für die Atombombe verantwortlich gemacht, weil er die Beziehung zwischen Masse und Energie entdeckt hat; doch das ist so, als würde man Newton vorwerfen, er sei für Flugzeugabstürze verantwortlich, weil er die Gravitation entdeckt hat. Einstein hat sich nicht am Manhattan Project beteiligt und war über den Einsatz der Bombe entsetzt.

Die bahnbrechenden Arbeiten des Jahres 1905 hatten zwar Einsteins wissenschaftlichen Ruf begründet, doch erst 1909 wurde ihm ein Posten an der Universität Zürich angeboten, der es ihm ermöglichte, das Schweizer Patentamt zu verlassen. Zwei Jahre später ging er an die Deutsche Universität in Prag, kehrte aber 1912 nach Zürich zurück, diesmal an die ETH. Trotz des Antisemitismus, der in weiten Teilen Europas herrschte, auch an den Universitäten, war er jetzt ein




(Abb. 1.8) **NUKLEARE BINDUNGSENERGIE** Kerne bestehen aus Protonen und Neutronen. Doch die Masse eines Kerns ist stets geringer als die Summe der individuellen Massen seiner Protonen und Neutronen. Diese Massendifferenz Δm geht auf die Bindungsenergie zurück, die den Kern zusammenhält; gemäß Einsteins berühmter Formel ist die Bindungsenergie gleich Δmc^2 . Sie kann für unterschiedliche Kerne unterschiedlich groß sein; die Bindungsenergien der am Spaltungsprozeß beteiligten Kerne sind gerade dergestalt, daß die Masse des Einzelkerns vor der Spaltung größer ist als die Summe der Massen der Teilkerne danach. Durch die Entfesselung dieser Massendifferenz in Form von Energie wird die verheerende Explosivkraft der Kernwaffen erzeugt.

sehr gefragter Wissenschaftler. Angebote kamen aus Wien und Utrecht, doch er entschied sich für einen Forschungsposten an der Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin, weil er ihn von allen Lehrverpflichtungen entband. Im April 1914 zog er nach Berlin, wohin ihm bald darauf seine Frau mit den beiden Söhnen folgte. Da es jedoch schon seit längerem Spannungen in der Ehe gab, kehrten Frau und Kinder schon bald wieder nach Zürich zurück. Dort besuchte er sie zwar noch gelegentlich, doch schließlich kam es zur Scheidung. Später heiratete Einstein seine Cousine Elsa, die in Berlin lebte. Der Umstand, daß er die Kriegsjahre als Junggeselle ohne häusliche Verpflichtungen verlebte, mag zur wissenschaftlichen Fruchtbarkeit dieses Abschnitts in seinem Leben beigetragen haben.

Mit den Gesetzen der Elektrizität und des Magnetismus vertrug sich die spezielle Relativitätstheorie sehr gut, mit Newtons Gravitationsgesetz war sie dagegen nicht zu vereinbaren: Newton zufolge macht sich eine Veränderung der Materieverteilung in einer Raumregion augenblicklich an jedem anderen Ort des Universums durch eine entsprechende Veränderung des Gravitationsfeldes bemerkbar. Dies würde nicht nur bedeuten, daß sich Signale schneller als das Licht übertragen ließen (was die Relativitätstheorie ausschließt); um die »augenblickliche Veränderung« überhaupt definieren zu können, müßte man zudem die Exis-

KETTENREAKTION

Ein Neutron aus der ursprünglichen Spaltung von U-235 prallt auf einen anderen Kern. Daraufhin wird auch er gespalten, und es beginnt eine Kettenreaktion weiterer Kollisionen. Wenn sich die Kettenreaktion selbständig fortsetzt, heißt sie »kritisch«, und die Masse von U-235, für die dies der Fall ist, wird als »kritische Masse« bezeichnet.




(Abb. 1.9)
 Ein Beobachter in einer Kiste kann nicht entscheiden, ob er sich in einem auf der Erde ruhenden Fahrstuhl befindet (a) oder von einer Rakete im freien Raum beschleunigt wird (b). Wenn der Raketenantrieb abgeschaltet wird (c), hat der Beobachter das gleiche Empfinden wie in einem Fahrstuhl, der sich in freiem Fall zum Boden des Schachts befindet (d).

Existenz jener absoluten oder universellen Zeit voraussetzen, die die Relativitätstheorie zugunsten einer »persönlichen Zeit« abgeschafft hatte.

Einstein war sich dieser Schwierigkeit schon 1907 bewußt, als er noch am Patentamt in Bern arbeitete, doch erst 1911 in Prag begann er ernsthaft über das Problem nachzudenken. Er erkannte, daß es eine enge Beziehung zwischen einer beschleunigten Bewegung und einem Gravitationsfeld gibt. Jemand im Innern eines geschlossenen Behälters, etwa eines Fahrstuhls, könnte nicht entscheiden, ob sein Behälter sich unbewegt im Gravitationsfeld der Erde befindet oder im freien Raum von einer Rakete beschleunigt wird. (Da Einstein in einer Zeit vor Star Trek lebte, dachte er natürlich eher an Menschen in Fahrstühlen als an Reisende in Raumschiffen. Doch die Beschleunigung oder der freie



(Abb. 1.10)




(Abb. 1.11)

Wäre die Erde flach (Abb. 1.10), könnte man mit gleicher Berechtigung sagen, der Apfel sei Newton auf den Kopf gefallen, weil die Schwerkraft ihn nach unten gezogen habe oder aber weil sich Newton und die Erde beschleunigt nach oben bewegten. Die Kugelform der Erde zerstört die Gleichberechtigung beider Erklärungsweisen (Abb. 1.11): Bei einer beschleunigten Bewegung müßten sich Menschen, die sich an gegenüberliegenden Punkten der Erdoberfläche befinden, voneinander entfernen. Einstein löste dieses Problem durch die Annahme, Raum und Zeit seien gekrümmt.

Fall in einem Fahrstuhl kann nicht sehr lange dauern, ohne daß es zur Katastrophe kommt. - Abb. 1.9)

Daß Newton der Apfel auf den Kopf fiel, könnte mit gleichem Recht auf die Gravitation beziehungsweise Schwerkraft wie auch auf eine Aufwärtsbeschleunigung Newtons mitsamt der Erdoberfläche zurückgeführt werden, wenn die Erde flach wäre (Abb. 1.10). Diese Äquivalenz von Beschleunigung und Gravitation schien jedoch für eine runde Erde nicht zu gelten - wollte man den Umstand, daß sowohl wir als auch unsere Antipoden eine Kraft in Richtung Erdmittelpunkt erfahren, als Auswirkung einer beschleunigten Bewegung erklären, so müßten die Menschen auf der anderen Seite der Erde in die entgegengesetzte Richtung beschleunigt werden wie wir, was sich schlecht damit vereinbaren läßt, daß sie trotzdem in konstanter Entfernung von uns bleiben (Abb. 1.11).



(Abb. 1.12)
RAUMZEIT IST GEKRÜMMT
Beschleunigung und Gravitation können nur äquivalent sein, wenn ein massereicher Körper die Raumzeit krümmt und dadurch die Bahnen von Objekten in seiner Nachbarschaft beeinflusst.

Doch als Einstein 1912 nach Zürich zurückkehrte, hatte er den glücklichen Einfall, daß die Äquivalenz gültig bliebe, wenn die Geometrie der Raumzeit nicht flach, wie bislang angenommen, sondern gekrümmt wäre. Er stellte sich vor, Masse und Energie verzerrten die Raumzeit in irgendeiner Weise, die es noch zu bestimmen galt. Unter dieser Prämisse würden Objekte wie Äpfel oder Planeten versuchen, sich in geradestmöglicher Weise durch die Raumzeit zu bewegen, doch schiene ihre Bahn ähnlich wie in Anwesenheit eines Newtonschen Gravitationsfeldes verbogen zu werden, weil die Raumzeit gekrümmt wäre (Abb.1.12).

Mit der Hilfe seines Freundes Marcel Grossmann machte sich Einstein mit der Theorie gekrümmter Räume und Flächen vertraut, die Bernhard Riemann im 19. Jahrhundert als Teilgebiet der abstrakten Mathematik entwickelt hatte. Schon Riemann hatte darüber nachgedacht, ob sich seine Geometrie auf die wirkliche Welt anwenden ließe. Allerdings hatte er dabei nur angenommen, der dreidimensionale Raum könnte gekrümmt sein. Einstein dagegen verwendete Riemanns Forma-



lismus, um die vierdimensionale Raumzeit zu beschreiben. 1913 verfaßten Einstein und Grossmann einen Aufsatz, in dem sie die Auffassung vertraten, das, was wir für Gravitationskräfte hielten, sei nur eine »Nebenwirkung« der gekrümmten Raumzeit. Doch infolge eines Schnitzers von Einstein (der ganz und gar menschlich und keineswegs unfehlbar war) gelang es ihnen nicht, die Gleichungen zu entdecken, welche die Raumzeitkrümmung zu der in ihr enthaltenen Masse und Energie in Beziehung setzte. Ungestört von familiären Problemen und auch vom Kriege weitgehend unbehelligt, setzte Einstein die Arbeit an diesem Problem in Berlin fort, bis er im November 1915 endlich die richtigen Gleichungen fand. Im Sommer 1915 hatte er seine Ideen bei einem Besuch an der Universität Göttingen mit dem Mathematiker David Hilbert erörtert, und dieser war unabhängig von Einstein einige Tage vor ihm auf dieselben Gleichungen gestoßen. Dennoch ließ Hilbert nie einen Zweifel daran, daß das Verdienst für die neue Theorie Einstein gebührte: Er hatte die Idee gehabt, die Gravitation mit der Raumzeitkrümmung zu verknüpfen. Es spricht für den zivilisierten Zustand der deutschen




Gesellschaft dieser Epoche, daß sich wissenschaftliche Diskussionen und der Meinungsaustausch der Gelehrten selbst in Kriegszeiten ungestört vollziehen konnten. Das sah zwanzig Jahre später unter den Nationalsozialisten ganz anders aus.

Die neue Theorie der gekrümmten Raumzeit wurde allgemeine Relativitätstheorie genannt, um sie von der ursprünglichen Theorie ohne Gravitation zu unterscheiden, die fortan als spezielle Relativitätstheorie galt. Auf spektakuläre Weise wurde sie bestätigt, als eine englische Expedition 1919 während einer Sonnenfinsternis in Westafrika eine winzige Lichtablenkung in der Nähe der Sonne beobachtete (Abb. 1.13, S. 28). Damit lag ein direkter Beweis für die Krümmung von Raum und Zeit vor - die größte Veränderung in unserer Wahrnehmung des Universums, in dem wir leben, seit Euklid gegen Ende des 4. Jahrhundert vor Christus seine Elemente der Geometrie schrieb.

Einsteins allgemeine Relativitätstheorie verwandelte Raum und Zeit aus passiven Elementen, die lediglich den Hintergrund von Ereignissen bildeten, in aktive Teilnehmer an der Dynamik des Universums. Daraus erwuchs ein großes Problem, das auch in der Physik des 21. Jahrhunderts noch eine zentrale Rolle spielt. Das All ist voller Materie, und Materie krümmt die Raumzeit dergestalt, daß sich Körper aufeinander zu





(Abb. 1.13)


GEKRÜMMTE LICHTBAHNEN

Das Licht eines Sterns, das nahe der Sonne vorbeistreicht, wird abgelenkt, weil die Masse der Sonne die Raumzeit krümmt (a). Dies bewirkt eine leichte Verschiebung in der scheinbaren Position des Sterns aus der Sicht eines irdischen Beobachters (b), ein Phänomen, das man während einer Sonnenfinsternis beobachten kann.

bewegen. Einstein stellte fest, daß seine Gleichungen keine Lösung haben, die ein in der Zeit unveränderliches, statisches Universum beschreibt. Statt nun ein solches Universum von ewiger Dauer aufzugeben, an das er und die meisten seiner Zeitgenossen glaubten, frisierte er die Gleichungen, indem er ein Glied hinzufügte, die sogenannte kosmologische Konstante, die die Raumzeit in entgegengesetztem Sinne krümmte, entsprechend einem Einfluß, der die in der Raumzeit enthaltenen Körper auseinandertreibt. Der Abstoßungseffekt der kosmologischen Konstante kompensierte den Anziehungseffekt der Materie und ermöglichte auf diese Weise eine statische Lösung der Gleichungen und damit ein statisches Universum. Das war eine der großen vertanen Chancen der theoretischen Physik. Wäre Einstein bei seinen ursprünglichen Gleichungen geblieben, hätte er vorhersagen können, daß sich das Universum entweder ausdehnen oder zusammenziehen muß. So jedoch wurde die Idee eines veränderlichen Universums erst ernst genommen, als in den zwanziger Jahren die Beobachtungen des Zweieinhalb-Meter-Teleskops auf dem Mount Wilson vorlagen.

Wie diese Beobachtungen zeigten, bewegen sich andere Galaxien um so schneller von uns fort, je weiter sie entfernt sind. Das Universum expandiert, das heißt, der Abstand zwischen zwei beliebigen Galaxien vergrößert sich stetig mit der Zeit (Abb. 1.14, S. 30). Aufgrund dieser Entdeckung entfiel die Notwendigkeit, zwecks einer statischen Lösung für das Universum eine kosmologische Konstante zu postulieren. Später bezeichnete Einstein sie als die größte Eselei seines Lebens. Heute hingegen scheint es, als sei sie durchaus kein Fehler gewesen: Neuere Beobachtungen, die ich in Kapitel 3 beschreiben werde, lassen darauf schließen, daß es unter Umständen doch eine kleine kosmologische Konstante gibt.


Die allgemeine Relativitätstheorie veränderte die Diskussion über den Ursprung und das Schicksal des Universums



(Abb. 1.14)
Beobachtungen von Galaxien lassen darauf schließen, daß das Universum expandiert: Die gegenseitige Entfernung nimmt für fast jedes Paar von Galaxien zu.

von Grund auf. Ein statisches Universum hätte ewig existieren oder zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit in seiner gegenwärtigen Gestalt erschaffen worden sein können. Doch wenn sich die Galaxien heute voneinander fortbewegen, so folgt daraus, daß sie sich in früheren Zeiten in größerer Nähe zueinander befunden haben. Danach hätten sie vor rund fünfzehn Milliarden Jahren alle aufein-andergesessen, und die Dichte wäre außerordentlich hoch gewesen. Uratom hat man diesen Zustand einmal genannt - eine Wortschöpfung des katholischen Priesters Georges Lemaitre, der als erster den Ursprung des Universums untersucht hat. Heute sprechen wir vom Urknall.

Einstein scheint den Urknall niemals ernst genommen zu haben. Offenbar glaubte er, das einfache Modell eines gleichförmig expandierenden Universums würde hinfällig werden, wenn man die Bewegungen der Galaxien rückwärts in der Zeit verfolgte. Eine genaue Betrachtung, meinte er, würde zeigen, daß sich die Galaxien, verfolgte man ihre Bewegungen in der Zeit zurück, nicht an einem Punkt treffen, sondern sich knapp verfehlen und aneinander vorbeifliegen würden. Nach seiner Auffassung hatte das Universum zuvor eine Kontraktionsphase durchlaufen



Das Zweieinhalb-Meter-Hooker-Teleskop des Mount-Wilson-Observatoriums.

und war anschließend in einer Gegenbewegung zu der relativ bescheidenen Dichte heutiger Zeit expandiert. Die Kernreaktionen, die im frühen Universum stattgefunden haben müssen, um die vorhandenen Mengen an leichten Elementen zu erzeugen, sind allerdings, wie wir heute wissen, nur möglich, wenn die Dichte bei rund einer Tonne pro Kubikzentimeter und die Temperatur bei mindestens zehn Milliarden Grad liegt. Tatsächlich lassen Beobachtungen der kosmischen Hintergrundstrahlung darauf schließen, daß die Dichte einmal mehr als 100 Milliarden Billionen Billionen Billionen Billionen (eine Eins mit einundsiebzig Nullen) Tonnen pro Kubikzentimeter betragen hat. Weiterhin konnte das Universum Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie zufolge nicht einfach aus einer Kontraktionsphase in den gegenwärtigen Zustand stetiger Expansion springen. Wie ich in Kapitel 2 erläutern werde, haben Roger Penrose und ich gezeigt, daß das Universum nach der Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie tatsächlich in einem Urknall begonnen haben muß. Auch wenn Einstein selbst sich nie mit diesem Gedanken anfreunden konnte - aus seiner Theorie ergibt sich zwingend der Schluß, daß die Zeit einen Anfang hat.

Noch größeres Widerstreben empfand Einstein angesichts einer anderen Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie: daß die Zeit für massereiche Sterne endet, wenn diese nicht mehr genügend Wärme erzeugen können, um die Kraft




ihrer eigenen Gravitation zu kompensieren - eine Kraft, die bestrebt ist, sie schrumpfen zu lassen. Einstein glaubte, solche Sterne würden in irgendeinem Endzustand verharren, doch heute wissen wir, daß es keine Endzustandskonfigurationen für Sterne mit mehr als der doppelten Sonnenmasse gibt. Solche Sterne setzen ihren Schrumpfungsprozeß fort, bis sie zu Schwarzen Löchern geworden sind - zu Raumzeitregionen, die so stark gekrümmt sind, daß selbst Licht nicht aus ihnen entkommen kann (Abb. 1.15).

Wie Penrose und ich gezeigt haben, endet nach der allgemeinen Relativitätstheorie die Zeit innerhalb eines Schwarzen Lochs - sowohl für den Stern als auch für jeden unglücklichen Astronauten, der das Pech hätte, in das Schwarze Loch hineinzufallen. Doch sowohl der Anfang als auch das Ende der Zeit wären Regionen, an denen sich die Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie nicht mehr definieren ließen. Die Theorie konnte also nicht vorhersagen, was aus dem Urknall hervorging. Einige Kommentatoren sahen darin ein Indiz für die Freiheit Gottes, das Universum auf jede ihm zusagende Weise beginnen zu lassen, während andere (unter ihnen auch ich) die Ansicht vertraten, der Anfang des Universums müsse von den gleichen Gesetzen bestimmt werden, die zu allen anderen Zeiten gültig seien. Diesem Ziel sind wir, wie Kapitel 3 zeigen wird, ein Stück näher gekommen, doch können wir den Ursprung des Universums noch immer nicht vollständig erklären.

Die allgemeine Relativitätstheorie verliert ihre Gültigkeit nahe dem Urknall, weil sie sich nicht mit der Quantentheorie vereinbaren läßt, der anderen bedeutenden physikalischen Revolution des frühen 20. Jahrhunderts. Der erste Schritt in Richtung Quantentheorie erfolgte 1900, als Max Planck in Berlin entdeckte, daß sich die Eigenschaften der Strahlung eines rotglühenden Körpers erklären lassen, wenn solch ein Körper Licht nur in diskreten Paketen, sogenannten Quanten, emittieren oder absorbieren kann. Wie Einstein in einer seiner bahnbrechenden Arbeiten aus dem Jahr 1905, während seiner Zeit am Patentamt, zeigte, eignet sich Plancks Quantenhypothese auch, um den sogenannten Photoeffekt zu erklären - die Art und Weise, wie bestimmte Metalle Elektronen abgeben, wenn sie mit Licht bestrahlt werden. Das ist die Grundlage moderner Lichtdetektoren und Fernsehkameras, und für diese Entdeckung erhielt Einstein Jahre später den Nobelpreis für Physik.

Er setzte die Arbeit am Quantenkonzept bis in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts fort, war aber zutiefst beunruhigt über die Untersuchungen von Werner Heisenberg in Kopenhagen, von Paul Dirac in Cambridge und von Erwin Schrödinger in Zürich, die ein neues Weltbild entwarfen und es Quantenmechanik nannten. Danach lassen sich für winzige Teilchen Ort und Geschwindigkeit nicht mehr exakt bestimmen.



(Abb. 1.15)

Wenn der Kernbrennstoff eines massereichen Sterns erschöpft ist, verliert er Wärme und schrumpft. Die Krümmung der Raumzeit kann dabei so groß werden, daß ein Schwarzes Loch entsteht, aus dem kein Licht zu entweichen vermag. Im Innern des Schwarzen Lochs endet die Zeit.



Albert Einstein mit einer Marionette, die ihn selbst darstellt, kurz nach seiner endgültigen Ankunft in Amerika.

Je genauer man den Ort eines Teilchens ermittelt, desto weniger genau wird man seine Geschwindigkeit messen können und umgekehrt. Einstein war entsetzt über dieses Element des Zufalls, des Unvorhersagbaren in den grundlegenden Naturgesetzen und hat die Quantenmechanik nie wirklich akzeptiert. Seine Einstellung brachte er in seinem berühmten Diktum »Der Herrgott würfelt nicht« zum Ausdruck. Die meisten anderen Wissenschaftler waren jedoch von der Gültigkeit der neuen Quantengesetze überzeugt, weil sie befriedigende Erklärungen für eine ganze Reihe bis dahin rätselhafter Phänomene lieferten und ausgezeichnet mit den Beobachtungen übereinstimmten. Die Quantenmechanik bildet die Grundlage für moderne Entwicklungen in Chemie, Molekularbiologie und Elektronik. Ohne sie wäre der technische Fortschritt, der die Welt in den letzten fünfzig Jahren verwandelt hat, nicht denkbar gewesen.

Im Dezember 1932 verließ Einstein Deutschland in dem Bewußtsein, daß die Nationalsozialisten und Hitler an die Macht kommen würden. Vier Monate später legte er seine deutsche Staatsbürgerschaft ab. Die letzten zwanzig Jahre seines Lebens verbrachte er am Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey.

In Deutschland begannen die Nazis ihre Hetzkampagne gegen die »jüdische Wissenschaft« und die vielen Juden unter den deutschen Wissenschaftlern, ein Vorgehen, das sich später als einer der Gründe erwies, warum es Deutschland nicht gelungen ist, die Atombombe zu entwickeln. Einstein und die Relativitätstheorie waren bevorzugte Zielscheiben dieser Kampagne. Als er vom Erscheinen eines Buches mit dem Titel »100 Autoren gegen Einstein« hörte, meinte er: »Warum einhundert? Wenn ich unrecht hätte, wäre einer genug!«

Nach dem Zweiten Weltkrieg drängte er die Alliierten, eine Weltregierung zu schaffen, um die Atombombe unter Kontrolle zu halten. 1948 bot man ihm an, Präsident des neu geschaffenen Staates Israel zu werden, aber er lehnte ab. Er hat einmal gesagt, Gleichungen seien für ihn wichtiger, weil die Politik für die Gegenwart sei, eine Gleichung hingegen etwas für die Ewigkeit. Die Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie sind sein schönstes Epitaph und Denkmal. Sie werden Bestand haben, solange es das Universum gibt.

Die Welt hat sich in den letzten hundert Jahren grundlegender gewandelt als in irgendeinem Jahrhundert zuvor. Dafür waren keine neuen politischen oder wirtschaftlichen Lehren verantwortlich, sondern die rasanten technischen Entwicklungen, die durch die Fortschritte in der Grundlagenforschung ermöglicht wurden. Wer wäre ein besseres Symbol für diese Fortschritte als Albert Einstein?




KAPITEL 2

DIE FORM DER ZEIT

*Einsteins allgemeine Relativitätstheorie verlieh der Zeit eine Form.
Wie sich das mit der Quantentheorie vereinbaren läßt.*






(Abb. 2.1) DIE ZEIT ALS EISENBAHNGLEIS
Aber ist sie ein Hauptgleis, das nur in eine Richtung führt - nämlich in die Zukunft -, oder kann sie sich in einer Schleife nach rückwärts wenden und an einer zurückliegenden Weiche wieder auf das Hauptgleis gelangen?


Was ist Zeit? Ist sie ein ewiger Strom, der all unsere Träume davonträgt, wie es in einem alten Kirchenlied heißt? Oder ist sie ein Schienenweg? Vielleicht enthält sie Schleifen und Verzweigungen, so daß man vorwärts springen oder zu früheren Stationen der Bahnlinie zurückkehren kann (Abb. 2.1).

Im 19. Jahrhundert schrieb der Schriftsteller Charles Lamb: »Nichts gibt mir größere Rätsel auf als Zeit und Raum. Und doch bekümmert mich nichts weniger als Zeit und Raum, weil ich nie einen Gedanken an sie verschwende.« Die meisten Menschen nehmen gegenüber Zeit und Raum, was auch immer das sein mag, eine ähnlich unbekümmerte Haltung ein, aber jeder fragt sich gelegentlich, was die Zeit ist, wie sie begonnen hat und wohin sie uns führt.

Ich bin der Meinung, jede vernünftige wissenschaftliche Theorie, ob sie sich nun mit der Zeit oder einem anderen Konzept beschäftigt, sollte sich auf die für den Praktiker zweckmäßigste Wissenschaftsphilosophie gründen: den positivistischen Ansatz, den Karl Popper und andere entwickelt haben. Nach dieser Auffassung ist eine wissenschaftliche Theorie ein mathematisches Modell, das unsere Beobachtungen beschreibt und kodifiziert. Eine gute Theorie beschreibt ein großes Spektrum von Phänomenen auf der Grundlage einiger einfacher Postulate und macht eindeutige Vorhersagen, die sich überprüfen lassen. Wenn die Vorhersagen mit der Beobachtung übereinstimmen, dann hat die Theorie diesen Test bestanden, doch läßt sich nie vollständig beweisen, daß sie richtig ist. Stimmen die Beobachtungen hingegen nicht mit den Vorhersagen überein, müssen wir die Theorie aufgeben oder verändern. (So sollte es zumindest sein. In der Praxis werden jedoch häufig die Beobachtungen oder die Zuverlässigkeit und Moral der Beobachter in Frage gestellt.) Wenn man, wie ich, den positivistischen Standpunkt bezieht, kann man die Frage, was die Zeit tatsächlich ist, nicht beantworten. Man kann lediglich beschreiben, was sich als sehr gutes mathematisches Modell der Zeit erwiesen hat, und sagen, welche Vorhersagen es macht.




(Abb. 2.2)
Newtons Zeit war vom Raum vollkommen unabhängig, als wäre sie ein Eisenbahngleis, das sich in beiden Richtungen ins Unendliche erstreckt.




Isaac Newton veröffentlichte sein mathematisches Modell von Zeit und Raum vor über dreihundert Jahren.

Das erste mathematische Modell für Zeit und Raum hat Isaac Newton in seinem 1687 erschienenen Werk Principia Mathematica geliefert. Newton hatte den Lucasischen Lehrstuhl inne, den Stuhl, der heute mir zuerkannt ist - allerdings wurde er damals noch nicht elektrisch betrieben. In Newtons Modell sind Zeit und Raum ein passiver Hintergrund für Ereignisse - ein Hintergrund, der durch die darin stattfindenden Ereignisse in keiner Weise beeinflusst wird. Die Zeit ist vom Raum getrennt und nach der damaligen Vorstellung eine Linie, die sich in beide Richtungen unendlich ausdehnt (Abb. 2.2). Man hielt die Zeit für ewig, glaubte also, es habe sie schon immer gegeben und werde sie immer geben. Dagegen waren die meisten Menschen davon überzeugt, das physikalische Universum sei erst wenige tausend Jahre zuvor mehr oder weniger in seinem gegenwärtigen Zustand erschaffen worden. Das bereitete manchen Denkern Kopfzerbrechen, unter anderem dem Philosophen Immanuel Kant. Wenn das Universum tatsächlich erschaffen worden sei, überlegte er, warum dann diese unendliche Wartezeit vor der Schöpfung? Oder wenn es schon ewig existiere, warum sei dann nicht alles, was habe geschehen können, bereits geschehen, was bedeutete, daß die Geschichte längst zu Ende wäre? Warum habe das Universum insbeson-



(Abb. 2.3] FORM UND RICHTUNG DER ZEIT

Einsteins Relativitätstheorie, die durch eine große Zahl von Experimenten bestätigt wird, zeigt, daß Zeit und Raum unauflöslich miteinander verknüpft sind. Man kann den Raum nicht krümmen, ohne die Zeit einzubeziehen. Folglich hat auch die Zeit gewissermaßen eine Form. Aber sie scheint nach wie vor nur eine einzige Richtung zu haben, wie die Lokomotiven in der Abbildung zeigen.



(Abb. 2.4)
DIE GUMMITUCHANALOGIE
Die große Kugel in der Mitte stellt einen massereichen Körper dar, beispielsweise einen Stern. Sein Gewicht krümmt das Tuch in seiner Umgebung. Die kleinen Kugeln, die auf dem Tuch rollen, werden von der Krümmung abgelenkt und umrunden die große Kugel, ähnlich wie Planeten im Gravitationsfeld eines Sterns diesen umkreisen.

dere noch nicht den Zustand des thermischen Gleichgewichts erreicht, in dem alle Dinge dieser Welt die gleiche Temperatur aufwiesen?

Kant nannte dieses Problem eine »Antinomie der reinen Vernunft«, weil es einen logischen Widerspruch darzustellen schien; es hatte keine Lösung. Allerdings gibt es diesen Widerspruch nur im Kontext von Newtons mathematischem Modell, in dem die Zeit eine unendliche Linie bildet, unabhängig vom Geschehen im Universum. Wie in Kapitel 1 geschildert, hat Einstein 1915 ein vollkommen neues Modell vorgelegt: die allgemeine Relativitätstheorie. In den Jahren, die seither vergangen sind, haben wir ein paar Schleifen und Bänder hinzugefügt, aber noch immer beruht unser Modell von Zeit und Raum auf der Theorie, die Einstein damals vorgeschlagen hat. Dieses und die folgenden Kapitel werden zeigen, wie sich unsere Ideen in den Jahren seit Einsteins revolutionärem Aufsatz entwickelt haben. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die der Arbeit vieler Menschen zu verdanken ist, und ich bin stolz darauf, daß ich mit einem bescheidenen Beitrag an ihr beteiligt bin.

Die allgemeine Relativitätstheorie verbindet die Zeitdimension mit

den drei Dimensionen des Raumes zur sogenannten Raumzeit (vgl. Abb. 2.3, S. 41) und bezieht die Gravitation in diese Beschreibung mit ein, indem sie erklärt, die Verteilung von Materie und Energie im Universum krümme und verzerre die Raumzeit, so daß sie nicht flach ist. Objekte in dieser Raumzeit versuchen, sich geradlinig zu bewegen, doch da sie gekrümmt ist, erscheinen ihre Bahnen relativ zueinander verbogen. Die Körper bewegen sich, als wirke ein Gravitationsfeld auf sie ein.

Stellen Sie sich zum Vergleich - eine Analogie, die Sie nicht allzu wörtlich nehmen sollten - ein Gummituch vor. Auf das Tuch legen wir eine große Kugel, die die Sonne darstellt. Das Gewicht der Kugel ruft eine Vertiefung in dem Tuch hervor und bewirkt so eine Krümmung in der Nähe der »Sonne«. Lassen wir nun kleine Kugeln aus einem Kugellager auf das Tuch rollen, bewegen sie sich nicht geradewegs zur anderen Seite, sondern umlaufen die schwere Kugel, ähnlich wie Planeten die Sonne umkreisen (Abb. 2.4).

Die Analogie ist unvollständig, weil in ihr nur ein zweidimensionaler Raumausschnitt (die Oberfläche des Gummituchs) gekrümmt ist und die Zeit wie in Newtons Theorie völlig unbehelligt bleibt. In der allgemeinen Relativitätstheorie hingegen, deren Gültigkeit durch eine Vielzahl von Experimenten bestätigt wird, sind Zeit und Raum unauflöslich miteinander verknüpft. Man kann den Raum nicht krümmen, ohne die Zeit einzubeziehen. Die Zeit hat gewissermaßen selbst eine Form.

Durch die Krümmung von Zeit und Raum macht die allgemeine Relativitätstheorie aus diesen einst passiven Elementen eines Hintergrunds, vor dem sich die Ereignisse des Universums abspielen, aktiv-dynamische Teilnehmer des Geschehens. In Newtons Theorie, in der die Zeit unabhängig von allem anderen existiert, konnte man fragen: Was hat Gott denn getan, bevor er das Universum erschuf? Wie schon der heilige Augustinus mahnte, sollte man darüber keine Witze machen - wie jener Unbekannte, der meinte, Gott habe zuvor die Hölle für diejenigen vorbereitet, die solche übermäßig tiefeschürfenden Fragen stellten. Es handelt sich vielmehr um eine ernste Frage, über die Menschen zu allen Zeiten spekuliert haben, nicht zuletzt der heilige Augustinus selbst: Er glaubte, Gott habe, bevor er Himmel und Erde erschuf, gar nichts getan. Das kommt unseren modernen Vorstellungen ziemlich nahe.

In der allgemeinen Relativitätstheorie existieren Zeit und Raum hingegen weder unabhängig vom Universum noch unabhängig voneinander. Zeitintervalle und Strecken werden durch Messungen innerhalb des Universums definiert, etwa die Schwingungszahl eines Quarzkristalls in einer Uhr oder die Länge eines Lineals. Es ist durchaus denkbar, daß die solcherart innerhalb des Universums definierte



Augustinus, ein Philosoph, der im 5. Jahrhundert lebte, vertrat die Auffassung, die Zeit habe vor dem Anfang der Welt nicht existiert. Seite aus *De Civitate Dei*, 12. Jahrhundert, Biblioteca Laurenziana, Florenz.



Zeit einen minimalen oder maximalen Wert hat, mit anderen Worten, einen Anfang oder ein Ende. Die Frage, was vor dem Anfang gewesen oder nach dem Ende sein könnte, wäre sinnlos, weil die entsprechenden Zeitpunkte nicht definiert wären.

Es war natürlich wichtig festzustellen, ob das mathematische Modell der allgemeinen Relativitätstheorie einen Anfang oder ein Ende der Zeit vorhersagt. Ein verbreitetes Vorurteil bei theoretischen Physikern, auch Einstein, besagte, die Zeit sei in beide Richtungen unendlich. Sonst hätten sich unbequeme Fragen nach der Erschaffung des Universums gestellt, die außerhalb des wissenschaftlichen Diskurses zu liegen schienen. Zwar kannte man Lösungen der Einsteinschen Gleichungen, in denen die Zeit einen Anfang oder ein Ende hat, aber sie waren alle sehr speziell, mit einem hohen Maß an Symmetrie. Man glaubte, ein realer Körper, der unter dem Einfluß seiner eigenen Schwerkraft kollabiere, werde durch physikalische Mechanismen daran gehindert, mit all seiner Materie zu einem Punkt von unendlicher Dichte zusammenzustürzen - sei es durch den Gegendruck seiner weiter und weiter zusammengepreßten Materie, sei es, weil diese sich zwar zunächst aufeinander zu bewegte, dann aber aneinander vorbeiflüge. Und wenn man andererseits die Expansion des Universums in der Zeit zurückverfolgte, fände man entsprechend, daß die Materie des Universums nicht aus einem Punkt von unendlicher Dichte hervorgegangen sei. Eine solche sogenannte Singularität wäre ein Anfang oder ein Ende der Zeit.


1963 behaupteten die beiden russischen Wissenschaftler Jewgenij Lifschitz und Isaak Chalatinow denn auch, sie hätten bewiesen, daß alle Lösungen der Einstein-Gleichungen, in denen eine Singularität vorkomme, ausnehmend spezielle Anordnungen und Geschwindigkeitsverteilungen der Materie aufwiesen. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Lösung, die unserem Universum entspricht, diese speziellen Eigenschaften besitze, sei praktisch null. So gut wie alle Lösungen, die das Universum darstellen könnten, kämen ohne eine Singularität von unendlicher Dichte aus: Vor der Expansionsphase des Universums müsse es eine Kontraktionsphase gegeben haben, in der die Materie zusammengestürzt, aber knapp einer Kollision mit sich selbst entgangen sei, so daß sie sich in der gegenwärtigen Expansionsphase wieder voneinander entferne. Wenn dies zutrefte, dauere die Zeit ewig an, von einer unendlichen Vergangenheit hin zu einer unendlichen Zukunft.

Nicht alle Fachleute fanden die Argumente von Lifschitz und Chalatinow überzeugend. Roger Penrose und ich wählten einen anderen Ansatz, der nicht von einer detaillierten Untersuchung von Lösungen ausging, sondern von der globalen Struktur der Raumzeit. In der allgemeinen Relativitätstheorie wird die Raumzeit nicht nur durch massebehaltete Objekte gekrümmt, die sich in ihr befinden, sondern auch durch die




(Abb. 2.5)
UNSER RÜCKWÄRTSLICHTKEGEL
 Betrachten wir ferne Galaxien, blicken wir in die Vergangenheit des Universums, denn das Licht bewegt sich mit endlicher Geschwindigkeit. Wenn wir die Zeit senkrecht und zwei der drei Raumrichtungen horizontal darstellen und uns das Licht jetzt in dem Punkt an der Spitze erreicht, dann ist es auf einem Kegel zu uns gelangt.

Beobachter blickt durch die Zeit zurück
 Galaxien, wie sie vor kurzem aussahen
 Galaxien, wie sie vor fünf Milliarden Jahren aussahen
 Die kosmische Hintergrundstrahlung



SPEKTRUM DER KOSMISCHEN MIKROWELLENHINTERGRUNDSTRAHLUNG; GEMESSEN MIT DEM COBE-SATELLITEN




(Abb. 2.6)
DAS SPEKTRUM DER KOSMISCHEN HINTERGRUNDSTRAHLUNG
 Das Spektrum - die Verteilung der Strahlungsleistung auf die verschiedenen Frequenzen - der kosmischen Hintergrundstrahlung ist typisch für das Strahlungsspektrum eines heißen Körpers. Um ein Wärmegleichgewicht zu erreichen, müssen Strahlung und Materie viele Male aneinander gestreut haben. Daraus läßt sich auf eine Materiedichte in der Vergangenheit schließen, die ausreichte, um unseren Vergangenheitslichtkegel nach innen zu biegen.

Energie, die sie enthält. Energie ist immer positiv, daher verleiht sie der Raumzeit eine Krümmung, die die Bahnen der Lichtstrahlen aufeinander zu biegt.


Betrachten wir nun unseren in der Vergangenheit liegenden Rückwärtslichtkegel (Abb. 2.5), das heißt die Bahnen, die die Lichtstrahlen ferner Galaxien in der Raumzeit durchlaufen, bevor sie uns in der Gegenwart erreichen.

In einem Diagramm, in dem die senkrechte Achse die Zeit und die waagerechte den Raum darstellt, bildet die Gesamtheit dieser Bahnen einen Kegel, dessen Scheitelpunkt dahin zeigt, wo wir uns hier und jetzt in der Raumzeit befinden. Wenn wir das Licht zurückverfolgen - vom Scheitelpunkt den Kegel hinab -, treffen wir auf Galaxien zu immer früheren Zeiten. Da das Universum expandiert und früher alles wesentlich näher zusammenlag, blicken wir, je weiter wir zurückschauen, durch Regionen von immer höherer Materiedichte. Einiges von dem Licht,



(Abb. 2.7)
KRÜMMUNG DER RAUMZEIT
 Weil die Gravitation eine anziehende Kraft ist, bewirkt Materie immer eine Krümmung der Raumzeit, durch die Lichtstrahlen aufeinander zu gelenkt werden.

das uns erreicht, stammt gar aus einer Zeit, bevor sich überhaupt so etwas wie Galaxien gebildet hatte: So beobachten wir einen schwachen Hintergrund von Mikrowellenstrahlung (eines niederenergetischen Verwandten des sichtbaren Lichts), der sich aus viel früherer Zeit, als das Universum noch erheblich dichter und heißer als heute war, entlang des Rückwärtslichtkegels bis zu uns ausbreitet. Durch Einstellen der Empfänger auf verschiedene Mikrowellenfrequenzen können wir das Spektrum (die Verteilung der Energie auf die Teilwellen unterschiedlicher Frequenz) dieser Strahlung messen. Wir finden ein Spektrum, das für die Strahlung eines Körpers mit der Temperatur von 2,7 Grad über dem absoluten Nullpunkt charakteristisch ist. Diese Mikrowellenstrahlung eignet sich zwar nicht zum Auftauen einer tiefgefrorenen Pizza, doch der Umstand, daß das Spektrum so genau mit der Strahlung eines Körpers von 2,7 Grad übereinstimmt, gibt uns einen wichtigen Hinweis: Die Strahlung muß aus Regionen kommen, die für Mikrowellen undurchlässig sind (Abb. 2.6).



Daraus können wir auf die Menge an Materie schließen, die unser Rückwärtslichtkegel in der Vergangenheit durchdrungen hat. Sie reicht aus, die Raumzeit so zu krümmen, daß die Lichtstrahlen unseres Rückwärtslichtkegels aufeinander zu gebogen werden (Abb. 2.7). Wenn wir in der Zeit zurückgehen, erreichen die Querschnitte unseres Rückwärtslichtkegels also eine maximale Größe und werden dann wieder kleiner. Unsere Vergangenheit ist birnenförmig (Abb. 2.8).

Folgen wir unserem Rückwärtslichtkegel noch weiter, bewirkt die positive Energiedichte der Materie, daß sich die Lichtstrahlen noch stärker aufeinander zu bewegen. In endlicher Zeit schrumpft der Querschnitt des Lichtkegels auf die Größe null. Mit anderen Worten, die gesamte Materie innerhalb unseres Rückwärtslichtkegels ist in einer Region eingeschlossen, deren Grenze gegen null geht. So konnten Penrose und ich beweisen, daß die Zeit nach dem mathematischen Modell der allgemeinen Relativitätstheorie im sogenannten Urknall einen Anfang gehabt haben muß. Mit ähnlichen Argumenten ließ sich zeigen, daß die Zeit ein Ende findet, wenn Sterne oder Galaxien unter dem Einfluß ihrer eigenen Schwerkraft zu Schwarzen Löchern zusammenstürzen. Wir umgingen Kants Antinomie der reinen Vernunft, indem wir die implizite Annahme aufgaben, die Zeit habe eine vom Universum unabhängige Bedeutung. Der Aufsatz, in dem wir bewiesen, daß die Zeit einen Anfang hat, gewann 1969 den zweiten Preis in dem von der Gravity Research Foundation gesponserten jährlichen Essay-Wettbewerb, und Roger und ich durften uns die fürstliche Summe von 300 Dollar teilen. Ich glaube nicht, daß die anderen preisgekrönten Arbeiten dieses Jahres von überdauerndem Wert waren.

Die Reaktionen auf unseren Aufsatz fielen unterschiedlich aus. Viele Physiker waren empört, während fromme Menschen, die an die Schöpfung glaubten, das Ergebnis mit Begeisterung aufnahmen: Endlich war der wissenschaftliche Beweis für einen punktuellen Schöpfungsakt erbracht. Derweilen waren Lifschitz und Chalatnikow in einer schwierigen Situation. Gegen die mathematischen Theoreme, die wir bewiesen hatten, konnten sie schlecht etwas einwenden, andererseits durften sie aber unter dem sowjetischen System auch nicht zugeben, daß sie sich geirrt und westliche Wissenschaftler recht hatten. Doch sie retteten die Situation, indem sie eine allgemeinere Familie von Lösungen mit einer Singularität fanden, die nicht so speziell waren wie ihre vorherigen Lösungen. Damit waren sie in der Lage, Singularitäten - den Anfang oder das Ende der Zeit - als sowjetische Entdeckung zu reklamieren.

(Abb. 2.8) DIE ZEIT IST BIRNENFÖRMIG


Wenn wir unseren Rückwärtslichtkegel zurückverfolgen, wird ersichtlich, daß seine Lichtstrahlen durch die Materie im frühen Universum einwärts gebogen werden. Das ganze Universum, das wir beobachten, war in der Vergangenheit in einer Region enthalten, deren Grenze beim Urknall auf null schrumpft. Das wäre eine Singularität, ein Ort, wo die Materie unendlich dicht wäre und die klassische allgemeine Relativitätstheorie nicht mehr gelten würde.



DIE UNSCHÄRFERELATION



Niederfrequente Wellen stören die Geschwindigkeit des Teilchens nur wenig. Allerdings haben sie längere Wellenlängen



Hochfrequente Wellen stören die Geschwindigkeit des Teilchens stärker. Dafür sind ihre Wellenlängen kürzer.



Je länger die Wellenlänge der Welle, mit deren Hilfe ein Teilchen beobachtet wird, desto weniger genau bestimmbar ist sein Ort.

Je kürzer die Wellenlänge der Welle, mit deren Hilfe ein Teilchen beobachtet wird, desto genauer bestimmbar ist sein Ort.

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Quantentheorie war im Jahr 1900 Max Plancks Annahme, das Licht komme immer in kleinen Paketen, Quanten, wie er sagte, vor. Zwar lieferte Plancks Quantenhypothese schlüssige Erklärungen für die Strahlung heißer Körper, doch das volle Ausmaß ihrer Bedeutung wurde erst Mitte der zwanziger Jahre erkannt, als der deutsche Physiker Werner Heisenberg seine berühmte Unschärferelation formulierte.

Wie er entdeckte, ergibt sich aus Plancks Hypothese folgendes: Je genauer man die Position eines Teilchens zu messen versucht, desto ungenauer mißt man seine Geschwindigkeit und umgekehrt. Exakter: Heisenberg wies nach, daß die Unbestimmtheit in der Position eines Teilchens multipliziert mit der Unbestimmtheit seines Impulses stets größer sein muß als das Plancksche Wirkungsquantum, eine Größe, die in enger Beziehung zum Energiegehalt eines Lichtquants steht.

HEISENBERGSCHES UNSCHÄRFERELATION



Unbestimmtheit der Position des Teilchens

x



Unbestimmtheit der Geschwindigkeit des Teilchens

x



Masse des Teilchens

≅


Plancksches Wirkungsquantum

Noch immer hegten die meisten Physiker eine instinktive Abneigung gegen die Vorstellung, die Zeit habe einen Anfang oder ein Ende. Daher wandten sie ein, das mathematische Modell sei wahrscheinlich keine gute Beschreibung der Raumzeit in der Nähe einer Singularität. Die allgemeine Relativitätstheorie ist nämlich, wie im ersten Kapitel erwähnt, eine klassische Theorie und läßt die Unschärferelation der Quantentheorie außer acht, die für alle anderen uns bekannten Kräfte gilt. Diese Inkonsistenz spielt im größten Teil des Universums während des größten Teils der Zeit keine Rolle, weil die Krümmungen der Raumzeit auf einer riesigen und die Quanteneffekte auf einer winzigen Größenskala stattfinden. Doch in der Nähe einer Singularität wären die beiden Skalen vergleichbar, so daß zusätzlich zur klassischen Gravitation die Effekte der Quantentheorie an Bedeutung gewinnen - dort hätten wir es demnach mit Quantengravitation zu tun. Im Grunde haben Penrose und ich also mit den Singularitätstheoremen nachgewiesen, daß unsere klassische Raumzeitregion in der Vergangenheit - und möglicherweise auch in der Zukunft - durch Regionen begrenzt wird, in denen die Quantengravitation zum Tragen kommt. Um den Ursprung und das Schicksal des Universums zu verstehen, brauchen wir eine Quantentheorie der Gravitation.

Quantentheorien von Systemen wie Atomen, die eine begrenzte Zahl von Teilchen umfassen, wurden in den zwanziger Jahren von Heisenberg, Erwin Schrödinger und Paul Dirac formuliert. (Auch Dirac hatte einst meinen Lehrstuhl in Cambridge inne, aber auch zu seiner Zeit war er noch nicht motorisiert.) Allerdings traten Probleme auf, als man versuchte, die Quantentheorie auf das Maxwell-Feld auszudehnen, das Elektrizität, Magnetismus und Licht beschreibt.

DAS MAXWELL-FELD

1865 faßte der englische Physiker James Clerk Maxwell alle bekannten Gesetze der Elektrizität und des Magnetismus zusammen. Maxwells Theorie setzt die Existenz von »Feldern« voraus, die Wirkungen von einem Ort an einen anderen übertragen. Er ging davon aus daß die Felder, die elektrische und magnetische Störungen übertragen, dynamische Gebilde sind, die schwingen und sich durch den Raum bewegen können. Maxwells Synthese des Elektromagnetismus läßt sich in zwei Gleichungen zusammenfassen, die die Dynamik dieser Felder beschreiben. Er selbst hat die erste wichtige Schlußfolgerung aus diesen Gleichungen gezogen: daß sich elektromagnetische Wellen aller Frequenzen mit dergleichen unveränderlichen Geschwindigkeit durch den Raum bewegen - der Lichtgeschwindigkeit.




Die Wellenlänge ist die Entfernung zwischen den Kämmen einer Welle

(Abb. 2.9) **BEWEGTE WELLE MIT SCHWINGENDEM PENDEL**
 Elektromagnetische Strahlung bewegt sich als Welle durch den Raum, wobei elektrisches und magnetisches Feld wie ein Pendel schwingen - quer zur Ausbreitungsrichtung der Welle. Die Strahlung kann eine Überlagerung von einfachen Wellen verschiedener Wellenlängen sein.

Man kann sich vorstellen, daß das elektromagnetische Feld aus Wellen verschiedener Wellenlängen (dem Abstand zwischen einem Wellenkamm und dem nächsten) besteht. In einer Welle schwingt das Feld wie ein Pendel von einem Wert zum anderen (Abb. 2.9).

Nach der Quantentheorie entspricht der Grundzustand - der Zustand niedrigstmöglicher Energie - eines Pendels nicht einfach (wie in der klassischen Physik) der Stellung, in der das Pendel in Ruhe ist und direkt nach unten zeigt. Dann hätte der Pendelkörper nämlich sowohl einen bestimmten Ort als auch eine bestimmte Geschwindigkeit - null. Das wäre eine Verletzung der Unschärferelation, die ja die exakte Messung des Ortes und der Geschwindigkeit zur selben Zeit verbietet. Die Unbestimmtheit des Ortes mal der Unbestimmtheit des Impulses muß größer sein als eine bestimmte Konstante, das sogenannte Plancksche Wirkungsquantum - ihr Zahlenwert ist zu lang, um sie immer wieder im Ganzen hinzuschreiben, daher geben wir sie durch ein Symbol wieder: h , gesprochen »h quer«.



(Abb. 2.10) **PENDEL MIT WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG**
 Nach der Quantentheorie muß ein Pendel selbst in seinem niedrigsten Energiezustand ein Minimum an Fluktuationen aufweisen. Seine Position ist durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung gegeben: Im Grundzustand ist die wahrscheinlichste Position eine Ausrichtung, die direkt nach unten zeigt, aber es besteht auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, das Pendel in einem kleinen Winkel zur Senkrechten anzutreffen.


Der Grundzustand oder niedrigste Energiezustand eines Pendels besitzt also nicht die Energie null, wie man erwarten könnte. Vielmehr muß ein Pendel wie jedes quantentheoretische Schwingungssystem selbst in seinem Grundzustand bestimmte Schwingungen ausführen, sogenannte Nullpunktschwingungen. Das heißt, das Quantenpendel zeigt auch im Grundzustand nicht unbedingt direkt nach unten, sondern seine Lage weicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit um einen kleinen Winkel von der Senkrechten ab (Abb. 2.10). Entsprechend wird die Höhe der Wellenberge des elektromagnetischen Feldes selbst im Vakuumzustand, ihrem niedrigsten Energiezustand, nicht genau gleich null sein, sondern kleine Werte aufweisen. Je höher die Frequenz (die Zahl der Schwingungen pro Zeiteinheit) des Pendels oder der Welle, desto höher die Energie des Grundzustands.

Berechnungen der Grundzustandsfluktuationen haben für die scheinbare Masse und Ladung des Elektrons einen unendlichen Wert


ergeben, was sich nicht mit den Beobachtungen deckt. Doch in den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelten die Physiker Richard Feynman, Julian Schwinger und Shin'ichiro Tomonaga eine in sich schlüssige Methode, diese Unendlichkeiten zu eliminieren oder »herauszustrahieren« und nur die beobachteten endlichen Werte für die Masse und die Ladung zu berücksichtigen. Trotzdem verursachten die Grundzustandsfluktuationen noch immer kleine Effekte, die sich messen ließen und eine befriedigende Übereinstimmung mit den Experimenten zeigten. Ähnliche Subtraktionsverfahren zur Eliminierung von Unendlichkeiten bewährten sich bei sogenannten Yang-Mills-Feldern, deren Theorie von Chen Ning Yang und Robert Mills entwickelt wurde. Yang-Mills-Theorien sind eine Erweiterung der Maxwellschen Theorie des Elektromagnetismus. Mit ihrer Hilfe lassen sich zwei weitere der fundamentalen Kräfte (oder Wechselwirkungen) mathematisch beschreiben - die schwache und die starke Kernkraft. Doch in einer Quantentheorie der Gravitation haben Grundzustandsfluktuationen einen weit wichtigeren Effekt. Abermals besitzt jede Wellenlänge eine Grundzustandsenergie. Die Wellenlängen des elektromagnetischen Felds können beliebig kurz sein, daher gibt es in jeder Raumzeitregion eine unendliche Zahl verschiedener Wellenlängen und eine unendliche Menge an Grundzustandsenergie. Da Energie - wie Materie - eine Gravitationsquelle ist, müßte diese unendliche Energiedichte bedeuten, daß im Universum genügend Gravitationsanziehung vorhanden ist, um die gesamte Raumzeit zu einem einzigen Punkt zusammenzuziehen, was offenkundig nicht der Fall ist.

Man könnte meinen, dieser scheinbare Widerspruch zwischen Beobachtung und Theorie lasse sich auflösen, indem man erklärt, die Grundzustandsfluktuationen hätten keinen Gravitationseffekt, doch das geht nicht. Wir können die Energie der Grundzustandsfluktuationen durch den sogenannten Casimir-Effekt nachweisen. Wenn man zwei Metallplatten sehr nahe und parallel zueinander anordnet, ist die Anzahl der Wellenlängen, die zwischen die Platten passen, etwas geringer als die der verschiedenen Wellenlängen, die im Außenraum der Anordnung zulässig sind. Mithin ist die Energiedichte zwischen den Platten - obwohl immer noch unendlich - kleiner als die Energiedichte außerhalb der Platten (Abb. 2.11). Dieser Unterschied der Energiedichten führt zu einer Kraft, die die Platten aufeinander zu bewegt, und diese Kraft ist experimentell nachgewiesen worden. In der allgemeinen Relativitätstheorie sind Kräfte - genauso wie Materie - eine Gravitationsquelle, daher wäre es inkonsistent, den Gravitationseffekt dieses Energieunterschiedes außer acht zu lassen.

Eine andere mögliche Lösung des Problems wäre die Annahme, es gebe eine kosmologische Konstante, wie Einstein sie eingeführt hat, um ein statisches Universum zu beschreiben. Wenn diese Konstante einen unendlichen negativen Wert hätte, könnte sie den unendlichen positiven Wert der Grundzustandsenergien im freien Raum aufheben. Allerdings sähe eine solche kosmologische Konstante allzusehr nach einer Notlö-



(Abb. 2.11)
DER CASIMIR-EFFEKT
 Die Existenz von Grundzustandsfluktuationen ist durch den experimentellen Nachweis des Casimir-Effekts bestätigt worden, einer winzigen Kraft, die zwischen parallelen, elektrisch neutralen Metallplatten wirkt.



(Abb. 2.12) TEILCHENSPIN
 Alle Teilchen haben eine Eigenschaft, den Spin, von dem es abhängt, wie Teilchen unter verschiedenen Blickwinkeln aussehen. Das läßt sich an einem Kartenspiel anschaulich machen. Betrachten wir zunächst das Pik-As. Gleich sieht es nur nach einer vollständigen Umdrehung von 360 Grad aus. Daher sagt man, es habe Spin 1. Dagegen besitzt die Herzdame zwei Köpfe und sieht schon nach einer halben Umdrehung von 180 Grad gleich aus. Bei ihr spricht man von Spin 2. Entsprechend kann man sich Objekte mit Spin 3 oder mehr vorstellen, die schon bei kleineren Bruchteilen einer Umdrehung gleich aussehen. Je höher der Spin, desto kleiner der Bruchteil einer vollständigen Umdrehung, der erforderlich ist, um das Teilchen gleich aussehen zu lassen. Bemerkenswert - und nicht anhand von Alltagsgegenständen darstellbar - ist der Umstand, daß es auch Teilchen gibt, die sich selbst erst wieder gleichen, wenn sie zwei vollständige Umdrehungen hinter sich haben. In diesen Fällen spricht man von Spin 1/2.



sung aus und müßte außerordentlich genau abgestimmt sein. Zum Glück wurde in den siebziger Jahren eine vollkommen neue Art von Symmetrie entdeckt und mit ihr ein natürlicher physikalischer Mechanismus, durch den sich die aus den Grundzustandsfluktuationen erwachsenden Unendlichkeiten aufheben lassen. Es handelt sich um die sogenannte Supersymmetrie, eine Eigenschaft vieler der neueren physikalischen Theorien, die sich auf verschiedene Weise beschreiben läßt. Eine Möglichkeit besteht darin, zu sagen, die Raumzeit besitze neben den Dimensionen, die sich unserer Erfahrung erschließen, noch zusätzliche Dimensionen. Sie werden als Grassmann-Dimensionen bezeichnet, weil die zugehörigen Koordinaten keine gewöhnlichen Zahlen, sondern sogenannte Grassmann-Variablen sind. Gewöhnliche Zahlen sind kommutativ, das heißt, es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge man sie multipliziert: 6 mal 4 ist gleich 4 mal 6. Hingegen sind Grassmann-Variablen anti-kommutativ: x mal y ist -y mal x.


GEWÖHNLICHE ZAHLEN
 $A \times B = B \times A$

GRASSMANN-ZAHLEN
 $A \times B = -B \times A$

Zunächst diente die Supersymmetrie zur Eliminierung von Unendlichkeiten in Materie- und Yang-Mills-Feldern, und zwar in einer Raumzeit, in der sowohl die gewöhnlichen als auch die Grassmann-Dimensionen flach, also nicht gekrümmt waren. Aber es lag nahe, sie auch auf gekrümmte gewöhnliche und Grassmann-Dimensionen auszuweiten. Das führte zu zahlreichen Theorien, die unter der Bezeichnung Supergravitation zusammengefaßt werden und ein unterschiedliches Maß an Supersymmetrie aufweisen. Eine Folge der Supersymmetrie ist, daß jedes Feld oder Teilchen einer supersymmetrischen Theorie mindestens einen »Superpartner« besitzen muß, ein weiteres Teilchen, dessen Spin um 1/2 größer oder kleiner ist als der seines Partnerteilchens (Abb. 2.12).

Die Grundzustandsenergien von Bosonen - Feldern, deren Spin ganzzahlig ist (0, 1, 2 usw.) - sind positiv, während die Grundzustandsenergien

SUPERPARTNER



Bosonen sind Teilchen mit ganzzahligem Spin (zum Beispiel 0, 1, 2). Ihre Grundzustandsenergien sind positiv.


Fermionen mit halbzahligem Spin (zum Beispiel Spin 1/2) sind die Bausteine der gewöhnlichen Materie. Ihre Grundzustandsenergien sind negativ.

(Abb. 2.13)
 Alle bekannten Teilchen im Universum gehören zu einer von zwei Gruppen, zu den Fermionen oder zu den Bosonen. Fermionen sind Teilchen mit halbzahligem Spin (zum Beispiel Spin 1/2). Aus ihnen besteht gewöhnliche Materie. Ihre Grundzustandsenergien sind negativ. Bosonen sind Teilchen mit ganzzahligem Spin (zum Beispiel 0, 1, 2) und für die Kräfte zwischen den Fermionen verantwortlich, etwa die Gravitations- und die elektromagnetische Kraft. Ihre Grundzustandsenergien sind positiv. Der Supersymmetrie zufolge hat jedes Fermion und jedes Boson einen Superpartner, dessen Spin entweder 1/2 größer oder 1/2 kleiner als der eigene ist.


Beispielsweise hat ein Photon (das ein Boson ist) einen Spin von 1. Seine Grundzustandsenergie ist positiv. Der Superpartner des Photons, das Photino, hat einen Spin von 1/2, ist also ein Fermion. Daher ist seine Grundzustandsenergie negativ. Aufgrund der Supersymmetrie gibt es in supersymmetrischen Theorien immer genauso viele Bosonen wie Fermionen. Die Grundzustandsenergien der Bosonen, die auf der positiven Seite zu Buche schlagen, und die der Fermionen, die auf der negativen Seite zu Buche schlagen, heben einander daher exakt auf, so daß die problematischsten Unendlichkeiten beseitigt werden.

MODELLE DES TEILCHENVERHALTENS


- 1 Wenn Punktteilchen tatsächlich diskrete Objekte wären wie Billardkugeln, würden sie nach einem Zusammenstoß in neue Bahnen gelenkt werden.





Punkt des Zusammenstoßens
- 2 Ähnliches scheint zu geschehen, wenn zwei Elementarteilchen wechselwirken; allerdings ist der Effekt viel dramatischer.



Wechselwirkungspunkt
- 3 Die Quantenfeldtheorie zeigt, daß zwei Teilchen, etwa ein Elektron und sein Antiteilchen, ein Positron, sich beim Zusammenstoß kurz vernichten, woraufhin in einem heftigen Energieausbruch ein Photon entsteht. Anschließend setzt dieses seine Energie frei und erzeugt ein weiteres Elektron-Positron-Paar. Immer noch erweckt dies den Anschein, als würden die Teilchen nur auf neue Bahnen gelenkt.


- 4 Wenn Teilchen keine nulldimensionalen Punkte, sondern eindimensionale Strings sind, bei denen die oszillierenden Schleifen als ein Elektron und ein Positron schwingen, die sich im Zusammenstoß gegenseitig vernichten, erzeugen sie einen neuen String mit einem anderen Schwingungsmuster. Nach Freisetzung von Energie teilt er sich in zwei Strings auf, die ihren Weg auf neuen Bahnen fortsetzen.


- 5 Wenn wir von diesen ursprünglichen Strings keine vereinzelt Momentaufnahmen betrachten, sondern ihre Wechselwirkung als eine kontinuierliche Geschichte in der Zeit darstellen, dann sehen wir den Prozeß als eine String-Weltfläche.





(Abb. 2.14, gegenüber)
STRINGSCHWINGUNGEN
 In der Stringtheorie sind die fundamentalen Objekte nicht Teilchen, die einen einzigen Punkt im Raum einnehmen, sondern eindimensionale Fäden, genannt Strings. Diese Strings können Enden haben oder sich mit sich selbst zu geschlossenen Schleifen verbinden. Genau wie die Saiten einer Geige besitzen die Strings in der Stringtheorie bestimmte Resonanzschwingungsmuster mit Resonanzfrequenzen, deren Wellenlängen genau auf die Länge des String passen. Doch während die verschiedenen Resonanzfrequenzen von Violinsaiten unterschiedliche Töne erzeugen, rufen die verschiedenen Schwingungen eines String verschiedene Massen und Kraftladungen hervor, die als verschiedene Elementarteilchen interpretiert werden. Grob gesagt, je kürzer die Wellenlänge der Stringschwingung, desto größer die Masse des Teilchens.


von Fermionen - Feldern, deren Spin halbzahlig ist ($1/2$, $3/2$ usw.) - negativ sind. Da es eine gleiche Anzahl von Bosonen und Fermionen gibt, heben sich die größten Unendlichkeiten in den Supergravitationstheorien auf (Abb. 2.13, S.58).

Es bestand aber weiterhin die Möglichkeit, daß kleinere, aber immer noch unendliche Größen übrigblieben. Niemand hatte die Geduld, die erforderlich gewesen wäre, um auszurechnen, ob diese Theorien tatsächlich vollkommen endlich seien. Man schätzte, daß ein begabter Student dafür zweihundert Jahre brauchte. Und wer hätte sagen können, ob er nicht auf der zweiten Seite einen Fehler gemacht hätte? Trotzdem war man bis 1985 allgemein der Auffassung, daß die meisten supersymmetrischen Supergravitationstheorien frei von Unendlichkeiten seien.

Dann änderte sich die Mode plötzlich. Jetzt behaupteten Wissenschaftler, es gebe keinen Grund, in Supergravitationstheorien keine Unendlichkeiten zu erwarten, also hätten sie grundsätzliche Mängel. Statt dessen vertraten viele nun die Auffassung, eine Theorie namens supersymmetrische Stringtheorie sei die einzige Möglichkeit, die Gravitation mit der Quantentheorie zu verbinden. Strings (Fäden, Saiten) sind wie ihre Namensvettern aus der Alltagswelt eindimensionale, ausgedehnte Objekte. Sie besitzen nur Länge. In der Stringtheorie bewegen sie sich durch den Raumzeithintergrund. Verschiedene Schwingungszustände des String werden als verschiedene Teilchen interpretiert (Abb. 2.14).

Wenn die Strings neben ihren normalzahligen Dimensionen der Zeit und des Raums zusätzlich noch Grassmann-Dimensionen haben, können sie je nach Schwingungszustand Bosonen oder Fermionen entsprechen. In diesem Fall heben sich die positiven und negativen Grundzustandsenergien so exakt auf, daß keine Unendlichkeiten übrigbleiben - auch nicht von der kleineren Art. Die Theorie solcher supersymmetrischen Strings oder Superstrings, so war zu hören, sei die allumfassende »Theorie für Alles«.

Zukünftige Wissenschaftshistoriker werden einmal mit großem Interesse das an Gezeiten erinnernde Auf und Ab im Meinungsbild der theoretischen Physiker studieren. Einige Jahre lang herrschten die Strings unangefochten, während die Supergravitation als bloße Näherungstheorie abgetan wurde, gültig nur bei niedrigen Energien. Die Einschränkung »niedrige Energien« galt als besonders vernichtendes Urteil, obwohl in diesem Fall »niedrige Energien« alle Teilchen umfaßt, deren Energien weniger als eine Milliarde milliardenmal größer sind als die Energien von Teilchen in einer TNT-Explosion. Wenn die Supergravitation aber nur eine Näherung für niedrige Energien war, dann konnte sie nicht den Anspruch erheben, eine fundamentale Theorie des Universums zu sein. Statt dessen nahm man an, die Theorie für Alles sei eine der fünf möglichen Superstringtheorien. Doch welche der fünf Stringtheorien beschrieb unser Universum? Und wie ließ sich eine Stringtheorie formulieren, die



nicht bloß eine Näherung war, in der Strings als Flächen mit einer räumlichen und einer zeitlichen Dimension in einem flachen Raumzeithintergrund abgebildet wurden? Gelang es den Strings nicht, den Raumzeithintergrund zu krümmen?

In den Jahren nach 1985 kristallisierte sich allmählich heraus, daß die Stringtheorie noch nicht das vollständige Bild lieferte. Strings, so stellte sich zunächst heraus, sind nur ein Element in einer großen Klasse von Objekten, zu der auch Gebilde gehören, die in mehr als einer Dimension ausgedehnt sind. Paul Townsend, der wie ich dem Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics (DAMTP) der Universität Cambridge angehört und viel grundlegende Arbeit über diese Objekte geleistet hat, taufte sie auf den Namen »p-Branen«. Eine p-Bran ist ein in p Raumrichtungen ausgedehntes Objekt. Demzufolge ist eine 1-Bran ein String, eine 2-Bran eine zweidimensionale Fläche und so fort (Abb. 2.15). Es scheint keinen Grund zu geben, den String-





Fall $p = 1$ anderen möglichen Werten von p vorzuziehen. Statt dessen sollten wir das Prinzip der Branen-Demokratie akzeptieren: Alle p -Branen sind gleich geschaffen.

Alle p -Branen lassen sich als Lösungen der Gleichungen von Supergravitationstheorien in zehn oder elf Dimensionen finden. Zwar scheinen zehn oder elf Dimensionen wenig mit der Raumzeit unserer Erfahrung zu tun zu haben, doch man ging von der Überlegung aus, die anderen sechs oder sieben Dimensionen seien so klein aufgewickelt, daß wir sie nicht bemerken. Wir nehmen nur die verbleibenden vier großen und fast flachen Dimensionen wahr.

Ich muß bekennen, daß ich mich bislang schwer getan habe, an zusätzliche Dimensionen zu glauben. Doch da ich Positivist bin, hat die Frage »Gibt es wirklich zusätzliche Dimensionen?« keine Bedeutung für mich. Sinn macht es allenfalls, zu fragen, ob mathematische Modelle mit zusätzlichen Dimensionen eine gute Beschreibung des Universums liefern. Noch liegen uns keinerlei Beobachtungen vor, die sich nur mittels zusätzlicher Dimensionen erklären ließen. Es besteht allerdings die Möglichkeit, daß wir mit dem zur Zeit im Bau befindlichen Large Hadron Collider - dem großen Hadronen-Speicherring - in Genf solche Beobachtungen machen werden. Doch eine Tatsache hat viele Fachleute, auch mich, davon überzeugt, daß wir die erwähnten Modelle mit ihren zusätzlichen Dimensionen ernst nehmen müssen: Es gibt ein Geflecht von unerwarteten Beziehungen, sogenannten Dualitäten, zwischen den vielen verschiedenen höherdimensionalen Modellen. Diese Dualitäten zeigen, dass die Modelle alle im wesentlichen äquivalent sind, das heißt, nur verschiedene Aspekte derselben zugrunde liegenden Theorie darstellen, die den Namen M-Theorie erhalten hat. Das Geflecht von Dualitäten nicht als Zeichen zu werten, daß wir auf der richtigen Spur sind, wäre etwa so, als würden wir glauben, Gott habe Fossilien in die Gesteinschichten geschmuggelt, um Darwin bezüglich der Evolution des Lebens irrezuführen.

(Abb.2.15)
P-BRANEN
Eine p -Bran ist ein in p Raumrichtungen ausgedehntes Objekt. Sonderfälle sind Strings ($p = 1$) und Membranen ($p = 2$), doch sind in einer zehn- oder elfdimensionalen Raumzeit auch größere Werte von p möglich. Oft sind alle oder einige der p Dimensionen aufgerollt wie ein Torus.

Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich:
Alle p -Branen sind gleich geschaffen.



Paul Townsend




Der Raum unseres Universums könnte sowohl ausgedehnte als auch aufgewickelte Dimensionen besitzen. Die Membranen sind besser zu erkennen, wenn sie aufgewickelt sind.

1-Bran oder String im aufgewickelten Zustand


Zu einem Torus aufgewickelte 2-Bran-Fläche



(Abb. 2.16)
EIN VEREINHEITLICHTER THEORETISCHER RAHMEN?



Es gibt ein Netz von Beziehungen, die sogenannten Dualitäten, die alle fünf Stringtheorien und die elfdimensionale Supergravitation miteinander verbinden. Die Dualitäten lassen darauf schließen, daß die verschiedenen Stringtheorien einfach verschiedene Ausdrücke derselben zugrunde liegenden Theorie sind, die man als M-Theorie bezeichnet.




Bis zur Mitte der neunziger Jahre schien es, als gäbe es fünf verschiedene Stringtheorien, jede separat und für sich.



Die M-Theorie vereinigt die fünf Stringtheorien in einem einzigen theoretischen Rahmen, allerdings ist sie bei weitem noch nicht vollständig verstanden.

Wie die Dualitäten erkennen lassen, beschreiben die fünf Superstringtheorien alle die gleiche Physik, mit der zudem auch die Supergravitation äquivalent ist (Abb. 2.16). Man kann nicht sagen, daß die Superstringtheorien fundamentaler sind als die Supergravitation oder umgekehrt, vielmehr sind allesamt einfach verschiedene Ausschnitte aus ein und derselben zugrunde liegenden Theorie. Sie alle erweisen sich in unterschiedlichen Situationen als nützliche Rechenwerkzeuge. Da Stringtheorien keine Unendlichkeiten haben, eignen sie sich gut, um zu berechnen, was passiert, wenn einige wenige sehr energiereiche Teilchen zusammenstoßen und aneinander streuen. Von geringerem Nutzen sind sie dagegen, wenn wir beschreiben wollen, wie die Energie einer sehr großen Zahl von Teilchen das Universum krümmt oder zu einem gebundenen Zustand führt, wie etwa einem Schwarzen Loch. Für solche Situationen brauchen wir die Supergravitation, die im Grunde genommen Einsteins Theorie der gekrümmten Raumzeit ist, allerdings erweitert um einige zusätzliche Materiearten. Von ihr werde ich im folgenden hauptsächlich ausgehen.

Um zu beschreiben, wie die Quantentheorie Zeit und Raum formt, ist es nützlich, die Idee der imaginären Zeit einzuführen. Imaginäre Zeit hört sich ein bißchen nach Science-fiction an, ist aber ein wohldefiniertes mathematisches Konzept: Es ist Zeit, die durch sogenannte imaginäre Zahlen angegeben wird. Man kann sich gewöhnliche reelle Zahlen wie 1, 2, -3, 5 und so fort als Punkte auf einer sich von links nach rechts erstreckenden waagerechten



(Abb. 2.17)
 Man kann ein mathematisches Modell konstruieren, in dem die Richtung einer imaginären Zeit rechtwinklig zur gewöhnlichen reellen Zeit verläuft. Die Regeln des Modells bestimmen die Geschichte in der imaginären Zeit abhängig von der Geschichte in der reellen Zeit und umgekehrt.




Linie vorstellen: die Null in der Mitte, die positiven reellen Zahlen rechts und die negativen reellen Zahlen links von ihr (Abb. 2.17).

Imaginäre Zahlen lassen sich dann als Punkte auf einer senkrechten Linie darstellen: Die Null ist wieder in der Mitte, die positiven imaginären Zahlen sind nach oben, die negativen imaginären Zahlen nach unten abgebildet. Imaginäre Zahlen können wir also als eine neue Art von Zahlen begreifen, die rechtwinklig zu den reellen Zahlen verlaufen. Da sie ein mathematisches Konstrukt sind, bedürfen sie keiner Entsprechung in der konkreten Wirklichkeit: Niemand kann eine imaginäre Zahl von Apfelsinen kaufen oder eine imaginäre Kreditkartenrechnung erhalten (Abb. 2.18).

Man könnte also meinen, imaginäre Zahlen seien lediglich eine mathematische Spielerei, die nichts mit der realen Welt zu tun habe. Aus positivistischer Sicht läßt sich jedoch nicht bestimmen, was real ist. Wir können lediglich nach den mathematischen Modellen suchen, die das Universum beschreiben, in dem wir leben. Wie sich herausstellt, sagt ein mathematisches Modell, das die imaginäre Zeit einbezieht, nicht nur Effekte voraus, die wir bereits beobachtet haben, sondern auch solche, die wir noch nicht messen können, von deren Vorhandensein wir aber aus anderen Gründen überzeugt sind. Also, was ist real/reell und was imaginär? Gibt es die Unterscheidung nur in unserem Denken?

Einsteins klassische (das heißt nicht quantentheoretische) allgemeine Relativitätstheorie vereinigt die reelle Zeit und die drei Dimensionen des Raums zu einer vierdimensionalen Raumzeit. Aber die reelle Zeitrichtung ist von den drei Richtungen des Raums unterschieden: Entlang der Weltlinie oder Geschichte eines Beobachters kann die reelle Zeit nur zu-, aber niemals abnehmen – der Beob-

(Abb. 2.18)
 Imaginäre Zahlen sind ein mathematisches Konstrukt. Sie können keine Kreditkartenrechnung über imaginäre Geldbeträge erhalten.



(Abb. 2.19)
In der reellen Raumzeit der klassischen allgemeinen Relativitätstheorie unterscheidet sich die Zeit von den Raumrichtungen dadurch, daß sie entlang der Geschichte eines Beobachters nur zunehmen kann, anders als die Raumrichtungen, deren Koordinatenwerte entlang dieser Geschichte zu- oder abnehmen können.

bachter bewegt sich immer in dieselbe Zeitrichtung. Bezüglich des Raums kann er seine Bewegungsrichtung beliebig ändern (Abb. 2.19).

Doch da sich die imaginäre Zeit rechtwinklig zur reellen Zeit erstreckt, verhält sie sich wie eine vierte räumliche Richtung. Damit verfügt sie über ein weit breiteres Spektrum an Möglichkeiten als das Eisenbahngleis der reellen Zeit, das nur einen Anfang oder ein Ende haben oder kreisförmig verlaufen kann. In diesem imaginären Sinne hat die Zeit eine Form.

Schauen wir uns einige der Möglichkeiten an, indem wir eine Raumzeit mit imaginärer Zeit betrachten, die eine Kugel ist, wie die Oberfläche

(Abb. 2.20)

IMAGINÄRE ZEIT

In einer imaginären Raumzeit, die eine Kugel ist, könnte die imaginäre Zeitrichtung die Entfernung zum Südpol sein. Wenn man sich nordwärts bewegt, werden die Breitenkreise in gleichbleibenden Abständen vom Südpol größer, was einem Universum entspricht, das mit der imaginären Zeit expandiert. Am Äquator würde das Universum seine maximale Größe erreichen und sich dann mit anwachsender imaginärer Zeit wieder zusammenziehen, bis es am Nordpol zu einem einzigen Punkt geschrumpft wäre. Zwar hätte das Universum an den Polen die Größe null, aber diese Punkte wären keine Singularitäten, genauso wie der Nord- und der Südpol auf der Erdoberfläche vollkommen nichtsinguläre Punkte sind. Daraus ergibt sich, daß der Ursprung des Universums in imaginärer Zeit ein regelmäßiger Punkt in der Raumzeit sein könnte.



S

Imaginäre Zeit als geographische Breite



N

Imaginäre Zeit als geographische Länge, mit Längengraden, die sich am Nord- und Südpol treffen.

(Abb. 2.21)

Statt der Breitengrade könnte die imaginäre Zeitrichtung in einer Raumzeit, die eine Kugel ist, auch den Längengraden entsprechen. Da sich alle Längengraden im Nord- und Südpol treffen, kommt die Zeit an den Polen zum Stillstand. Bei Zunahme der imaginären Zeit bliebe man am gleichen Fleck, genauso wie man am Nordpol bleibt, wenn man von ihm aus nach Westen geht



Die Formel für die Entropie des Schwarzen Lochs - die der Anzahl seiner möglichen inneren Zustände entspricht - deutet darauf hin, daß Information, die in das Schwarze Loch fällt, wie auf einer Langspielplatte gespeichert und wiedergegeben wird, wenn das Schwarze Loch verdampft.

che der Erde. Nehmen wir an, die imaginäre Zeit entspräche den Breitengraden (Abb. 2.20, S. 69). Dann begänne die Geschichte des Universums in imaginärer Zeit am Südpol. Es hätte keinen Sinn zu fragen: »Was geschah vor dem Anfang?« Solche imaginären Zeiten sind einfach nicht definiert, so wenig, wie es Punkte südlich des Südpols gibt. Der Südpol ist ein vollkommen regelmäßiger Punkt auf der Erdoberfläche, für den die gleichen Gesetze gelten wie für die anderen Punkte. Das läßt den Schluß zu, daß der Anfang des Universums in imaginärer Zeit ein regelmäßiger Raumzeitpunkt sein kann und daß für den Anfang die gleichen Gesetze gelten können wie für den Rest des Universums. (Ursprung und Entwicklung des Universums aus quantentheoretischer Sicht werde ich im nächsten Kapitel erörtern.)

Ein anderes mögliches Verhalten wird erkennbar, wenn wir die Längengrade der Erde als imaginäre Zeit nehmen. Alle Längengrade treffen sich sowohl am Nord- als auch am Südpol (Abb. 2.21, S.69). Dort steht die Zeit still, das heißt, auch bei einer Zunahme der imaginären Zeit oder der Längengrade bleibt man am gleichen Fleck - ganz ähnlich wie am Horizont eines Schwarzen Lochs, wo die gewöhnliche Zeit zum Stillstand zu kommen scheint. Aus diesem Stillstand der realen und der imaginären Zeit (entweder kommen beide zum Stillstand oder keine) folgt, daß die Raumzeit eine Temperatur besitzt - eine Tatsache, die ich für Schwarze Löcher nachgewiesen habe. Einem Schwarzen Loch kann man nicht nur eine Temperatur zuordnen, es verhält sich auch so, als hätte es eine Größe namens Entropie. Die Entropie ist ein Maß für die Zahl der inneren Zustände (der möglichen inneren Konfigurationen), die ein Schwarzes Loch aufweisen könnte, ohne einem äußeren Beobachter, der nur seine Masse, Rotation und Ladung wahrnehmen kann, in irgendeiner Hinsicht anders zu erscheinen. Diese Entropie Schwarzer Löcher läßt sich durch eine sehr einfache Formel ausdrücken, die ich 1974 entdeckt habe. Sie ist proportional zur Horizontfläche des Schwarzen Lochs: In angemessenen Einheiten entspricht jedem Bit Information über den inneren Zustand des Schwarzen Lochs eine Flächeneinheit des Horizonts. Dies legt eine tiefreichende Verbindung zwischen Quantengravitation und der Thermodynamik nahe - der Wärmelehre, zu der auch die Beschäftigung mit der Entropie gehört - und weist zudem darauf hin, daß die Quantengravitation eine Eigenschaft zu besitzen scheint, die als Holographie bezeichnet wird (Abb. 2.22, S. 73).

Informationen über die Quantenzustände in einer Region der Raumzeit könnten in irgendeiner Weise auf dem Rand der Region kodiert sein, der zwei Dimensionen weniger aufweist als die Region selbst. Dies würde der Art und Weise ähneln, wie ein Hologramm ein dreidimensionales Bild auf einer zweidimensionalen Fläche wiedergibt.

$$S = \frac{Akc^3}{4\hbar G}$$


DIE FORMEL DER SCHWARZLOCHENTROPIE

- A** Fläche des Ereignishorizonts des Schwarzen Lochs
- \hbar** Plancksches Wirkungsquantum
- k** Boltzmann-Konstante
- G** Gravitationskonstante
- c** Lichtgeschwindigkeit




DAS HOLOGRAPHISCHE PRINZIP

Die Erkenntnis, daß die Fläche des Horizonts, der ein Schwarzes Loch umgibt, ein Maß für dessen Entropie ist, hat zu der Auffassung geführt, die maximale Entropie jeder geschlossenen Raumregion könne nie mehr als ein Viertel der sie umschließenden Fläche ausmachen. Da Entropie nichts anderes als ein Maß für die Gesamtinformation in einem System ist, liegt der Schluß nahe, daß die Informationen, die mit allen Phänomenen in der dreidimensionalen Welt assoziiert sind, ähnlich wie bei einem holographischen Bild auf einer zweidimensionalen Randfläche gespeichert werden könnten. In gewissem Sinne wäre die Welt somit zweidimensional.



Selbst ein winziger Bruchteil der zweidimensionalen holographischen Platte enthält genügend Information, um das ganze dreidimensionale Bild eines Apfels zu rekonstruieren.

Wenn in der Quantengravitation tatsächlich ein solches holographisches Prinzip gilt, könnten wir unter Umständen erfassen, was sich im Innern von Schwarzen Löchern befindet. Das wäre von entscheidender Bedeutung, um die Strahlung Schwarzer Löcher vorherzusagen. Solange wir dazu nicht in der Lage sind, können wir die Zukunft nicht so vollständig vorhersagen, wie wir gedacht haben. Davon wird in Kapitel 4 die Rede sein. Auf die Holographie werden wir in Kapitel 7 noch einmal zurückkommen. Es könnte sein, daß wir auf einer 3-Bran leben, einer vierdimensionalen Fläche (drei Raumdimensionen plus eine Zeitdimension), die der Rand einer fünfdimensionalen Raumzeitregion ist. Der Zustand der Branwelt kodiert, was in der fünfdimensionalen Region vor sich geht.



(Abb. 2.22)

Die Holographie ist ein Phänomen, das auf der Interferenz von Wellenmustern beruht. Hologramme entstehen, wenn das Licht eines Lasers in zwei getrennte Strahlen A und B geteilt wird. Einer, B, fällt auf das Objekt C und wird auf eine fotoempfindliche Platte D zurückgeworfen. Der andere wird durch eine Linse E gelenkt und stößt mit dem reflektierten Licht von B zusammen, wodurch ein Interferenzmuster auf der Platte erzeugt wird. Wenn man nun einen Laser durch die entwickelte Platte

schickt, entsteht ein vollständiges dreidimensionales Bild des ursprünglichen Objekts. Der Beobachter kann dieses holographische Bild umrunden und all die verborgenen Flächen betrachten, die ein normales Foto nicht zeigen würde. Die zweidimensionale Fläche der Platte links hat im Gegensatz zu einem normalen Foto die bemerkenswerte Eigenschaft, daß bereits ein winziger Ausschnitt alle Information enthält, die erforderlich ist, um das Gesamtbild zu rekonstruieren.

KAPITEL 3

DAS UNIVERSUM IN EINER NUßSCHALE

*Das Universum hat viele Geschichten,
von denen jede durch eine winzige Nuß bestimmt wird.*





*O Gott, ich könnte in eine Nußschale eingesperrt sein
und mich für einen König
von unermeßlichem Gebiete halten...*

Shakespeare,
Hamlet, 2. Aufzug, 2. Szene

Obwohl wir Menschen physischen Einschränkungen unterworfen sind - mag Hamlet gemeint haben -, können unsere Gedanken frei und ungebunden das Universum erforschen und sich in Regionen vorwagen, die sogar *Star Trek* scheut - soweit es die bösen Träume zulassen.

Ist das Universum unendlich oder nur sehr groß? Und ist es von ewiger Dauer oder nur sehr langlebig? Wie können wir mit unserem begrenzten Verstand ein unbegrenztes Universum begreifen? Ist nicht schon der Versuch vermessen? Laufen wir nicht Gefahr, das Schicksal des Prometheus zu erleiden, der, wie wir aus der griechischen Mythologie wissen, Zeus das Feuer stiehlt und den Menschen übergibt, woraufhin er für seine Kühnheit an einen Felsen gekettet wird, wo seine Leber einem Adler zum Fraß dient?

Trotz dieser zur Vorsicht mahnenden Sage glaube ich, daß wir versuchen können und sollten, das Universum zu verstehen. Wir haben dabei schon bemerkenswerte Fortschritte erzielt, vor allem in den letzten Jahren. Noch ist das Bild nicht vollständig, aber möglicherweise fehlt nicht mehr viel daran.

Die auffälligste Eigenschaft des Weltraums ist der Umstand, daß er immer weiter und weiter reicht. Das haben moderne Beobachtungsinstrumente wie das Hubble-Teleskop bestätigt, die es uns ermöglichen, tief in den Weltraum hineinzublicken. Unserem Blick erschließen sich Milliarden und Abermilliarden Galaxien verschiedener Form und Größe (Abb. 3.1, S. 78). Jede Galaxie enthält ungezählte Milliarden von Sternen, und viele werden von Planeten umkreist. Wir leben auf einem Planeten, der zu einem Stern in einem äußeren Arm der Spiralgalaxie Milchstraße gehört. Der Staub der Spiralarme nimmt uns die Sicht auf das Universum in der Ebene der Galaxie, aber in zwei kegelförmige Raumgebiete zu beiden Seiten der galaktischen Ebene haben wir freie Sicht, so daß wir die Positionen ferner Galaxien bestimmen können (Abb. 3.2). Wir stellen fest, daß die Galaxien im großen und ganzen gleichförmig im All verteilt



*Links: Die Linse und die Spiegel des Hubble-Weltraumteleskops werden durch eine Spaceshuttle-Mission aufgerüstet. Unten ist Australien zu erkennen.
Oben: Prometheus. Etruskische Vasenmalerei, 6. Jahrhundert v. Chr.*




Spiralgalaxie NGC 4414




Balkenpiralgalaxie NGC 4313



Elliptische Galaxie NGC 147



(Abb. 3.1)
Wenn wir tief ins Universum hineinschauen, erblicken wir Milliarden und Abermilliarden von Galaxien. Galaxien können unterschiedliche Formen und Größen haben; sie können beispielsweise elliptisch sein oder spiralförmig wie unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße.



(Abb. 3.2)
Unser Planet Erde (E) umkreist die Sonne in einer äußeren Region der Spiralgalaxie Milchstraße. Der Sternstaub in den Spiralarmen verwehrt uns den Blick in der Ebene der Galaxie, aber wir haben einen ungehinderten Blick zu beiden Seiten der Ebene.

sind, allerdings mit einigen lokalen Gebieten höherer Galaxiendichte und einigen Lücken niedrigerer Dichte. Zwar scheint die Galaxiendichte nach dem, was in unseren Teleskopen sichtbar ist, in sehr großen Distanzen abzunehmen, aber der Schein trügt - die dort befindlichen Galaxien sind so weit entfernt und daher so lichtschwach, daß wir viele von ihnen wegen des beschränkten Leistungsvermögens unserer Teleskope nicht wahrnehmen können. Soweit wir sehen können, setzt sich das Universum im Raum grenzenlos fort (Abb. 3.3, S. 80).

Während das Universum überall im Raum weitgehend gleich zu sein scheint, verändert es sich eindeutig in der Zeit. Das wurde erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt. Bis dahin glaubte man, das Universum sei in der Zeit nur einem unwesentlichen Wandel unterworfen. Man könnte meinen, eine solche Unveränderlichkeit verträge sich sehr gut mit einem Universum, das schon seit ewigen Zeiten existiert. Doch eine genauere Betrachtung zeigt, daß diese Annahme zu absurden Schlußfolgerungen führt. Wenn die Sterne schon unendlich lange strahlen würden, hätten sie längst das ganze Universum




(Abb. 3.3)
Von einigen lokalen Konzentrationen abgesehen, sind die Galaxien weitgehend gleichmäßig im Raum verteilt.

Universum auf ihre eigene Temperatur erhitzt. Auch bei Nacht wäre der gesamte Himmel so hell wie die Sonne, weil jede Sichtlinie entweder an einem Stern oder an einer Staubwolke enden würde, die auf die Temperatur der Sterne erhitzt worden wäre (Abb. 3.4).

Die uns allen vertraute Beobachtung, daß der Himmel bei Nacht dunkel ist, erweist sich somit als sehr bedeutend. Das Universum kann, so folgt aus ihr, nicht seit ewigen Zeiten in dem Zustand existiert haben, in dem wir es heute erblicken. Irgendein Ereignis in der Vergangenheit muß die Sterne dazu veranlaßt haben, sich erst vor unendlicher Zeit zu entzünden, so daß das Licht sehr ferner Sterne noch keine Zeit gehabt hat, uns zu erreichen. Das würde erklären, warum der Nachthimmel nicht in jeder Richtung hell erstrahlt.


Wenn es die Sterne schon immer gegeben hätte, warum sollten sie dann vor ein paar Milliarden Jahren plötzlich entflammt sein? Was für eine Uhr hätte ihnen sagen können, daß es an der Zeit sei, mit dem



(Abb. 3.4)
Wäre das Universum statisch und in jeder Richtung unendlich, würde jede Sichtlinie an einem Stern enden, so daß der Nachthimmel hell wie die Oberfläche der Sonne wäre.

Leuchten zu beginnen? Philosophen, die glaubten, das Universum gebe es schon ewig, hat diese Frage, wie wir gesehen haben, große Rätsel aufgegeben. Doch für die meisten Menschen paßten die Beobachtungen zu ihrer Überzeugung, das Universum sei -weitgehend in seiner heutigen Gestalt - erst vor einigen tausend Jahren erschaffen worden.

Zweifel an dieser Vorstellung brachten die Beobachtungen von Vesto Slipher und Edwin Hubble im zweiten und dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. 1923 entdeckte Hubble, daß viele schwache Lichtflecken am Himmel, sogenannte Nebel, in Wirklichkeit andere Galaxien sind, gewaltige Ansammlungen von Sternen wie unsere Sonne, nur weiter entfernt. So klein und lichtschwach können sie nur erscheinen, wenn sie sehr weit entfernt sind, so daß ihr Licht Millionen oder gar Milliarden Jahre braucht, um uns zu erreichen. Diese Beobachtung führte zu dem Schluß, daß der Anfang des Universums




DER DOPPLER-EFFEKT

Die Beziehung zwischen Geschwindigkeit und Wellenlänge, die man Doppler-Effekt nennt, ist eine Alltagserfahrung.

Lauschen Sie auf ein Flugzeug, das über Ihnen vorbeifliegt: Nähert es sich, klingt sein Motorengeräusch höher, als wenn es sich von Ihnen entfernt. Der höhere Ton entspricht Schallwellen mit kürzeren Wellenlängen (dem Abstand zwischen einem Wellenkamm und dem nächsten) und einer höheren Frequenz (der Zahl der Schwingungen pro Zeiteinheit).

Der Grund ist folgender: Bewegt sich das Flugzeug auf Sie zu, ist es Ihnen ein Stück nähergekommen, wenn es den nächsten Wellenkamm erzeugt, wodurch sich der Abstand zwischen den Wellenkämmen verringert. Umgekehrt werden die Wellenlängen größer und die von Ihnen wahrgenommenen Töne tiefer, wenn sich das Flugzeug entfernt.



nicht erst ein paar tausend Jahre zurückliegen kann.

Die zweite Entdeckung, die Hubble machte, war noch bemerkenswerter. Die Astronomen hatten gelernt, das Licht anderer Galaxien zu analysieren und zu bestimmen, ob sie sich von uns fort oder auf uns zu bewegen (Abb. 3.5). Zu ihrer großen Überraschung fanden sie heraus, daß sich fast alle Galaxien von uns fort bewegen. Mehr noch, je weiter sie von uns entfernt sind, desto rascher bewegen sie sich von uns fort. Hubble erkannte, daß dieser Umstand von entscheidender Bedeutung für das Universum als Ganzes ist: Großräumig betrachtet, bewegen sich alle Galaxien voneinander fort. Das Universum expandiert (Abb. 3.6, S. 85).

Diese Entdeckung war eine der revolutionärsten Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts. Sie kam völlig überraschend und veränderte unsere Überlegungen zum Ursprung des Universums von Grund auf. Wenn sich die Galaxien voneinander fort bewegen, müssen sie in der Vergangenheit näher zusammen gewesen sein. Aus der gegenwärtigen

(Abb. 3.5)

Der Doppler-Effekt tritt auch bei Lichtwellen auf. Wenn eine Galaxie in konstanter Entfernung von der Erde ruht, zeigen sich im Spektrum an ganz bestimmten Stellen charakteristische Linien. Bewegt sich die Galaxie hingegen von uns fort, erscheinen die Wellen länglich oder gestreckt, und die charakteristischen Linien sind zu rötlichen Wellenlängen hin verschoben (rechts). Bewegt sich die Galaxie auf uns zu, erscheinen die Wellen komprimiert, und die Linien sind blauverschoben (links).



Unsere Nachbargalaxie, der Andromedanebel, aufgenommen von Hubble und Slipher

CHRONOLOGIE DER ENTDECKUNGEN VON SLIPHER UND HUBBLE ZWISCHEN 1910 UND 1930

1912: Slipher mißt das Licht von vier Nebeln und stellt fest, daß drei von ihnen rotverschoben sind, der Andromedanebel hingegen eine Blauverschiebung zeigt. Seine Deutung: Andromeda bewegt sich auf uns zu, während sich die anderen Nebel von uns entfernen.

1912-1914: Slipher mißt die Doppler-Verschiebung von zwölf weiteren Nebeln. Alle außer einem sind rotverschoben.

1914: Slipher berichtet auf einem Treffen der American Astronomical Society über seine Ergebnisse. Hubble hört den Vortrag.

1918: Hubble beginnt die Nebel zu untersuchen.

1923: Hubble findet heraus, daß die Spiralnebel (einschließlich Andromeda) andere Galaxien sind.

1914-1925: Slipher und andere messen weitere Doppler-Verschiebungen. 1925 waren 43 Rotverschiebungen und zwei Blauverschiebungen erfaßt.

1929: Hubble und Milton Humason, die weiterhin Doppler-Verschiebungen gemessen und dabei festgestellt haben, daß sich großräumig betrachtet, alle Galaxien voneinander zu entfernen scheinen, geben ihre Entdeckung bekannt, daß das Universum expandiert.



Expansionsrate läßt sich berechnen, daß sie vor zehn bis fünfzehn Milliarden Jahren sehr nahe beieinander gewesen sein müssen. Wie im letzten Kapitel geschildert, konnten Roger Penrose und ich zeigen, daß Einsteins allgemeine Relativitätstheorie auf einen Anfang des Universums und sogar einen Anfang der Zeit selbst in einer Art gewaltiger Explosion schließen läßt. Damit war erklärt, warum der Himmel bei Nacht dunkel ist: Alle Sterne können höchstens seit zehn bis fünfzehn Milliarden Jahren scheinen.


Wir sind an die Vorstellung gewöhnt, daß Ereignisse durch frühere Ereignisse und diese wiederum durch noch frühere Ereignisse verursacht werden. So erstreckt sich eine Kausalitätskette in die Vergangenheit zurück. Aber nehmen wir an, diese Kette hat einen Anfang. Nehmen wir an, es gibt ein erstes Ereignis. Wodurch wurde es verursacht?




Edwin Hubble 1930 am 2,5-Meter-Teleskop auf dem Mount Wilson

(Abb. 3.6) HUBBLE-GESETZ
Edwin Hubble untersuchte das Licht anderer Galaxien und entdeckte in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, daß sich fast alle Galaxien von uns entfernen, und zwar mit einer Geschwindigkeit V , die proportional zu ihrer Entfernung R von der Erde ist, so daß $V=H \times R$. Diese bedeutsame Beobachtung, das sogenannte Hubble-Gesetz, bewies, daß sich das Universum ausdehnt, wobei die Hubble-

Konstante H die Expansionsgeschwindigkeit angibt. Das Diagramm unten zeigt jüngere Beobachtungen der Rotverschiebung verschiedener Galaxien und bestätigt Hubbles Gesetz bis hin zu riesigen Entfernungen von der Erde. Daß sich die Kurve am Ende leicht nach oben biegt, zeigt an, daß die Expansion mit der Entfernung stärker zunimmt, und könnte ein Hinweis auf den Einfluß der Vakuumenergie sein.





URKNALLMODELLE

Der allgemeinen Relativitätstheorie zufolge hat das Universum mit der Urknallsingularität, einem Zustand von unendlicher Temperatur und Dichte, begonnen. Als es expandierte, kühlte die Strahlungstemperatur ab. Ungefähr eine Hundertstelsekunde nach dem Urknall lag die Temperatur bei 100 Milliarden Grad, und das Universum enthielt überwiegend Photonen, Elektronen und Neutrinos (extrem leichte Teilchen), dazu ihre Antiteilchen sowie einige Protonen und Neutronen - immer vorausgesetzt, die allgemeine Relativitätstheorie hat recht. In den nächsten drei Minuten kühlte das Universum auf rund eine Milliarde Grad ab, woraufhin Protonen und Neutronen sich zu den Atomkernen von Helium, Wasserstoff und anderen leichten Elementen zusammenfanden. Die Kerne der schwereren Elemente, aus denen wir bestehen, Kohlenstoff und Sauerstoff zum Beispiel,

entstanden dagegen erst Milliarden Jahre später bei der Heliumverbrennung im Zentrum von Sternen. Mehrere hunderttausend Jahre nach dem Urknall, als die Temperatur auf einige tausend Grad gefallen war, hatte sich, so die Theorie, die Geschwindigkeit der Elektronen so weit verringert, daß die leichten Kerne sie einfangen und Atome bilden konnten. Dieser Entwurf eines dichten, heißen Frühstadiums des Universums wurde 1948 erstmals von dem Wissenschaftler George Gamow vorgeschlagen, und zwar in einem zusammen mit Ralph Alpher verfaßten Artikel, der die bemerkenswerte Vorhersage enthält, daß die Strahlung dieses sehr heißen Frühstadiums heute noch vorhanden sein müsse. Diese Vorhersage bestätigte sich 1965, als die Physiker Arno Penzias und Robert Wilson die kosmische Hintergrundstrahlung entdeckten.

Es gab nicht viele Wissenschaftler, die Lust hatten, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Man versuchte, sie zu vermeiden, indem man entweder, wie die Russen, behauptete, das Universum habe keinen Anfang, oder indem man erklärte, für den Ursprung des Universums sei nicht die Naturwissenschaft, sondern die Metaphysik oder die Religion zuständig. Ich denke, das ist ein Standpunkt, den kein wirklicher Wissenschaftler vertreten darf. Wenn die Gesetze der Wissenschaft am Anfang des Universums außer Kraft gesetzt wären, könnten sie dann nicht auch zu anderen Zeiten versagen? Ein Gesetz ist kein Gesetz, wenn es nur manchmal gilt. *Wir müssen uns bemühen, den Anfang des Universums mit den Mitteln der Naturwissenschaft zu begreifen. Das mag eine Aufgabe sein, die über unsere Kräfte geht, aber versuchen sollten wir es zumindest.*

Zwar geht aus den Theoremen, die Penrose und ich bewiesen haben, hervor, daß das Universum einen Anfang gehabt haben muß, doch liefern sie über die Natur dieses Anfangs wenig Information. Sie ließen darauf schließen, daß das Universum in einem Urknall begonnen hat, in einem Punkt, in dem das ganze Universum und alles, was in ihm enthalten ist, zu unendlicher Dichte zusammengedrückt war. An diesem Punkt verliert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie ihre Gültigkeit, so daß sie nicht zu der Vorhersage taugt, wie das Universum angefangen hat. So blieb nur der Schluß, der Ursprung des Universums entziehe sich offenbar dem Zugriff der Naturwissenschaft. Damit durften sich die Wissenschaftler jedoch nicht zufriedengeben. Wie in Kapitel 1 und 2 dargelegt, büßt die allgemeine Relativitätstheorie in der Nähe des Urknalls ihre Gültigkeit ein, weil es sich bei ihr um eine sogenannte klassische Theorie handelt. Sie bezieht nicht die Unschärferelation ein, das Zufallselement der Quantentheorie, das Einstein mit dem Einwand abgelehnt hat, der Herrgott würfle nicht. Doch nach allem, was wir heute wissen, hat der liebe Gott eine ziemlich ausgeprägte Spielernatur. Man kann sich das Universum als riesiges Casino vorstellen, in dem bei jeder Gelegenheit Würfel geworfen und Rouletteräder gedreht werden (Abb. 3.7). Nun denken Sie vielleicht, das Betreiben eines Casinos sei ein



sehr ungewisses Geschäft, weil Sie jedesmal, wenn ein Würfel geworfen oder ein Rad gedreht wird, Gefahr laufen, Geld zu verlieren. Doch für eine große Zahl von solchen Ereignissen gleichen sich die Gewinne und Verluste aus und führen zu einem Ergebnis, das sich durchaus vorhersagen läßt, auch wenn wir nicht das Resultat jedes einzelnen Ereignisses prognostizieren können (Abb. 3.8). Casinobetreiber sorgen dafür, daß die Wahrscheinlichkeit im Durchschnitt zu ihren Gunsten ausfällt - das ist der Grund, warum sie so reich sind. Unsere einzige Chance, gegen sie zu gewinnen, liegt darin, all unser Geld nur auf wenige Würfe des Würfels oder auf wenige Umdrehungen des Rouletterades zu setzen.



Das gleiche gilt fürs Universum. Wenn es, wie heute, groß ist, gibt es eine sehr große Zahl von Würfelwürfen, die sich zu einem vorher-sagbaren Ergebnis mitteln. Daher sind die klassischen Gesetze mit ihren exakten Vorhersagen für große Systeme gültig. Doch wenn das Universum sehr klein ist, wie zu einer Zeit kurz nach dem Urknall, gibt es nur eine kleine Zahl von Würfelwürfen, so daß die Unschärfelation große Bedeutung gewinnt.


Da das Universum ständig würfelt, um zu sehen, was als nächstes geschieht, hat es nicht nur eine einzige Geschichte, wie man denken könnte, sondern jede irgend mögliche Geschichte, jede mit ihrer eigenen Wahrscheinlichkeit. Es muß eine Geschichte des Universums geben, in der Belize bei den Olympischen Spielen alle Goldmedail-len gewonnen hat, obwohl die Wahrscheinlichkeit dieser Geschichte vielleicht eher gering ist.

Die Idee, das Universum habe jede Menge Geschichten, hört sich vielleicht nach Science-fiction an, gehört aber durchaus in den Bereich der ernsthaften Wissenschaft. Formuliert wurde sie von Richard Feynman, der ein großer Physiker und eine außergewöhnliche Persönlichkeit war.

Heute arbeiten wir daran, Einsteins allgemeine Relativitätstheorie und Feynmans Konzept der multiplen Geschichten zu einer vollständigen einheitlichen Theorie zu verbinden, die alles beschreibt, was im Universum geschieht. Mit Hilfe einer solchen allumfassenden Theorie werden wir berechnen können, wie sich das Universum entwickeln wird, wenn wir wissen, wie die Geschichten angefangen haben. Doch diese einheitliche Theorie an sich kann uns nicht mitteilen, wie das Universum begonnen hat oder wie sein Anfangszustand beschaffen war. Dafür brauchen wir sogenannte Randbedingungen, Regeln, die uns sagen, was in den äußersten Zonen des Universums geschieht, an den Rändern von Zeit und

Wäre die Grenze des Universums nur ein normaler Punkt in Raum und Zeit, könnten wir über ihn hinausgehen und das dahinter gelegene Gebiet zu einem Teil des Universums erklären. Wäre dagegen

(Abb. 3.7 oben und Abb. 3.8 gegenüber) Wenn ein Roulettespieler bei einer großen Zahl von Spielen auf Rot setzt, kann man seinen Gewinn ziemlich genau vorhersagen, weil sich die Ergebnisse der einzelnen Spiele ausgleichen. Dagegen ist es unmöglich, das Ergebnis eines einzelnen Spiels vorherzusagen.






Bestände der Rand des Universums einfach aus Punkten in der Raumzeit, könnten wir die Grenzen ständig hinauschieben

der Rand des Universums eine Art Riß, eine Region, in der die Raumzeit bis zur Unkenntlichkeit zerstaucht und die Dichte unendlich wäre, hätten wir große Schwierigkeiten, sinnvolle Randbedingungen zu definieren.

Doch mein Kollege Jim Hartle und ich haben entdeckt, daß es noch eine dritte Möglichkeit gibt: Vielleicht hat das Universum gar keine Ränder in Raum und Zeit. Auf den ersten Blick scheint dies in direktem Gegensatz zu den Theoremen zu stehen, die Penrose und ich bewiesen haben und die zeigen, daß das Universum einen Anfang haben muß, einen »Zeitrand«. Doch wie ich in Kapitel 2 gezeigt habe, gibt es noch eine andere Art der Zeit, die imaginäre Zeit, die rechtwinklig zur gewöhnlichen Zeit verläuft - zu jener Zeit, die wir verstreichen fühlen. Die Geschichte des Universums in der realen Zeit bestimmt seine Geschichte in der imaginären Zeit und umgekehrt, aber die beiden Arten von Geschich-



Feynmans Tafel am Caltech zur Zeit seines Todes im Jahr 1988

Richard Feynman


FEYNMAN-GESCHICHTEN

Feynman wurde 1918 in Brooklyn, New York, geboren und promovierte 1942 bei John Wheeler an der Princeton University. Kurz darauf wurde er für das Manhattan Project angeworben. Dort waren seine faszinierende Persönlichkeit und sein Hang zu Streichen - in den Labors von Los Alamos knackte er ständig die streng geheimen Safes - nicht weniger bekannt als seine außergewöhnlichen physikalischen Fähigkeiten. Er hat entscheidend zur Theorie der Atombombe beigetragen. Feynmans unersättliche Neugier, die viele Aspekte der Welt betraf, war die Wurzel seiner Existenz. Sie war nicht nur der Motor seines wissenschaftlichen Erfolgs, sondern befähigte ihn auch zu einer Reihe erstaunlicher nicht-physikalischer Leistungen, etwa der Entzifferung von Maya-Hieroglyphen. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte Feynman einen leistungsfähigen neuen Ansatz zur Beschreibung der Quantenmechanik, für den er 1965 den Nobelpreis erhielt. Er stellte die klassische Annahme in Frage, nach der jedes Teilchen nur eine einzige Geschichte hat. Statt dessen schlug er die Hypothese vor, daß Teilchen auf ihrem Weg von einem Ort zum anderen jeder möglichen Bahn durch


die Raumzeit folgen, mit anderen Worten: jede irgend mögliche Geschichte durchleben. Jeder Bahn ordnete Feynman zwei Zahlen zu, die eine für die Größe - die Amplitude - einer Welle, die andere für ihre Phase - ob sie sich gerade auf einem Berg oder in einem Tal befindet oder irgendwo dazwischen. Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Teilchen von A nach B gelangt, berechnete er als Summe der Wellen, die mit jeder möglichen Bahn von A nach B assoziiert sind. Trotzdem haben wir in der Alltagswelt den Eindruck, daß Objekte auf einer einzigen Bahn von ihrem Ausgangs- zu ihrem Bestimmungspunkt gelangen. Das entspricht Feynmans Konzept der »Summe über alle Geschichten«, denn bei makroskopischen Objekten trägt seine Regel, nach der jeder Bahn ihre Kennzahlen zugeordnet werden, dafür Sorge, daß sich alle Bahnen bis auf eine aufheben, wenn ihre Beiträge zusammengefaßt werden. Für die Bewegung makroskopischer Objekte zählt nur eine der unendlich vielen möglichen Bahnen, und diese Bahn ist genau diejenige, die sich auch aus Newtons klassischen Bewegungsgesetzen ergibt.

te können sehr verschieden sein. Insbesondere muß das Universum in der imaginären Zeit weder einen Anfang noch ein Ende haben. Die imaginäre Zeit verhält sich einfach wie eine weitere Raumrichtung. Daher kann man sich die Geschichten des Universums in der imaginären Zeit als gekrümmte Flächen wie Kugeln, Ebenen oder Sattelflächen vorstellen, nur mit vier Dimensionen anstelle von zweien (Abb. 3.9, S. 92).

Würden sich die Geschichten des Universums endlos fortsetzen wie Sättel oder Ebenen, stünden wir vor dem Problem, die Randbedingungen im Unendlichen angeben zu müssen. Doch wir können die Notwendigkeit von Randbedingungen ganz vermeiden, wenn die Geschichten des Universums in der imaginären Zeit randlose geschlossene Flächen wie beispielsweise die Erdoberfläche sind. Die Oberfläche der Erde hat keine Grenzen oder Ränder.



Nach Feynmans Pfadintegralmethode folgt ein Teilchen jeder möglichen Bahn



(Abb. 3.9) GESCHICHTEN DES UNIVERSUMS Wenn sich die Geschichten des Universums wie ein Sattel ins Unendliche erstrecken würden, stünde man vor der Schwierigkeit, die Randbedingungen im Unendlichen anzugeben. Wären alle Geschichten des

Universums in imaginärer Zeit geschlossene Flächen wie die Erdoberfläche, dann brauchte man überhaupt keine Randbedingungen zu bestimmen

ENTWICKLUNGSGESETZE UND ANFANGSBEDINGUNGEN

Die Gesetze der Physik geben an, wie sich ein Anfangszustand im Laufe der Zeit entwickelt. Wenn wir beispielsweise einen Stein werfen, schreiben die Gravitationsgesetze die nachfolgende Bewegung des Steins genau vor. Aber wir können nicht ausschließlich anhand dieser Gesetze vorhersagen, wo der Stein landen wird. Dazu müssen wir auch wissen, welche Geschwindigkeit und Richtung er beim Verlassen unserer Hand hat. Mit anderen Worten, wir müssen die Anfangsbedingungen - die Randbedingungen - der Steinbewegung kennen. Die Kosmologie versucht die Entwicklung des ganzen Universums mit Hilfe der physikalischen Gesetze zu erklären. Folglich müssen wir fragen, wie die Anfangsbedingungen des Universums waren, auf die wir diese Gesetze anwenden können. Der Anfangszustand kann nachhaltige Konsequenzen für grundlegende Merkmale des Universums haben, vielleicht sogar für die Eigenschaften der Elementarteilchen und der Kräfte, die für die Evolution biologischen Lebens von entscheidender Bedeutung sind.

Eine Hypothese ist die Kein-Rand-Bedingung, die Annahme, Zeit und Raum seien endlich und bildeten eine geschlossene Fläche ohne Rand, so wie die Oberfläche der Erde von endlicher Größe ist, aber keinen Rand besitzt. Die Kein-Rand-Bedingung beruht auf Feynmans Konzept der »Summe über Geschichten«, doch die Geschichte eines Teilchens in Feynmans Summe wird jetzt durch eine vollständige Raumzeit ersetzt, die die Geschichte des gesamten Universums darstellt. Die Kein-Rand-Bedingung schränkt die möglichen Geschichten des Universums exakt auf diejenigen Raumzeiten ein, die keinen Rand in der imaginären Zeit haben. Mit anderen Worten, die Randbedingung des Universums ist, daß es keinen Rand hat. Gegenwärtig untersuchen Kosmologen, ob sich Anfangskonfigurationen, die von der Kein-Rand-Hypothese begünstigt werden, vielleicht im Zusammenwirken mit den schwachen anthropischen Argumenten, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einem Universum wie dem unseren entwickeln

Es gibt keine glaubhaften Berichte, daß irgend jemand jemals vom Rand der Erde gefallen wäre.

Falls die Geschichten des Universums in imaginärer Zeit tatsächlich solche geschlossenen Flächen wären, wie Hartle und ich vorgeschlagen haben, hätte das grundlegende Konsequenzen für die Philosophie und die Vorstellung von unserem Ursprung. Das Universum wäre vollkommen in sich geschlossen. Es wäre auf keinen äußeren Einfluß angewiesen, der das Uhrwerk aufziehen und in Gang setzen müßte. Vielmehr würde alles im Universum von den Naturgesetzen und den Würfelwürfen innerhalb des Universums bestimmt werden. Das mag anmaßend klingen, aber es ist das, was ich und mit mir viele Wissenschaftler glauben.


Auch wenn die Randbedingung des Universums sein sollte, daß es keinen Rand hat, so besitzt es nicht nur eine einzige Geschichte. Auch dann hat es eine Vielzahl von Geschichten, wie sie Feynman beschreibt. Jeder möglichen geschlossenen Fläche entspricht eine Geschichte in der imaginären Zeit, und jede Geschichte in der imaginären Zeit bestimmt eine Geschichte in der reellen Zeit. Damit ergibt sich eine Überfülle von Möglichkeiten für das Universum. dann aber das besondere Universum, in

, aus dem wir leben, aus der Menge aller möglichen Universen hervor? Sicherlich der Umstand, daß viele mögliche Geschichten des Universums nicht jene Sequenz von Galaxien- und Sternbildung durchlaufen, die für die Entwicklung von uns Menschen entscheidend war. Zwar gibt es die Möglichkeit, daß sich intelligente Wesen auch ohne Galaxien und Sterne entwickeln, aber sie erscheint doch recht unwahrscheinlich. So bedeutet die bloße Tatsache, daß wir als Wesen existieren, die fragen können: »Warum ist das Universum so, wie es ist?«, eine Einschränkung, der die Geschichte, in der wir leben, genügen muß. Daraus folgt nämlich, daß sie zur Minderheit jener Geschichten gehört, in denen Galaxien und Sterne entstehen.

Dies ist ein Beispiel für das sogenannte anthropische Prinzip. Es besagt, das Universum müsse mehr oder weniger so sein, wie wir es sehen, denn



Die Oberfläche der Erde hat keine Ränder oder Grenzen. Berichte über Menschen, die von ihr hinuntergefallen sind, dürften stark übertrieben sein.



DAS ANTHROPISCHE PRINZIP

In einfachen Worten besagt das anthropische Prinzip, daß die Eigenschaften des Universums, das wir beobachten, zumindest teilweise so sind, wie sie sind, weil wir in einem anders gearteten Universum überhaupt nicht existieren, solch ein Universum also gar nicht beobachten könnten. Diese Sicht steht in vollkommenem Gegensatz zum Traum von einer einheitlichen Theorie mit absoluter Vorhersagekraft, in der die Naturgesetze in dem Sinne vollständig sind, daß die Welt ist, wie sie ist, weil sie nicht anders sein kann. Es gibt eine Reihe verschiedener Versionen des anthropischen Prinzips, von denen, die so schwach sind, daß sie trivial erscheinen, bis zu denen, die so stark sind, daß sie absurd werden. Obwohl es den meisten Wissenschaftlern widerstrebt, eine starke Version des anthropischen Prinzips zu vertreten, stellen doch nur wenige die Nützlichkeit einiger schwacher anthropischer Argumente in Frage. Das schwache anthropische Prinzip läuft auf die Erklärung hinaus, welche der verschiedenen Epochen oder Teile des Universums wir bewohnen könnten. Beispielsweise ist der Grund, warum der Urknall von heute aus gesehen vor rund zehn Milliarden Jahren stattgefunden hat, ganz einfach: Das Universum muß

so alt sein, daß einige Sterne ihre Entwicklung abgeschlossen haben und Elemente wie Sauerstoff und Kohlenstoff herstellen können, Elemente, aus denen wir bestehen. Andererseits muß es so jung sein, daß einige Sterne noch die Energie liefern können, auf die das Leben angewiesen ist. Im Rahmen der Kein-Rand-Bedingung kann man mit Hilfe der Feynmanschen Regel jeder Geschichte des Universums eine Zahl zuweisen und auf diese Weise diejenigen Eigenschaften herausfinden, die ein Universum mit einiger Wahrscheinlichkeit besitzt. In diesem Zusammenhang ist das anthropische Prinzip an die Bedingung geknüpft, daß die Geschichten intelligentes Leben enthalten. Natürlich könnte man besser mit dem anthropischen Prinzip leben, wenn sich zeigen ließe, daß sich ein Universum, wie wir es beobachten, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus einer Anzahl verschiedener Anfangskonfigurationen hätte entwickeln können. Daraus würde folgen, daß der Anfangszustand jenes Teils des Universums, den wir bewohnen, nicht mit besonderer Sorgfalt ausgewählt werden mußte.

(Abb. 3.10, links)
Ganz links in der Abbildung sind die Universen A, die geschlossen und in sich zusammengestürzt sind. Ganz rechts sind jene offenen Universen B, die ihre Expansion ewig fortsetzen werden. Die kritischen Universen, die sich an der Grenze zwischen dem Wieder-in-sich-Zusammenfallen und der ewigen Expansion befinden, etwa C1 oder die Doppelinflation C2, könnten intelligentes Leben beherbergen. Unser eigenes Universum D befindet sich gegenwärtig in einer Expansionsphase.



Die Doppelinflation könnte intelligentes Leben beherbergen.

Unser eigenes Universum setzt gegenwärtig seine Expansion fort.

wäre es anders, gäbe es niemanden, der es beobachten könnte (Abb. 3.10). Vielen Wissenschaftlern mißfällt das anthropische Prinzip, weil es recht vage formuliert und wenig Vorhersagekraft zu besitzen scheint. Doch man kann eine exakte Formulierung für das anthropische Prinzip finden, und in dieser Formulierung ist das Prinzip augenscheinlich von entscheidender Bedeutung, wenn man sich mit dem Ursprung des Universums beschäftigt. Die in Kapitel 2 beschriebene M-Theorie läßt eine außerordentlich große Zahl möglicher Geschichten für das Universum zu. Die meisten dieser Geschichten eignen sich nicht für die Entwicklung intelligenten Lebens, entweder weil sie leer, zu kurz, zu gekrümmt oder in irgendeiner anderen Hinsicht falsch sind. Doch nach Richard Feynmans Konzept der Geschichtenvielfalt können diese unbewohnten Geschichten eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit haben (vgl. S. 92).

Tatsächlich spielt es keine Rolle, wie viele Geschichten es gibt, die keine intelligenten Wesen enthalten. Wir sind nur an der Teilmenge jener Geschichten interessiert, in denen sich intelligentes Leben entwickelt. Es muß nicht unbedingt menschenähnliche Züge besitzen. Kleine grüne Außerirdische täten es auch, täten es vielleicht sogar besser. Die Menschheit hat keine sehr gute Bilanz an intelligentem Verhalten vorzuweisen.

Betrachten Sie als Beleg für die Leistungsfähigkeit des anthropischen Prinzips die Anzahl der Raumdimensionen.






(Abb. 3.12a)



(Abb. 3.12b)



Unsere Alltagserfahrung sagt uns, daß wir im dreidimensionalen Raum leben. Das heißt, wir können die Position eines Punktes im Raum durch drei Zahlen angeben, beispielsweise die geographische Länge und Breite sowie die Höhe über dem Meeresspiegel. Doch warum ist der Raum dreidimensional? Warum hat er nicht zwei, vier oder irgendeine andere Zahl von Dimensionen, wie in Science-fiction-Geschichten? In der M-Theorie hat der Raum neun oder zehn Dimensionen, doch man nimmt an, daß sechs oder sieben Richtungen sehr eng aufgewickelt sind, so daß nur drei große und nahezu flache Dimensionen übrigbleiben (Abb. 3.11).



(Abb. 3.11)
Von weitem sieht ein Strohhalm wie eine eindimensionale Linie aus.

Warum leben wir nicht in einer Geschichte, in der acht Dimensionen eng aufgewickelt sind, so daß nur zwei für uns erkennbare, makroskopische Dimensionen übrigbleiben? Ein zweidimensionales Tier hätte große Schwierigkeiten, Nahrung zu verdauen. Hätte es einen Verdauungskanal, der es ganz durchquerte, zerfiele das Tier in zwei Teile. Zwei makroskopische Dimensionen sind also nicht genug für etwas so Kompliziertes wie intelligentes Leben. Gäbe es andererseits vier oder mehr makroskopische Dimensionen, würden die Gravitationskräfte zwischen zwei Körpern, die sich einander nähern, rascher anwachsen, als es in unserem Universum der Fall ist. Für solche Kräfte läßt sich zeigen, daß sie keine stabilen Umlaufbahnen zulassen, auf denen ein Planet seine Sonne umkreisen könnte. Entweder würde der Planet in die Sonne stürzen (Abb. 3.12a) oder in die Dunkelheit und Kälte des Weltraums entweichen (Abb. 3.12b).



(Abb. 3.13)
Die einfachste Geschichte in imaginärer Zeit, die keinen Rand hat, ist eine Kugelfläche. Sie bestimmt eine Geschichte in der reellen Zeit, die inflationär expandiert.

Auch die Orbitale der Elektronen in den Atomen wären nicht stabil, so daß es keine Materie in der uns bekannten Form gäbe. Zwar würde das Konzept der Geschichtenvielfalt eine beliebige Zahl von makroskopischen Dimensionen zulassen, doch nur Geschichten mit drei makroskopischen Dimensionen werden intelligente Wesen enthalten. Nur in solchen Geschichten wird die Frage gestellt werden: »Warum hat der Raum drei Dimensionen?«



Die einfachste Geschichte des Universums in imaginärer Zeit ist eine runde Kugelfläche, ähnlich der Erdoberfläche, aber mit zwei zusätzlichen Dimensionen (Abb. 3.13). Sie bestimmt eine Geschichte des Universums in der reellen Zeit (der Zeit, die sich unserer Erfahrung erschließt), in der das Universum an jedem Punkt des Raums die gleichen Eigenschaften hat und in der der Raum mit der Zeit expandiert. In diesen beiden Punkten ähnelt das Modell dem Universum, in dem wir leben. Doch die Expansionsgeschwindigkeit in dem Modelluniversum ist sehr



(Abb. 3.14)

hoch und wird immer rascher. Eine derart beschleunigte Expansion heißt Inflation, weil sie, wie inflationäre Preise, in immer schnellerem Tempo zunimmt.


Die Inflation von Preisen gilt im allgemeinen als sehr nachteilig, doch für das Universum ist die Inflation eine sehr nützliche Angelegenheit. Die gewaltige Expansion bügelt alle Unebenheiten aus, die das frühe Universum möglicherweise aufgewiesen hat. Im Zuge seiner Expansion borgt sich das Universum Energie vom Gravitationsfeld aus, um mehr Materie zu erzeugen. Die positive Materieenergie wird exakt durch die negative Gravitationsenergie ausgeglichen, so daß die Gesamtenergie null ist. Wenn das Universum seine Größe verdoppelt, verdoppeln sich auch die Materie- und die Gravitationsenergie - zwei mal null bleibt null. Wäre das Bankwesen doch auch so einfach (Abb. 3.14).



Wäre die Geschichte des Universums in imaginärer Zeit eine vollkommene Kugel, dann wäre die entsprechende Geschichte in der reellen Zeit ein Universum, das seine inflationäre Expansion ewig fortsetzen würde. In einem solchen inflationären Universum könnte sich die Materie nicht zu Galaxien und Sternen zusammenballen, und somit könnte sich auch kein Leben entwickeln, schon gar keine intelligenten Lebensformen wie wir. Wir sehen also, daß Geschichten des Universums in imaginärer Zeit, die vollkommene Kugeln sind, zwar ein Teil der gesamten Geschichtenvielfalt sind, aber verhältnismäßig uninteressante Varianten darstellen. Von weit größerer Bedeutung sind Geschichten in imaginärer Zeit, die am Südpol der Kugel etwas abgeflacht sind (Abb. 3.15).

In diesem Fall wird die entsprechende Geschichte in der reellen Zeit zunächst in einer beschleunigten, inflationären Weise expandieren. Doch dann verlangsamt sich die Expansion, und es können sich Galaxien bilden. Intelligentes Leben wird nur dann entstehen, wenn die Abflachung am Südpol sehr gering ist. Folglich wird das Universum anfangs in ganz außerordentlichem Maße expandieren. Ein Rekordniveau erreichte die Geldinflation zwischen den Weltkriegen in Deutschland (Abb. 3.16), als die Preise milliardenfach anstiegen -

(Abb.3.16) **DIE INFLATION KÖNNTE EIN NATURGESETZ SEIN**
Nach dem Friedensschluß stieg die Inflation in Deutschland immer rascher an, bis das Preisniveau im Februar 1920 fünfmal so hoch war wie 1918. Nach dem Juli 1922 begann die Phase der Hyperinflation. Alles Vertrauen in das Geld schwand, und der Preisindex stieg fünfzehn Monate lang schneller und schneller an, so daß am Ende die Druckereien das Geld nicht mehr so schnell liefern konnten, wie es an Wert verlor. Ende 1923 arbeiteten dreihundert Papierfabriken unter Hochdruck, und hundertfünfzig Druckereien ließen ihre zweitausend Pressen rund um die Uhr laufen, um das nötige Papiergeld bereitzustellen.



(Abb. 3.17)
WAHRSCHEINLICHE UND UNWAHRSCHEINLICHE GESCHICHTEN
Glatte Geschichten wie A sind am wahrscheinlichsten, doch gibt es sie nur in kleiner Zahl. Obwohl leicht unregelmäßige Geschichten (B) und (C) weniger wahrscheinlich sind, gibt es doch so viele verschiedene davon, daß die wahrscheinlichsten Geschichten des Universums kleine Abweichungen von der vollkommenen Kugelform aufweisen dürften.

doch das Ausmaß der Inflation, die im Universum stattgefunden haben muß, entspricht einem Faktor von mindestens einer Milliarde Milliarden Milliarden.


Infolge der Unschärferelation wird es nicht nur eine Geschichte des Universums geben, die intelligentes Leben enthält. Vielmehr werden die Geschichten in imaginärer Zeit eine ganze Familie leicht verformter Kugeln sein, deren jede einer Geschichte in reeller Zeit entspricht, und in jeder durchläuft das Universum eine lange, aber nicht unendlich lange Phase inflationärer Expansion. Daher stellt sich die Frage, welche dieser zulässigen Geschichten die wahrscheinlichsten sind. Wie sich erweist, sind die wahrscheinlichsten Geschichten diejenigen, die nicht vollkommen glatt sind, sondern winzige Ausbuchtungen nach innen und außen aufweisen (Abb. 3.17). Die Kräuselungen auf den wahrscheinlichsten Geschichten sind wirklich winzig. Die Abweichungen von einem glatten Verlauf liegen in der Größenordnung von eins zu hunderttausend. Obwohl sie so außerordentlich klein sind, ist es uns gelungen, sie als winzige Variationen der Eigenschaften der Mikrowellen zu beobachten, die uns aus allen Richtungen des Raums erreichen. Der Satellit Cosmic Background Explorer, der 1989 auf seine Umlaufbahn gebracht wurde, hat eine Mikrowellenkarte des Himmels erstellt.

Die verschiedenen Farben bezeichnen verschiedene Temperaturen.

Dabei stellt das gesamte Farbspektrum von Rot bis Blau einen Temperaturbereich von nur etwa einem zehntausendstel Grad dar - die hier sichtbaren Temperaturschwankungen sind fast unvorstellbar gering, und doch erzeugen sie zwischen verschiedenen Regionen des frühen Universums in den dichteren Bereichen eine zusätzliche Gravitation, die ausreicht, um die Expansion dort irgendwann zum Stillstand zu bringen und die Materie zum Kollaps zu veranlassen, so daß sie unter ihrem eigenen Gewicht zu Galaxien und Sternen zusammenstürzt. Im Prinzip zumindest ist die COBE-Karte der Grundriß aller Strukturen im Universum.

Welcher künftige Verlauf der wahrscheinlichsten Geschichten des Universums verträgt sich mit dem Auftreten intelligenter Wesen? Es scheint verschiedene Möglichkeiten zu geben, je nach der im Universum vorhandenen Materiemenge. Wenn mehr als eine bestimmte kritische Menge vorhanden ist, wird die Gravitationsanziehung zwischen den Galaxien ihre Expansionsbewegung abbremsen und sie schließlich daran hindern, sich noch weiter voneinander zu entfernen. Dann stürzen sie wieder aufeinander zu, um sich schließlich in einem großen Endkollaps zu vereinigen, der das Ende der Geschichte des Universums in der reellen Zeit bedeuten wird (Abb. 3.18, S. 104).

Die vollständige Himmelskarte, die das Mikrowellenradiometer DMR des Satelliten COBE geliefert hat, enthält Hinweise auf winzige Raumzeitkräuselungen.



(Abb. 3.18, oben)
Ein mögliches Ende des Universums ist der Große Endkollaps, in dessen Verlauf das All zu einem Gebilde extremer Dichte zusammenstürzen würde.

(Abb. 3.19, gegenüber)
Das lange, kalte Elend, in dem alles vergeht und die letzten Sterne erlöschen, nachdem sie ihren Brennstoff verbraucht haben.

Liegt die Dichte des Universums unter dem kritischen Wert, dann reicht die Gravitation nicht aus, um die Galaxien am ewigen Auseinanderdriften zu hindern. Alle Sterne werden ausbrennen. Das Universum wird leerer und leerer und kälter und kälter werden. Auch in diesem Szenario wird alles ein Ende finden, wenn auch weniger spektakulär. In beiden Fällen wird das Universum noch einige Milliarden Jahre existieren (Abb. 3.19).


Möglicherweise enthält das Universum neben Materie auch sogenannte Vakuumenergie, Energie, die auch im scheinbar leeren Raum vorhanden ist. Nach Einsteins berühmter Gleichung $E = mc^2$ hat diese Vakuumenergie Masse. Damit ist sie auch eine Quelle der Gravitation und beeinflusst die Expansion des Universums. Doch merkwürdigerweise ist der Effekt der Vakuumenergie dem der Materie entgegengesetzt. Materie bewirkt eine Verlangsamung der Expansion und kann sie schließlich zum Stillstand bringen und umkehren, die Vakuumenergie dagegen verursacht, wie die Inflation, eine Beschleunigung der Expansion. Tatsäch-



lich hat die Vakuumenergie genau die gleiche Wirkung wie die kosmologische Konstante, von der in Kapitel 1 die Rede war - jener Konstante, die Einstein 1917 in seine ursprünglichen Gleichungen einfügte, als ihm klar wurde, daß es ihm anders nicht möglich war, ein statisches Universum zu beschreiben. Nachdem Hubble die Expansion des Universums entdeckt hatte, war es sinnlos geworden, den Gleichungen dieses Glied hinzuzufügen, und Einstein hielt die Einführung der kosmo-logischen Konstante nun für einen Fehler. Aber vielleicht war es doch kein Fehler: Wie in Kapitel 2 beschrieben, legt die Quantentheorie den Schluß nahe, daß die Raumzeit mit Quantenfluktuationen gefüllt ist. In supersymmetrischen Theorien gleichen sich die unendlichen positiven und negativen Energien der Grundzustandsfluktuationen der Partnerteilchen mit verschiedenem Spin gegenseitig aus. Allerdings können wir nicht erwarten, daß sich die positiven und negativen Energien vollständig aufheben. Es sollte eine kleine, endliche Menge an Vakuumenergie übrigbleiben, da sich das Universum nicht in einem supersymmetrischen Zustand be-

*Die kosmologische
Konstante war
meine größte Eselei?*

Albert Einstein



(Abb. 3.20)
 Wenn man die Beobachtungen ferner Supernovae, der kosmischen Hintergrundstrahlung und der Materieverteilung im Universum zusammenfaßt, lassen sich Vakuumenergie und Materiedichte im Universum ziemlich gut abschätzen.

findet. Überraschend ist eigentlich nur, daß der Wert der Vakuumenergie so nahe bei null liegt und daß sie sich deshalb nicht schon früher bemerkbar gemacht hat. Vielleicht ist dies ein weiteres Beispiel für das anthropische Prinzip: Eine Geschichte mit einer größeren Vakuumenergie hätte keine Galaxien hervorgebracht und enthielte deshalb auch keine Wesen, die fragen könnten: Warum hat die Vakuumenergie gerade den Wert, den wir beobachten?

Wir können versuchen, die Menge von Materie und Vakuumenergie im Universum anhand verschiedener Beobachtungen zu bestimmen. Die Ergebnisse lassen sich in einem Diagramm wiedergeben, in dem die Materiedichte auf der waagerechten Achse und die Dichte der Vakuumenergie auf der senkrechten Achse aufgetragen wird. Die gepunktete Linie bildet die Grenze der Region, in der sich intelligentes Leben entwickeln könnte (Abb. 3.20).

Beobachtungen ferner Supernovae, der Materieverteilung im Universum und der kosmischen Hintergrundstrahlung schränken die möglichen

*O Gott, ich könnte in eine Nußschale eingesperrt sein
 und mich für einen König
 von unermeßlichem Gebiete halten...*

Shakespeare,
Hamlet, 2. Aufzug, 2. Szene



Werte für Vakuumenergie und Materiedichte jeweils auf eine bestimmte Region des Diagramms ein. Glücklicherweise überschneiden sich die drei Regionen. Wenn die Materiedichte und Vakuumenergie in diesem Schnitt liegen, so folgt daraus, daß die Expansion des Universums nach einer langen Phase der Verlangsamung wieder dabei ist, sich zu beschleunigen. Vielleicht ist die Inflation ein Naturgesetz.

In diesem Kapitel haben wir gesehen, wie sich das Verhalten des ungeheuer großen Universums durch seine Geschichte in imaginärer Zeit verstehen läßt, die eine winzige, abgeflachte Kugel ist. Insofern hat es große Ähnlichkeit mit Hamlets Nußschale, und in dieser Nuß ist alles verschlüsselt, was in reeller Zeit geschieht. Hamlet hat also vollkommen recht: Wir könnten in einer Nußschale eingesperrt sein und uns doch für Könige von unermeßlichem Gebiet halten.

KAPITEL 4

DIE ZUKUNFT VORHERSAGEN

*Wie der Informationsverlust in Schwarzen Löchern
unsere Fähigkeit beeinträchtigen könnte, die Zukunft vorherzusagen*






(Abb. 4.1)
Ein Beobachter auf der Erde (blau) betrachtet beim Umkreisen der Sonne den Mars (rot) vor dem Hintergrund der Sternbilder. Die komplizierte scheinbare Bewegung der Planeten am Himmel läßt sich durch Newtons Gesetze erklären und hat keinen Einfluß auf das persönliche Schicksal.

Seit jeher hegt die Menschheit den Wunsch, die Zukunft ihrer Kontrolle zu unterwerfen oder zumindest vorherzusagen. Deshalb ist die Astrologie so beliebt. Astrologen behaupten, die Ereignisse auf der Erde seien mit den Bewegungen der Planeten am Himmel verknüpft. Das ist eine wissenschaftlich überprüfbare Hypothese - oder wäre es zumindest, wenn sich die Astrologen tatsächlich einmal zu eindeutigen Vorhersagen bequemen würden, die man testen könnte. Doch klugerweise halten sie ihre Prophezeiungen so vage, daß sie immer »zutreffen«, egal, was passiert. Aussagen wie »Es könnte zu einer bedeutsamen Veränderung in Ihren persönlichen Beziehungen kommen« lassen sich natürlich nicht widerlegen.

Doch der eigentliche Grund, warum die meisten Wissenschaftler nicht an die Astrologie glauben, ist nicht die wissenschaftliche Beweislage, sondern der Umstand, daß sie nicht mit anderen Theorien konsistent ist, die einer experimentellen Überprüfung standgehalten haben. Als Kopernikus und Galilei entdeckten, daß die Planeten die Sonne und nicht die Erde umkreisen, und Newton die Gesetze fand, die ihre Bewegung bestimmen, wurde die Astrologie außerordentlich unglaubwürdig. Warum sollten die Positionen anderer Planeten vor dem Hintergrundhimmel in irgendeinem Zusammenhang mit dem Geschick von Makromolekülen stehen, die auf einem unbedeutenden Planeten leben und sich selbst als intelligent bezeichnen (Abb. 4.1)? Und doch möchte uns die Astrologie genau dies glauben machen. Für einige der in diesem Buch beschriebenen Theorien gibt es nicht



»Mars steht diesen Monat im Schützen, und auf Sie kommt eine Zeit der Selbstbesinnung zu. Mars fordert Sie auf, Ihr Leben so zu gestalten, wie es Ihnen gefällt, anstatt sich nach anderen zu richten. Und dies wird geschehen. Zur Zeit des Vollmonds wird Ihnen Ihr Leben in einem unverhofft neuen Licht erscheinen, und Sie gelangen zu Einsichten, die Sie verändern werden. Sie werden lernen, Verantwortung zu übernehmen und mit schwierigen Beziehungen umzugehen.«



(Abb. 4.2)
Wenn Sie wissen, wo und mit welcher Geschwindigkeit ein Ball geworfen wird, können Sie vorhersagen, wohin er fliegt.

mehr experimentelle Anhaltspunkte als für die Astrologie, aber wir nehmen sie ernst, weil sie mit Theorien konsistent sind, die sich in experimentellen Tests behauptet haben.

Der Erfolg der Newtonschen Gesetze und anderer physikalischer Theorien führte zum Prinzip des wissenschaftlichen Determinismus, das erstmals Anfang des 19. Jahrhunderts von einem französischen Naturwissenschaftler, dem Marquis de Laplace, formuliert wurde. Wenn wir den Ort und die Geschwindigkeit aller Teilchen im Universum kennen würden, so meinte Laplace, dann müßten wir anhand der physikalischen Gesetze den Zustand des Universums zu jedem gegebenen Zeitpunkt in der Vergangenheit oder Zukunft vorhersagen können (Abb. 4.2).

Mit anderen Worten, wenn der wissenschaftliche Determinismus richtig ist, sollten wir im Prinzip in der Lage sein, die Zukunft vorherzusagen, und brauchten die Astrologie gar nicht. In der Praxis ergeben sich allerdings schon aus so einfachen Theorien wie Newtons Gravitationsgesetzen Gleichungen, die wir nicht für mehr als zwei Teilchen exakt lösen können. Außerdem haben die Gleichungen oft eine Eigenschaft, die als chaotisches Verhalten bezeichnet wird: Eine kleine Modifizierung von Position oder Geschwindigkeit zu einem Zeitpunkt kann ein vollkommen verändertes Verhalten zu einem anderen Zeitpunkt hervorrufen. Wer Jurassic Park gesehen hat, weiß, daß eine winzige Störung an einem Ort eine große Störung an einem anderen bewirken kann. Ein Schmetterling, der in Tokio mit seinen Flügeln schlägt, kann Regen verursachen, der in New Yorks Central Park fällt (Abb. 4.3). Das Ärgerliche daran ist, daß sich diese Ereignisfolge nicht wiederholen läßt. Wenn der Schmetterling




(Abb. 4.3)

das nächste Mal mit seinen Flügeln schlägt, wird sich eine Reihe von Faktoren verändert haben, die das Wetter ebenfalls beeinflussen.

Aus diesem Grund ist uns auch kein großer Erfolg bei dem Versuch beschieden, menschliches Verhalten aus mathematischen Gleichungen vorherzusagen, obwohl es die Gesetze der Quantenelektrodynamik im Prinzip ermöglichen sollten, alle Phänomene der Chemie und der Biologie zu berechnen. Trotz dieser praktischen Schwierigkeiten haben die meisten Wissenschaftler Trost in dem Gedanken gefunden, daß die Zukunft - wiederum im Prinzip - vorhersagbar ist.

Auf den ersten Blick scheint der Determinismus auch durch die Unschärferelation in Frage gestellt zu werden, der zufolge man nicht zur gleichen Zeit die Position und die Geschwindigkeit eines Teilchens exakt messen kann. Je genauer man die Position eines Teilchens mißt, desto weniger genau kann man seine Geschwindigkeit bestimmen und umgekehrt. Nach der Laplaceschen Version des Determinismus wäre es notwendig, die Positionen und Geschwindigkeiten von Teilchen zu einem einzigen Zeitpunkt genau zu kennen, um die Positionen und Geschwindigkeiten der Teilchen für jeden Zeitpunkt in der Vergangenheit oder Zukunft zu bestimmen. Doch wie soll man einen Anfang machen, wenn einen die Unschärferelation daran hindert, die Positionen und Geschwindigkeiten zu irgendeinem Zeitpunkt genau zu erkennen? Wie gut auch immer unser Computer ist, wenn wir schlechte Daten ein-






(Abb. 4.4) Die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen an einem gegebenen Ort und mit einer gegebenen Geschwindigkeit anzutreffen, wird durch seine Wellenfunktion bestimmt, und zwar so, daß Δx und Δv der Unschärferelation gehorchen.

geben, bekommen wir lausige Vorhersagen heraus.

In abgewandelter Form wurde der Determinismus aber doch wiederhergestellt, und zwar durch die neue Theorie der Quantenmechanik, die die Unschärferelation einbezog. In der Quantenmechanik können wir, stark vereinfacht gesagt, genau die Hälfte dessen vorhersagen, was der klassische Laplacesche Determinismus an Vorhersagen verspricht. In der Quantenmechanik ist entweder die Position oder die Geschwindigkeit eines Teilchens nicht wohldefiniert, und doch läßt sich sein Zustand durch eine sogenannte Wellenfunktion darstellen (Abb. 4.4).

Die Wellenfunktion eines Teilchens weist jedem Punkt des Raums eine Zahl zu, die die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der das Teilchen an diesem Ort anzutreffen ist. Die Änderungsrate der Wellenfunktion von Punkt zu Punkt gibt darüber Auskunft, wie wahrscheinlich verschiedene Teilchengeschwindigkeiten sind. Einige Wellenfunktionen weisen an einem einzigen Punkt im Raum einen ausgeprägten Gipfel auf. In diesen Fällen gibt es nur eine geringe Unbestimmtheit in bezug auf die Position des Teilchens. Doch das Diagramm zeigt in solchen Fällen auch, daß sich die Wellenfunktion in der Nähe des Punktes rasch verändert, auf der



einen Seite nach oben und auf der anderen nach unten. Daraus folgt, daß die Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Geschwindigkeit über einen großen Bereich gestreut ist. Mit anderen Worten, die Unbestimmtheit der Geschwindigkeit ist groß. Betrachten wir als Kontrast einen periodischen, ausgedehnten Wellenzug. Jetzt ist die Unbestimmtheit groß hinsichtlich der Position, aber klein in bezug auf die Geschwindigkeit. Daher ist - in Übereinstimmung mit der Unschärferelation - bei der Beschreibung eines Teilchens durch eine Wellenfunktion entweder die Position oder die Geschwindigkeit nicht wohldefiniert. Wohldefiniert ist ausschließlich die Wellenfunktion. Wir können noch nicht einmal annehmen, daß das Teilchen zu jedem Zeitpunkt eine ganz bestimmte Position und Geschwindigkeit besitzt, die nur uns verborgen, Gott hingegen bekannt sind. Eine solche Theorie der »verborgenen Variablen« sagt Ergebnisse vorher, die nicht mit den Beobachtungen übereinstimmen. Sogar Gott ist an die Unschärferelation gebunden und kann nicht gleichzeitig Position und Geschwindigkeit eines Teilchens kennen. Nur die Wellenfunktion kann ihm bekannt sein.


(Abb. 4.5) DIE SCHRÖDINGER-GLEICHUNG Wie sich die Wellenfunktion Ψ entwickelt, wird durch den Hamilton-Operator H bestimmt, der mit der Energie des betreffenden physikalischen Systems zusammenhängt.



(Abb. 4.6)
In der flachen Raumzeit der speziellen Relativitätstheorie haben Beobachter, die sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen, verschiedene Zeitmaße, aber wir können in jeder dieser Zeiten mit Hilfe der Schrödinger-Gleichung vorherhersagen, wie die Wellenfunktion in Zukunft aussehen wird.

Die Änderungsrate der Wellenfunktion mit der Zeit wird durch die sogenannte Schrödinger-Gleichung bestimmt (Abb. 4.5, S. 115). Wenn uns die Wellenfunktion zu einem bestimmten Zeitpunkt bekannt ist, können wir sie mit Hilfe der Schrödinger-Gleichung für jeden anderen Zeitpunkt in der Vergangenheit oder Zukunft berechnen. Daher gibt es auch in der Quantentheorie einen Determinismus, wenn auch von eingeschränkter Geltung. Nicht die Positionen und Geschwindigkeiten können wir vorherhersagen, sondern nur die Wellenfunktion. Und die ermöglicht es uns, entweder die Positionen oder die Geschwindigkeiten genau vorherzusagen, aber nicht beide. In diesem Sinne ist in der Quantentheorie die Fähigkeit zu exakten Vorhersagen genau halb so groß wie im klassischen Laplaceschen Weltbild. Doch in diesem eingeschränkten Sinne läßt sich durchaus noch von Determinismus sprechen.

Wenn wir die Wellenfunktion mit Hilfe der Schrödinger-Gleichung in der Zeit vorwärts entwickeln (also vorherhersagen, wie sie zu zukünftigen Zeitpunkten sein wird), setzen wir allerdings implizit voraus, daß sie überall und immer glatt verläuft. Das traf für die Newtonsche Physik sicherlich zu. Die Zeit galt als absolut, das heißt, jedes Ereignis in der Geschichte des Universums wurde mit einer Zahl namens Zeit etikettiert, und eine ununterbrochene Kette solcher Zeitetiketten reichte von der unendlich fernen Vergangenheit bis in die unendlich ferne Zukunft. Man könnte dies den Alltagsbegriff der Zeit nennen, es ist der Zeitbegriff, den die meisten Menschen - auch die meisten Physiker - im Hinterkopf haben. Doch 1905 wurde, wie schon erwähnt, das Konzept der absoluten Zeit durch die spezielle Relativitätstheorie aufgehoben. Von nun an war die Zeit keine unabhängige, eigenständige Größe mehr, sondern nurmehr




Teil eines vierdimensionalen Kontinuums namens Raumzeit. In der speziellen Relativitätstheorie bewegen sich verschiedene Beobachter, die mit verschiedenen Geschwindigkeiten vorankommen, auf verschiedenen Bahnen durch die Raumzeit. Jeder Beobachter hat auf dem Weg, dem er folgt, sein eigenes Zeitmaß, so daß verschiedene Beobachter verschiedene Zeitintervalle zwischen Ereignissen messen (Abb. 4.6).

In der speziellen Relativitätstheorie gibt es also nicht nur eine einzige, absolute Zeit, mit der sich Ereignisse etikettieren lassen. Allerdings ist die Raumzeit der speziellen Relativitätstheorie immer noch flach. Das heißt insbesondere, in der speziellen Relativitätstheorie wächst die Zeit, die von einem Beobachter in freier Bewegung gemessen wird, stetig von minus unendlich in der unendlich fernen Vergangenheit bis plus unendlich in der unendlich fernen Zukunft an. Wir können das Zeitmaß jedes dieser Beobachter in der Schrödinger-Gleichung zur Entwicklung der Wellenfunktion verwenden. Daher haben wir in der speziellen Relativitätstheorie noch immer die Quantenversion des Determinismus.

Anders ist die Situation bei der allgemeinen Relativitätstheorie, in der die Raumzeit nicht flach, sondern gekrümmt ist, verzerrt durch die in ihr vorhandene Materie und Energie. In unserem Sonnensystem ist die Krümmung der Raumzeit so geringfügig, zumindest auf makroskopischer Skala, daß sie unserem gewöhnlichen Zeitbegriff nicht in die Quere kommt. Unter diesen Bedingungen könnten wir diese Zeit noch in der Schrödinger-Gleichung verwenden, um eine deterministische Entwicklung der Wellenfunktion zu erhalten. Doch

(Abb. 4.7)
DIE ZEIT STEHT STILL
Ein Zeitmaß hätte notwendigerweise dort Totpunkte, wo der Griff am Hauptzylinder ansetzt: Punkte, an denen die Zeit still stünde. An diesen Punkten nähme die Zeit in keiner Richtung zu. Daher könnte man mit der Schrödinger-Gleichung nicht vorherhersagen, wie die Wellenfunktion in Zukunft aussähe.



(Abb. 4.9)



sobald wir Raumzeitkrümmung zulassen, ergibt sich die Möglichkeit von Raumzeiten, in denen die Zeit nicht mehr für jeden Beobachter stetig anwächst, wie es bei einem vernünftigen Zeitmaß zu erwarten wäre. Nehmen wir beispielsweise an, die Raumzeit hätte die Form eines senkrechten Zylinders (Abb. 4.7, S. 117).

Die Höhe des Zylinders wäre ein Zeitmaß, das für jeden Beobachter zunähme und von minus unendlich bis plus unendlich verlief. Nun stellen Sie sich aber statt dessen vor, die Raumzeit gliche einem Zylinder mit einem Henkel (einer Art »Wurmloch«), der von dem Zylinder abzweigt und sich dann wieder mit ihm vereinigt. Dann hätte jedes Zeitmaß notwendigerweise »Totpunkte«, wo der Henkel am Hauptzylinder ansetzt, Punkte, an denen die Zeit still stünde. An diesen Punkten würde die Zeit nicht mehr für jeden Beobachter anwachsen. In einer solchen Raumzeit könnten wir die Schrödinger-Gleichung nicht für eine deterministische Entwicklung der Wellenfunktion nutzen. Nehmen Sie sich vor Wurmlöchern in acht: Sie können nie wissen, was aus ihnen herauskommt.

Schwarze Löcher sind der Grund, warum wir glauben, daß die Zeit nicht für jeden Beobachter anwächst. Sie wurden erstmals 1783 diskutiert. John Michell, ein ehemaliger Cambridge-Professor, brachte das folgende Argument vor: Wenn man ein Objekt wie eine Kanonenkugel senkrecht nach oben abfeuert, wird sein Anstieg durch die Schwerkraft abgebrems, bis es schließlich seinen Aufstieg beendet und zurückfällt (Abb. 4.8). Überschreitet die anfängliche Aufwärtsgeschwindigkeit jedoch einen kritischen Wert, die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit, reicht der Einfluß der Schwerkraft nicht mehr aus, um das Objekt zu stoppen, so daß es ins Unendliche entkommt. Für die Erde beträgt die



SCHWARZES LOCH VOM SCHWARZSCHILD-TYP
 1916 entdeckte der deutsche Astronom Karl Schwarzschild eine Lösung für die Gleichungen von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, die ein kugelförmiges Schwarzes Loch darstellt. Schwarzschilds Arbeit offenbarte eine erstaunliche Konsequenz der allgemeinen Relativitätstheorie. Wenn die Masse eines Sterns in einer hinreichend kleinen Region konzentriert ist, dann wird, wie Schwarzschild nachwies, das Gravitationsfeld an der Oberfläche des Sterns so stark, daß ihm noch nicht einmal Licht entkommen kann. Das ist das, was wir heute ein Schwarzes Loch nennen, eine Region der Raumzeit, die durch einen sogenannten Ereignishorizont abgegrenzt wird, und zwar so gründlich, daß aus ihrem Innern nichts, noch nicht einmal Licht, zu einem fernen Beobachter gelangen kann. Lange Zeit begegneten die meisten Physiker, unter ihnen auch Einstein, der Idee, es könnte solch extreme

Materiekonfigurationen im realen Universum geben, mit großer Skepsis. Doch heute wissen wir, daß jeder hinreichend schwere und nichtrotierende Stern - egal, wie kompliziert seine Form und innere Struktur ist -, zu einem vollkommen kugelförmigen Schwarzen Loch vom Schwarzschild-Typ zusammenstürzen muß. Der Radius R des Ereignishorizonts hängt allein von der Masse des Schwarzen Lochs ab. Er ist gegeben durch die Formel

$$R = \frac{2GM}{c^2}$$

In dieser Formel steht c für die Lichtgeschwindigkeit, G ist die Gravitationskonstante, und M ist die Masse des Schwarzen Lochs. Ein Schwarzes Loch mit der gleichen Masse wie die Sonne hätte beispielsweise einen Radius von lediglich drei Kilometern!

Fluchtgeschwindigkeit ungefähr elf Kilometer pro Sekunde und für die Sonne rund 620 Kilometer pro Sekunde.

Beide Fluchtgeschwindigkeiten sind viel höher als die realer Kanonenkugeln, jedoch klein im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit, die 300 000 Kilometer pro Sekunde beträgt. Damit kann das Licht der Erde oder Sonne ohne große Schwierigkeit entkommen. Michell vertrat jedoch die Auffassung, es könnte Sterne geben, die sehr viel mehr Masse besäßen als die Sonne und deren Fluchtgeschwindigkeiten größer seien als die Lichtgeschwindigkeit (Abb. 4.9). Wir könnten diese Sterne nicht sehen, weil alles Licht, das sie aussendeten, durch die Gravitation des Sterns zurückgezogen würde. Sie seien also Dunkle Sterne, wie Michell sie nannte - Schwarze Löcher, wie wir heute sagen.

Michells Idee der Dunklen Sterne fußte auf der Newtonschen Physik, in der die Zeit absolut war und unabhängig von allen Geschehnissen verstrich. Die Dunklen Sterne des klassischen Newtonschen Weltbildes können also unsere Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen, nicht beeinträchtigen. Ganz anders stellt sich die Situation in der allgemeinen Relativitätstheorie dar, in der massereiche Körper die Raumzeit krümmen.

1916, kurz nach der ersten Formulierung der Theorie, fand Karl Schwarzschild (der bald darauf an einer Krankheit starb, die er sich im Ersten Weltkrieg an der russischen Front zugezogen hatte) eine Lösung für die Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie, die ein Schwarzes Loch darstellte. Was Schwarzschild da entdeckt hatte, wurde in seiner ganzen Bedeutung erst viele Jahre später er-



(Abb. 4.8)



(Abb. 4.10)
Der Quasar 3C273, die erste quasistellare Radioquelle, die entdeckt wurde, erzeugt eine extrem große Energiemenge auf (kosmisch gesehen) kleinstem Raum. Der einzige Mechanismus, der eine solche Leuchtkraft erklären könnte, scheint Materie zu sein, die in ein Schwarzes Loch stürzt.

JOHN WHEELER

John Archibald Wheeler wurde 1911 in Jacksonville, Florida, geboren. 1933 promovierte er an der Johns Hopkins University mit einer Arbeit über die Lichtstreuung durch Heliumatome. 1938 entwickelte er zusammen mit dem dänischen Physiker Niels Bohr die Theorie der Kernspaltung. Danach konzentrierte sich Wheeler zusammen mit seinem Doktoranden Richard Feynman auf die Elektrodynamik. Doch kurz nach dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg beteiligten sich beide am Manhattan Project. Unter dem Einfluß einer 1939 veröffentlichten Arbeit von Robert Oppenheimer über den Gravitationskollaps eines massereichen Sterns begann sich Wheeler Anfang der fünfziger Jahre mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie zu beschäftigen. Damals arbeiteten die meisten

Physiker auf dem Gebiet der Kernphysik und maßen der allgemeinen Relativitätstheorie keine besondere Bedeutung bei. Fast im Alleingang veränderte Wheeler diese Situation - teils durch seine Forschung, teils durch den ersten Kurs über Relativitätstheorie an der Princeton University. Sehr viel später, im Jahr 1969, prägte er den Begriff Schwarzes Loch für diese extremen Gebilde, an deren Realität damals noch kaum jemand glaubte. Angeregt von Werner Isaia's Arbeit äußerte Wheeler die Hypothese, Schwarze Löcher hätten keine Haare, womit gemeint ist, daß sich jedes Schwarze Loch, das aus dem Kollaps eines nichtrotierenden, massereichen Sterns hervorgegangen ist, tatsächlich durch die Schwarzschild-Lösung beschreiben läßt.


kannt. Einstein selbst hat nie an Schwarze Löcher geglaubt, und diese Skepsis teilte fast die gesamte ganze alte Garde der Relativitätstheoretiker. Als ich vor vielen Jahren in Paris über meine Entdeckung berichtete, daß nach der Quantentheorie Schwarze Löcher nicht vollständig schwarz sind, war die Veranstaltung recht spärlich besucht, weil damals fast niemand in Paris an Schwarze Löcher glaubte. Außerdem fanden die Franzosen, der Name habe, übersetzt in ihre Sprache - *trou noir* -, zweifelhafte sexuelle Anklänge, weshalb sie ihn durch *astre occlu*, verschlossener oder verborgener Stern, ersetzten. Doch weder dieser noch andere Namensvorschläge nahmen das Bewußtsein der Öffentlichkeit so gefangen wie der englische Begriff *black hole*, der von John Archibald Wheeler geprägt wurde, einem amerikanischen Physiker, der viele moderne Arbeiten auf diesem Gebiet beeinflusst hat.

Die Entdeckung der Quasare im Jahr 1963 löste dann eine Flut von theoretischen Arbeiten über Schwarze Löcher aus und führte zu ernsthaften Versuchen, solche Objekte in unserem Weltall nachzuweisen (Abb. 4.10). Insgesamt ergab sich das folgende Bild. Betrachten wir die Geschichte eines Sterns mit zwanzigfacher Sonnenmasse. Solche Sterne bilden sich aus Gaswolken, zum Beispiel im Orionnebel (Abb. 4.11). Wenn sich Gaswolken unter der eigenen Schwerkraft zusammenziehen, erhitzt sich das Gas und wird schließlich heiß genug, um die Kernfusionsreaktionen in Gang zu setzen, die Wasserstoff in Helium verwandeln. Die durch diesen Prozeß erzeugte Wärme ruft einen Druck hervor, der der Gravitationskraft des Sterns entgegenwirkt und ihn an einer weiteren Kontraktion hindert. In diesem Zustand verharrt der Stern lange Zeit, verbrennt Wasserstoff und emittiert Licht ins All.

Das Gravitationsfeld des Sterns beeinflusst die Bahnen der Lichtstrahlen, die von ihm ausgehen. Man kann ein Diagramm zeichnen, in dem die Zeit auf der senkrechten und der Abstand vom Mittelpunkt des Sterns auf der waagerechten Achse aufgetragen wird (Abb. 4.12, S. 122). In diesem Diagramm entsprechen der Oberfläche des Sterns zwei senkrechte Linien, eine zu jeder Seite des Mittelpunkts. Nun legen wir fest, daß die Zeit in Sekunden und der Abstand in Lichtsekunden gemessen wird - eine Lichtsekunde ist die Strecke, die das Licht in einer Sekunde zurücklegt. Wenn wir diese Einheiten verwenden, ist die Lichtgeschwindigkeit 1, nämlich eine Lichtsekunde pro Sekunde. In unserem Diagramm entspricht daher der Bahn eines Lichtstrahls fernab vom Stern und seinem Gravitationsfeld eine Linie, die in einem Winkel von fünfundvierzig Grad zur Senkrechten verläuft. Doch in größerer Nähe zum Stern verändert die durch seine Masse hervorgerufene Krümmung der Raumzeit die




(Abb. 4.11)
Sterne bilden sich in Wolken aus Gas und Staub wie dem Orionnebel




(Abb. 4.12) Die Raumzeit um einen stabilen Stern herum. Licht kann von der Oberfläche des Sterns (rote senkrechte Linien) in die Weiten des Alls entkommen. Weit von dem Stern entfernt verlaufen die Lichtbahnen im Winkel von 45 Grad zur Senkrechten; näher an der Sternoberfläche zwingt die Raumzeitkrümmung die Lichtbahnen, steiler zu verlaufen.

(Abb. 4.13) Wenn der Stern kollabiert, wird die Raumzeitkrümmung so stark, daß sich Licht aus der Umgebung der Sternoberfläche nur immer weiter nach innen bewegen kann. Es bildet sich ein Schwarzes Loch.



Bahnen der Lichtstrahlen und veranlaßt sie, einen kleineren Winkel mit der Senkrechten zu bilden.

Massereiche Sterne verbrennen ihren Wasserstoff sehr viel rascher zu Helium als unsere Sonne, so daß er ihnen schon in wenigen hundert Millionen Jahren ausgehen kann. Danach geraten solche Sterne in eine Krise. Zwar können sie ihr Helium zu schwereren Elementen wie Kohlenstoff und Sauerstoff verbrennen, doch setzen sie letztendlich nicht soviel Energie frei wie vorher. Sie verlieren an Wärme und an jenem thermischen Druck, der ihrer eigenen Gravitation entgegenwirkt, und fangen daher an zu schrumpfen. Besitzen sie mehr als ungefähr die doppelte Sonnenmasse, so reicht der Druck unter keinen Umständen aus, um die Kontraktion zum Stillstand zu bringen. Sie kollabieren zur Größe null und zu unendlicher Dichte, so daß sie eine sogenannte Singularität bilden (Abb. 4.13). In unserem Zeit-Abstand-Diagramm verlaufen die Bahnen der Lichtstrahlen, die von der Sternoberfläche ausgehen, mit der Schrumpfung des Sterns in immer spitzeren und spitzeren Winkeln zur Senkrechten. Erreicht der Stern einen bestimmten kritischen Radius, ist die Bahn dieser Lichtstrahlen in unserem Diagramm eine Senkrechte,



was bedeutet, daß das Licht in einer gleichbleibenden Entfernung vom Mittelpunkt des Sterns verharrt und ihm nicht mehr entkommt. Diese kritische Lichtbahn bildet eine Fläche, die man Ereignishorizont nennt. Sie trennt die Region der Raumzeit, aus der Licht ins Unendliche entweichen kann, von der Region, aus der heraus dies nicht möglich ist. Alles Licht, das der Stern emittiert, nachdem er unter die Größe seines Ereignishorizonts geschrumpft ist, wird durch die Krümmung der Raumzeit nach innen gelenkt. Der Stern ist zu einem von Michells Dunklen Sternen geworden - zu einem Schwarzen Loch.

Wie können wir ein Schwarzes Loch entdecken, wenn ihm kein Licht entweichen kann? Die Antwort lautet, daß ein Schwarzes Loch noch immer die gleiche Gravitationsanziehung auf benachbarte Objekte ausübt wie der Körper vor seinem Kollaps. Wäre die Sonne ein Schwarzes Loch und wäre es ihr gelungen, eines zu werden, ohne an Masse zu verlieren, dann würde sie noch immer, in genau der glei-

Der Horizont, der Rand des Schwarzen Lochs, wird von Lichtstrahlen gebildet, die es gerade nicht mehr schaffen, dem Schwarzen Loch zu entkommen, sondern gezwungen werden, ewig auf derselben Raumfläche zu verharrten.





(Abb. 4.14)
EIN SCHWARZES LOCH IM ZENTRUM EINER GALAXIE
 Links: Die Galaxie NGC 4151, aufgenommen mit der Wide-Field Planetary Camera des Hubble-Weltraumteleskops. Mitte: Die horizontale Linie, die durch das Bild geht, stammt von dem Licht, welches das Schwarze Loch im Zentrum von 4151 erzeugt. Rechts: Bild, das die Geschwindigkeit von Sauerstoffemissionen zeigt. Alle Hinweise lassen darauf schließen, daß NGC 4151 ein Schwarzes Loch enthält, das rund hundert Millionen mal mehr Masse besitzt als die Sonne.

chen Weise wie heute, von ihren Planeten umkreist werden.
 Eine Methode, nach einem Schwarzen Loch zu suchen, besteht deshalb darin, nach Materie Ausschau zu halten, die ein offenbar kompaktes und massereiches, aber unsichtbares Objekt umkreist. Inzwischen sind eine ganze Reihe solcher Systeme beobachtet worden. Wohl am eindrucksvollsten sind die riesigen Schwarzen Löcher, die in den Zentren von Galaxien und Quasaren auftreten (Abb. 4.14).

Soweit wir die Eigenschaften von Schwarzen Löchern bisher erörtert haben, werfen sie keine großen Probleme in bezug auf den Determinismus auf. Zwar geht für einen Astronauten, der in ein Schwarzes Loch fällt und an die Singularität gelangt, die Zeit zu Ende. Doch in der allgemeinen Relativitätstheorie hat man die Möglichkeit, die Zeit mit verschiedenen Geschwindigkeiten an verschiedenen Orten zu messen. Man könnte den Lauf der Uhr des Astronauten bei Annäherung an die Singularität so weit beschleunigen, daß sie trotzdem ein unendliches Zeitintervall mäßige. In dem Zeit-Abstand-Diagramm würden sich die Flächen der konstanten Werte dieser neuen Zeit alle im Mittelpunkt zusammendrängen, unterhalb des Punktes, an dem die Singularität aufgetreten ist. In der fast flachen Raumzeit fern vom Schwarzen Loch würde die neue Zeitkoordinate dagegen mit dem gewöhnlichen Zeitmaß übereinstimmen (Abb. 4.15).

Man könnte diese Zeit in der Schrödinger-Gleichung verwenden, um die Wellenfunktion zu späteren Zeitpunkten zu berechnen - vorausgesetzt, die Wellenfunktion ist einem ursprünglich bekannt gewesen. Damit bleibt der Determinismus unangetastet. Allerdings sei darauf hingewiesen, daß sich zu späteren Zeitpunkten ein Teil der Wellenfunktion im Schwarzen Loch befindet, wo er sich den Blicken eines äußeren Beobachters entzieht. Also kann ein Beobachter, der umsichtig genug ist, einen Sturz ins Schwarze Loch zu vermeiden, die Schrödinger-Gleichung nicht rückwärts entwickeln und die Wellenfunktion für frühere Zeitpunkte berechnen. Dazu müßte er den Teil der Wellenfunktion kennen, der nur einem Beobachter im Innern eines Schwarzen Lochs zugänglich



Die Abbildung oben zeigt einen Astronauten, der um 11.59.57 Uhr auf einem kollabierenden Stern landet. Der Stern unterschreitet schrumpfend den kritischen Radius, so daß kein Signal mehr von ihm entweichen kann. Der Astronaut sendet in regelmäßigen Intervallen Signale von seiner Uhr an ein Raumschiff, das den Stern umkreist.

Wer den Stern aus einer gewissen Entfernung beobachtet, wird nicht sehen, wie seine Oberfläche hinter dem Ereignishorizont verschwindet und in das Schwarze Loch eintritt. Vielmehr wird der Stern den Eindruck hervorrufen, gerade noch außerhalb des kritischen Radius zu schweben, und eine Uhr auf seiner Oberfläche wird sich scheinbar verlangsamen und zum Stillstand kommen.



Das Keine-Haare-Theorem
(»Glatzensatz«)

DIE TEMPERATUR EINES SCHWARZEN LOCHS

Ein Schwarzes Loch emittiert Strahlung, als wäre es ein heißer Körper mit einer Temperatur T , die nur von seiner Masse abhängt. Genauer, die Temperatur ist durch die folgende Formel gegeben

$$T = \frac{hc^3}{8\pi kGM}$$


In dieser Formel steht das Symbol c für die Lichtgeschwindigkeit, h für die Plancksche Konstante, G für Newtons Gravitationskonstante und K für die Boltzmannsche Konstante. M schließlich bezeichnet die Masse des Schwarzen Lochs, woraus folgt, daß die Temperatur um so höher ist, je leichter das Schwarze Loch wird. Dieser Formel können wir entnehmen, daß die Temperatur eines Schwarzen Lochs von wenigen Sonnenmassen nur etwa ein millionstel Grad über dem absoluten Nullpunkt liegt.

ist. Dieser Teil enthält die Information über alles, was jemals ins Schwarze Loch gefallen ist. Von außen ist diese Information dem Schwarzen Loch nicht anzusehen - sein Erscheinungsbild hängt nur von seiner Masse und seiner Rotationsgeschwindigkeit ab, nicht aber von der Beschaffenheit des Körpers, aus dessen Kollaps es entstanden ist. John Wheeler nannte dieses Resultat »Ein Schwarzes Loch hat keine Haare«. Für die Franzosen war das natürlich eine Bestätigung ihres Argwohns.


Die Schwierigkeit mit dem Determinismus ergab sich, als ich entdeckte, daß Schwarze Löcher nicht vollkommen schwarz sind. Wie ich in Kapitel 2 gezeigt habe, folgt aus der Quantentheorie, daß Felder selbst im Vakuum nicht genau gleich null sein können. Wären sie das, hätten sie sowohl einen exakten Wert oder eine exakte Position von null als auch eine exakte Änderungsrate oder Geschwindigkeit, ebenfalls von null. Das wäre ein Verstoß gegen die Unschärferelation, nach der Position und Geschwindigkeit nicht beide wohldefiniert sein können. Statt dessen müssen alle Felder ein gewisses Maß an Vakuumfluktuationen aufweisen (genauso wie das Pendel in Kapitel 2 Nullpunktschwingungen ausführte). Vakuumfluktuationen lassen sich auf mehrere Arten interpretieren, die auf den ersten Blick verschieden erscheinen mögen, tatsächlich aber mathematisch äquivalent sind. Aus positivistischer Sicht steht es uns frei, die Deutung heranzuziehen, die sich beim anstehenden Problem als nützlichste erweist. Im vorliegenden Fall ist es hilfreich, wenn wir uns die Vakuumfluktuationen als Paare virtueller Teilchen vorstellen, die an einem Punkt der Raumzeit gemeinsam erscheinen, sich auseinanderbewegen, wieder zusammenkommen und sich gegenseitig vernichten. »Virtuell« heißt, daß diese Teilchen nicht direkt beobachtet werden können. Auswirkungen lassen sich aber indirekt messen, und zwar in bemerkenswerter Übereinstimmung der Meßergebnisse mit den theoretischen Vorhersagen (Abb. 4.16).

In der Nähe eines Schwarzen Lochs kann ein Partner des Teilchenpaares ins Schwarze Loch fallen und es dem anderen Teilchen ermöglichen, ins Unendliche zu entweichen (Abb. 4.17). Für einen Beobachter, der weit vom Schwarzen Loch entfernt ist, scheint das entweichende Teilchen vom Schwarzen Loch emittiert worden zu sein - als sende das Schwarze Loch Strahlung aus. Das Spektrum dieser Strahlung eines Schwarzen Lochs entspricht genau unserer Erwartung von einem heißen Körper mit einer Temperatur, die dem Gravitationsfeld am Horizont - dem Rand - des Schwarzen Lochs proportional ist. Daraus ergibt sich, daß die Temperatur eines Schwarzen Lochs von seiner Größe abhängt.

Ein Schwarzes Loch von einigen Sonnenmassen hätte eine Temperatur von ungefähr einem Millionstel Grad über dem absoluten Nullpunkt, und ein größeres Schwarzes Loch hätte sogar eine noch niedrigere Temperatur. Daher würde jede Quantenstrahlung solcher Schwarzen Löcher von der 2,7-Grad-Strahlung des Urknalls vollkommen überlagert werden -




(Abb. 4.17)
Oben: In der Nähe eines Schwarzen Lochs treten virtuelle Teilchen auf und vernichten sich wieder gegenseitig. Gelegentlich stürzt ein Partner des Paares in das Schwarze Loch, während seinem Zwilling die Flucht ins Freie gelingt. Von außen betrachtet scheint es, als emittiere das Schwarze Loch die entweichenden Teilchen.



(Abb. 4.16)
Links: Im leeren Raum treten Teilchenpaare auf und vernichten sich nach kurzer Existenz wieder.

Ereignisse, die der Beobachter niemals sehen wird



(Abb. 4.18) Die de-Sitter-Lösung der Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie entspricht einem Universum, das inflationär expandiert. In dem Diagramm ist die Zeit senkrecht und die Größe des Universums waagerecht abgebildet. Die räumlichen Entfernungen wachsen so rasch an, daß uns das Licht ferner Galaxien nie erreicht. Dadurch entsteht, ähnlich wie bei einem Schwarzen Loch, ein Ereignishorizont, der uns von jener Region abgrenzt, die wir nicht beobachten können.

jener kosmischen Hintergrundstrahlung, von der in Kapitel 2 die Rede war. Die Strahlung von viel kleineren und heißeren Schwarzen Löchern ließe sich zwar entdecken, aber von ihnen scheint es nicht viele zu geben. Das ist schade, denn würde man eines entdecken, bekäme ich einen Nobelpreis. Allerdings gibt es indirekte, aus Beobachtungen abgeleitete Hinweise auf diese Art von Strahlung, und diese Hinweise entstammen dem frühen Universum. Wie in Kapitel 3 beschrieben, nehmen wir an, das Universum habe zu einem sehr frühen Zeitpunkt in seiner Geschichte eine inflationäre Phase durchlaufen, in der es mit unablässig anwachsender Geschwindigkeit expandiert ist. Durch das Ausmaß der Expansion in dieser Phase hätten sich einige Objekte so weit von uns entfernt, daß ihr Licht uns nie erreichen könnte; das Universum wäre zu stark und zu rasch expandiert, während sich dieses Licht auf uns zu bewegt hätte. Dann gäbe es für uns im Universum einen Horizont, der wie der Horizont eines Schwarzen Lochs wäre, das heißt, er würde die Region, aus der Licht uns erreichen kann, von der Region trennen, aus der kein Licht zu uns gelangen kann (Abb. 4.18).

Sehr ähnliche Argumente wie diejenigen, die ich oben für den Fall Schwarzer Löcher angeführt habe, zeigen, daß es dort dann auch eine Wärmestrahlung geben müßte, wie sie vom Horizont eines Schwarzen Lochs ausgeht. Aufgrund von Erfahrungswerten erwarten wir bei der Wärmestrahlung ein charakteristisches Spektrum von Dichtefluktuationen. In diesem Fall wären die Dichtefluktuationen mit dem Universum expandiert. Sobald ihre Längenskala die Größe des Ereignishorizonts überschritten hätte, wären sie erstarrt, so daß wir sie heute als kleine Schwankungen in der Temperatur der aus dem frühen Universum stammenden Hintergrundstrahlung beobachten müßten. Die tatsächlichen Messungen solcher Schwankungen stimmen mit den Vorhersagen thermischer Fluktuationen bemerkenswert genau überein.

Auch wenn die Hinweise auf die Strahlung Schwarzer Löcher etwas indirekt sind, gilt es doch unter allen Fachleuten, die sich mit dem Problem befaßt haben, als erwiesen, daß ihre Existenz für die Konsistenz unserer anderen empirisch überprüften Theorien zwingend erforderlich ist. Diese Einschätzung ist von weitreichender Bedeutung für die Frage des Determinismus. Die Strahlung entzieht dem Schwarzen Loch Energie, daher verliert es an Masse und wird kleiner. Dies wiederum hat zur Folge, daß seine Temperatur steigt und seine Strahlungsleistung anwächst. Das Schwarze Loch schrumpft unablässig bis zur Masse null. Was dann passiert, können wir nicht berechnen, doch nach allem, was wir wissen, müßte das Schwarze Loch dann ganz verschwinden. Was geschieht aber dann mit dem Teil der Wellenfunktion, der sich im Schwarzen Loch befindet, und der in ihr enthaltenen Information über alle ins Schwarze Loch gestürzten Dinge? Spontan mag uns als erstes die Vermutung in den Sinn kommen, die Wellenfunktion und die Information, die sie trägt, käme wieder zum Vorschein, wenn das Schwarze Loch ganz verschwunden wäre. Doch Information kann nicht völlig kostenlos übermittelt werden, was jedem von uns spätestens dann klar wird, wenn er seine Telefonrechnung bekommt.

Information braucht Energie, um übertragen zu werden, und in den Endstadien eines Schwarzen Lochs ist nur noch sehr wenig Energie übrig. Wie kommt sie also aus ihm heraus? Der einzige denkbare Ausweg wäre, daß die Information das Schwarze Loch kontinuierlich mit der Strahlung verläßt und nicht wartet, bis es in sein Endstadium getreten ist. Doch denken wir an unser virtuelles Teilchenpaar, bei dem das eine ins Schwarze Loch fällt und das andere entkommt, so erscheint es nicht plausibel, daß das entweichende Teilchen in irgendeiner Beziehung zu den





(Abb. 4.19) Die positive Energie, die durch die Wärmestrahlung vom Ereignishorizont davongetragen wird, verringert die Masse des Schwarzen Lochs. Während es an Masse verliert, steigen seine Temperatur und damit auch seine Strahlungsrate immer rascher an. Wir wissen nicht, was geschieht, wenn seine Masse außerordentlich klein wird, doch die wahrscheinlichste Konsequenz wäre, daß das Schwarze Loch vollständig verschwände.

Dingen steht, die in das Schwarze Loch hineingefallen sind, das heißt, Information über sie davonträgt. Die einzig mögliche Antwort scheint also zu lauten: Die Information in dem Teil der Wellenfunktion, der sich im Schwarzen Loch befindet, geht verloren (Abb. 4.19).

Ein solcher Verlust hätte große Bedeutung für den Determinismus. Selbst wenn uns die Wellenfunktion nach Verschwinden des Schwarzen Lochs bekannt wäre, könnte man sie mit der Schrödinger-Gleichung nicht so weit rückwärts entwickeln, daß wir wüßten, wie sie vor der Bildung des Schwarzen Lochs ausgesehen hat. Die Ursache wäre jenes Stück der Wellenfunktion, das im Schwarzen Loch verlorengegangen wäre. Wir glauben, wir könnten in der Vergangenheit lesen wie in einem offenen Buch. Doch wenn Information in Schwarzen Löchern verlorenginge, wäre das nicht der Fall. Dann hätte alles mögliche passiert sein können, und wir wären nicht in der Lage, es zu rekonstruieren.


Im allgemeinen sind Menschen wie Astrologen und ihre Klientel mehr an einer Vorhersage der Zukunft interessiert als an einer Rekonstruktion der Vergangenheit. Auf den ersten Blick scheint es, als hindere uns der Verlust eines Teils der Wellenfunktion in den Tiefen des Schwarzen Lochs nicht daran, die Wellenfunktion außerhalb des Schwarzen Lochs vorherzusagen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Dieser Verlust



(Abb. 4.20) In dem Gedankenexperiment von Einstein, Podolsky und Rosen kennt der Beobachter, der den Spin der Teilchen mißt, automatisch auch den Spin des zweiten Teilchens.

schränkt unsere Vorhersagemöglichkeiten extrem ein, wie ein Gedankenexperiment zeigt, das Einstein, Boris Podolsky und Nathan Rosen in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts vorgeschlagen haben.

Stellen wir uns vor, ein radioaktives Atom zerfällt und emittiert zwei Teilchen in entgegengesetzte Richtung und mit entgegengesetztem Spin. Ein Beobachter, der nur ein Teilchen betrachtet, kann nicht wissen, ob sein Spin nach oben oder unten gerichtet ist. Doch wenn ein Beobachter mißt, daß der Spin des einen Teilchens nach oben gerichtet ist, dann kann er mit Gewißheit vorhersagen, daß der des anderen nach unten gerichtet ist und umgekehrt (Abb. 4.20). Nach Einsteins Auffassung bewies dieses Gedankenexperiment die Lächerlichkeit der Quantentheorie: Das andere Teilchen könnte sich auf der anderen Seite der Milchstraße befinden, und doch wüßte man sofort, wie sein Spin wäre. Die meisten anderen Wissenschaftler sind allerdings der Meinung, Einstein selbst sei das Problem gewesen und nicht die Quantentheorie. Das Einstein-Podolsky-Rosen-Gedankenexperiment beweist nicht, daß man Information rascher als das Licht übertragen kann. Das wäre in der Tat lächerlich. Niemand kann bestimmen, daß bei seinem eigenen Teilchen ein Spin nach




(Abb. 4.21) Ein virtuelles Teilchenpaar hat eine Wellenfunktion, die vorhersagt, daß die beiden Teilchen entgegengesetzte Spins haben. Doch wenn ein Teilchen in das Schwarze Loch fällt, läßt sich der Spin des verbleibenden Teilchens nicht mehr mit Gewißheit vorhersagen.

oben gemessen wird, und somit kann auch niemand beeinflussen, welchen Spin das Teilchen des fernen Beobachters besitzt (etwa, um ihm auf diese Weise eine Nachricht zu übermitteln).

Tatsächlich zeigt dieses Gedankenexperiment genau, was mit der Strahlung Schwarzer Löcher geschieht. Das virtuelle Teilchenpaar hat eine Wellenfunktion, die vorhersagt, daß die beiden Partner mit Sicherheit entgegengesetzte Spins haben (Abb. 4.21). Wir würden gern den Spin und die Wellenfunktion des entweichenden Teilchens vorhersagen, wozu wir in der Lage wären, wenn wir das Teilchen beobachten könnten, das hineingefallen ist. Doch dieses Teilchen befindet sich jetzt im Schwarzen Loch, wo sich sein Spin und seine Wellenfunktion nicht mehr messen lassen.

Infolgedessen können wir den Spin und die Wellenfunktion des entweichenden Teilchens nicht genau vorhersagen. Für Spin und Wellenfunktion gibt es verschiedene Möglichkeiten - jede mit eigenen Wahrscheinlichkeiten -, nicht nur eine einzige. Offenbar wird unsere Fähigkeit, die Zukunft zu prognostizieren, noch weiter eingeschränkt. Laplaces klassischer Determinismus – sowohl die Positionen als auch die Geschwindigkeiten von Teilchen lassen sich vorhersagen – mußte




Einander durchdringende Brane

Schwarzes Loch

modifiziert werden, als die Unschärferelation zeigte, daß sich nicht beides zugleich genau messen läßt. Man könnte allerdings immer noch die Wellenfunktion messen und mit Hilfe der Schrödingergleichung vorhersagen, wie sie in Zukunft aussähe. Das würde es uns ermöglichen, mit Gewißheit eine Kombination aus Position und Geschwindigkeit vorherzusagen - also die Hälfte dessen, was man nach Laplaces Auffassung vorhersagen kann. Wir können mit Gewißheit vorhersagen, daß die Teilchen entgegengesetzte Spins haben, doch wenn ein Teilchen in das Schwarze Loch fällt, ist keine zuverlässige Vorhersage über das verbleibende Teilchen möglich. Folglich gibt es keine Messung außerhalb des Schwarzen Lochs, die sich mit Bestimmtheit vorhersagen läßt: Unsere Fähigkeit, eindeutige Vorhersagen zu machen, ist auf null reduziert. Also ist die Astrologie vielleicht gar nicht so viel schlechter geeignet, die Zukunft zu prophezeien, als die Naturgesetze. Vielen Physikern mißfiel diese Einschränkung des Determinismus, und sie vertraten deshalb die Auffassung, die Information über das, was sich im Innern eines Schwarzen Lochs befinde, könne irgendwie aus ihm hinausgelangen. Jahrelang war es nur eine fromme Hoffnung, daß man irgendeine

(Abb. 4.22) Schwarze Löcher kann man sich als Schnittstellen von p -Branen in den zusätzlichen Dimensionen der Raumzeit vorstellen. Informationen über die inneren Zustände von Schwarzen Löchern würden als Wellen auf den p -Branen gespeichert werden.



(1)


(2)

(Abb. 4.23)
 Ein Teilchen, das in ein Schwarzes Loch fällt, läßt sich als eine geschlossene Stringschleife denken, die auf eine p-Bran trifft (1). Sie ruft Wellen in der p-Bran hervor (2). Wellen können zusammentreffen und bewirken, daß ein Teil der p-Bran als geschlossener String abbricht (3). Das wäre ein von einem Schwarzen Loch emittiertes Teilchen.

Lösung zur Rettung dieser Information finden werde. Doch 1996 erzielten Andrew Strominger und Cumrun Vafa einen wichtigen Fortschritt. Sie gingen von der Annahme aus, ein Schwarzes Loch sei aus einer Anzahl von p-Branen zusammengesetzt.

Erinnern wir uns, daß man sich p-Branen unter anderem als verschieden-dimensionale Analoga von Flächen vorstellen kann, die sich durch die drei Dimensionen des Raums und durch sieben zusätzliche, unserer Wahrnehmung entzogene Dimensionen bewegen (Abb. 4.22, S. 133). Teile dieser Flächen können Schwingungen vollführen, und diese Schwingungen können Wellen anregen, die sich in der Fläche fortpflanzen. Für bestimmte Fälle kann man zeigen, daß die möglichen Wellenanregungen auf den p-Branen gerade diejenige Informationsmenge kodieren können, die man für ein Schwarzes Loch erwarten würde. Wenn Teilchen auf die p-Branen treffen, erregen sie auf ihnen zusätzliche Wellen. Entsprechend gilt: Wenn sich Wellen auf den Branen in verschiedene Richtungen bewegen und an einem Punkt zusammentreffen, können sie einen Gipfel erzeugen, der so hoch ist, daß ein Stück der Bran abbricht und als Teilchen emittiert wird. Branen können wie Schwarze Löcher Teilchen absorbieren und emittieren (Abb. 4.23).

Man kann das p-Branen-Modell als »effektive Theorie« ansehen; das heißt, man muß nicht unbedingt glauben, daß sich tatsächlich kleine Membranen durch eine flache Raumzeit bewegen, um anzunehmen, Schwarze Löcher könnten sich so verhalten, als bestünden sie aus solchen Membranen. Das ist wie mit dem Wasser: Es besteht aus Milliarden



(3)

und Abermilliarden H₂O-Molekülen, die in komplizierten Wechselwirkungen stehen. Doch eine homogene Flüssigkeit ist ein sehr gutes effektives Modell. Das mathematische Modell von Schwarzen Löchern, die aus p-Branen bestehen, liefert Ergebnisse, die dem oben gezeichneten Bild des virtuellen Teilchenpaares ähneln. Aus positivistischer Sicht ist es daher ein ebenso gutes Modell, zumindest für bestimmte Klassen von Schwarzen Löchern. Für diese Klassen sagt das p-Branen-Modell genau die gleiche Emissionsrate vorher, zu der wir auch gelangen, wenn wir das Modell des virtuellen Teilchenpaares zugrunde legen. Es gibt allerdings einen wichtigen Unterschied: Im p-Branen-Modell wird die Information über das, was in das Schwarze Loch fällt, in der Wellenfunktion für die Wellen auf den p-Branen gespeichert. Die p-Branen werden als Flächen in der flachen Raumzeit angesehen. Aus diesem Grund fließt die Zeit gleichmäßig vorwärts, die Bahnen der Lichtstrahlen werden nicht gekrümmt, und die Information in den Wellen geht nicht verloren. Statt dessen wird die Information irgendwann wieder in der Strahlung der p-Branen aus dem Schwarzen Loch austreten.

Nach dem p-Branen-Modell können wir also mit Hilfe der Schrödinger-Gleichung berechnen, wie die Wellenfunktion zu späteren Zeitpunkten beschaffen sein wird. Nichts geht verloren, und die Zeit schreitet gleichmäßig voran. Es ergibt sich ein vollständiger Determinismus im quantentheoretischen Sinne.





Welche dieser Interpretationen trifft also zu? Geht ein Teil der Wellenfunktion in den Tiefen Schwarzer Löcher verloren, oder kommt alle Information wieder heraus, wie das p-Branen-Modell nahelegt? Das ist heute eine der wichtigsten Fragen in der theoretischen Physik. Viele Fachleute sind der Meinung, die jüngere Forschung zeige, daß die Information nicht verlorengehe. Die Welt sei zuverlässig und vorhersagbar, und nichts Unerwartetes könne eintreten. Aber das ist nicht so ganz eindeutig. Wenn wir Einsteins allgemeine Relativitätstheorie ernst nehmen, müssen wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß sich die Raumzeit unter Umständen so stark verzerren kann, daß in ihren Falten Information verlorengeht. Als das Raumschiff Enterprise durch ein Wurmloch fuhr, geschah etwas Unerwartetes. Ich weiß es, denn ich war an Bord und habe mit Newton, Einstein und Data gepokert. Dabei erlebte ich eine große Überraschung. Schauen Sie, wer da plötzlich auf meinen Knien erschien.




KAPITEL 5

DIE VERGANGENHEIT SCHÜTZEN

*Sind Zeitreisen möglich?
Könnte eine fortgeschrittene Zivilisation in die Vergangenheit
reisen und sie verändern?*






Stephen W. Hawking ist (nachdem er eine frühere Wette zu diesem Thema verloren hat, weil er es unterließ, untypische Spezialfälle auszuschließen) noch immer der felsenfesten Überzeugung, daß nackte Singularitäten ein Anathema sind und von den Gesetzen der klassischen Physik in Acht und Bann getan werden müßten. Hingegen betrachten John Preskill und Kip Thorne (nachdem sie die frühere Wette gewonnen haben) nackte Singularitäten noch immer als Objekte der Quantengravitation, die es für jeden sichtbar, weil von keinem Horizont verhüllt, im Universum geben könnte. Daher bietet Hawking - und akzeptieren Preskill/Thorne - die folgende Wette: Wenn klassische Materie oder ein klassisches Feld von irgendeiner Form, die nicht fähig ist,

in flacher Raumzeit singularär zu werden, mit der allgemeinen Relativitätstheorie durch die klassischen Einstein-Gleichungen gekoppelt wird, dann kann eine dynamische Entwicklung aus allgemeinen Anfangsbedingungen (das heißt, aus einer offenen Menge von Anfangsdaten) niemals eine nackte Singularität hervorbringen (eine vergangenheitsunvollständige Nullgeodäte von τ_+). Der Verlierer hat dem Gewinner Kleidung zu stellen, um dessen Nacktheit zu verhüllen. Die Kleidung ist mit einer geeigneten, die Niederlage aufrichtig bekennenden Mitteilung zu besticken.

Stephen W. Hawking John P. Preskill & Kip S. Thorne
Pasadena, Kalifornien, 5. Februar 1997




Mein Freund und Kollege Kip Thorne, mit dem ich schon eine ganze Reihe von Wetten abgeschlossen habe (links), denkt nicht daran, den ausgetretenen Pfaden der Physik zu folgen, nur weil es alle anderen tun. Das gab ihm den Mut, als erster ernsthafter Wissenschaftler Zeitreisen als praktische Möglichkeit in Erwägung zu ziehen.

Es ist eine heikle Angelegenheit, offen über Zeitreisen zu spekulieren. Entweder riskiert man den Vorwurf, öffentliche Gelder für lächerliche Projekte zu verschwenden, oder die Forderung, seine Forschung militärischer Geheimhaltung zu unterwerfen. Wie sollten wir uns gegen einen Feind schützen, der eine Zeitmaschine besitzt? Er könnte den Gang der Geschichte verändern und die Welt beherrschen. Nur wenige Forscher besitzen die Kühnheit, sich mit Dingen zu beschäftigen, die so massiv gegen die politische Korrektheit der Physikerzunft verstoßen. Und wenn sie es tun, dann reden sie nicht direkt von »Zeitreisen«, sondern benutzen Fachbegriffe, um ihr Treiben zu tarnen.

Die Grundlage für alle modernen Erörterungen der Zeitreise ist Einsteins Relativitätstheorie. Wie wir in früheren Kapiteln gesehen haben, verleihen Einsteins Gleichungen Raum und Zeit dynamische Qualität, denn sie beschreiben, wie die im Universum enthaltene Materie und Energie Raum und Zeit krümmen und verzerren. Nach der allgemeinen Relativitätstheorie schreitet die persönliche Zeit eines Beobachters, die er mit seiner eigenen Uhr mißt, zwar genauso unablässig voran wie in der Newtonschen Theorie oder in der fla-



Kip Thorne



(Abb. 5.1)



chen Raumzeit der speziellen Relativitätstheorie, doch kann nun die Raumzeit so gekrümmt sein, daß Sie, wenn Sie mit einem Raumschiff davonfliegen, zurückkommen können, bevor Sie zu Ihrer Reise aufgebrochen sind (Abb. 5.1).

Eine Möglichkeit, derartige Situationen herbeizuführen, könnten Wurmlöcher sein, jene hypothetischen, in Kapitel 4 erwähnten Raumzeitröhren, die verschiedene Regionen von Zeit und Raum verbinden. Ein Raumschiff, das in das eine Ende eines solchen Wurmlochs gelenkt wird, würde sich beim Austritt am anderen Ende an einem völlig anderen Ort im All befinden - und wäre vielleicht sogar in der Zeit gereist (Abb. 5.2, S. 144/145).

Wurmlöcher wären, wenn sie denn existieren, die Lösung für das Problem der Einsteinschen Geschwindigkeitsbegrenzung im All: Es würde mehrere zehntausend Jahre dauern, um unsere Milchstraße mit einem Raumschiff zu durchqueren, das langsamer als das Licht vorankommt, wie es die Relativitätstheorie verlangt. Mit Hilfe eines günstig gelegenen Wurmlochs könnten Sie sich jedoch zur anderen Seite der Milchstraße begeben und rechtzeitig zum Abendessen zurück sein. Es läßt sich sogar zeigen, daß Sie mit Hilfe eines solchen Wurmlochs zurückkehren könnten, bevor Sie überhaupt aufgebrochen wären. Nun könnten Sie auf den Gedanken verfallen, in solch einem Fall müßte es Ihnen, der Sie in die Vergangenheit zurückgekehrt sind, beispielsweise möglich sein, die Rakete, mit der Sie ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht zu Ihrer Zeitreise





aufgebrochen sind, auf ihrer Startrampe in die Luft zu jagen, um so Ihren eigenen Start zu verhindern. Das ist eine Variante des Großvaterparadoxons: Was geschieht, wenn Sie in der Zeit zurückgehen und Ihren Großvater umbringen, bevor er Ihren Vater gezeugt hat (Abb. 5.3, S. 146)?


Natürlich ist das nur dann ein Paradoxon, falls Sie glauben, Sie wären vollkommen frei in Ihrem Tun, wenn Sie in der Zeit zurückkreisten. Ich werde mich in diesem Buch nicht auf eine philosophische Erörterung der Willensfreiheit einlassen, sondern mich auf die Frage beschränken, ob sich die Raumzeit laut unseren physikalischen Gesetzen so krümmen kann, daß ein makroskopischer Körper wie ein Raumschiff in seine eigene Vergangenheit zurückkehren könnte. Nach Einsteins Theorie muß sich ein Raumschiff zwangsläufig mit weniger als der lokalen Lichtgeschwindigkeit bewegen - es kann niemals schneller sein als Licht, das sich neben dem Raumschiff in derselben Richtung fortbewegt. Eine solche Bahn durch die Raumzeit heißt »zeitartig«. Damit können wir die

FLACHES WURMLOCH



(Abb. 5.2) ZWEITE VARIATION ÜBER DAS ZWILLINGSPROBLEM

(1)
Wenn es ein Wurmloch gäbe, dessen Enden intern nahe beieinander lägen, könnten Sie das Wurmloch gleichzeitig betreten und verlassen.



(2)
Es ist vorstellbar, daß man ein Ende des Wurmlochs auf eine lange Reise an Bord eines Raumschiffs mitnimmt, während das andere Ende auf der Erde bleibt.

(3)
Dem Zwillingsproblem gemäß ist bei der Rückkehr des Raumschiffs für die Wurmlochöffnung an Bord weniger Zeit verstrichen als für die Öffnung, die auf der Erde verblieben ist. Wenn Sie also die Öffnung auf der Erde betreten, könnten Sie aus der im Raumschiff befindlichen Wurmlochöffnung zu einem früheren Zeitpunkt herauskommen.

KOSMISCHE STRINGS

Kosmische Strings sind lange, schwere Objekte mit winzigem Querschnitt, die möglicherweise in den Frühstadien des Universums entstanden sind. Nachdem sie sich gebildet hatten, wurden sie durch die Expansion des Universums noch weiter gedehnt, so daß sich heute ein einziger kosmischer String über die ganze Länge unseres beobachtbaren Universums erstrecken könnte. Die Existenz kosmischer Strings wird durch moderne Teilchentheorien nahegelegt, die vorher-sagen, daß sich die Materie in den heißen Frühstadien des Universums in einer symmetrischen Phase befand, etwa wie flüssiges Wasser: Dessen Symmetrie besteht darin, daß es an jedem Punkt aus jeder Richtung betrachtet gleich aussieht, im Gegensatz zu Eiskristallen, die von Ort zu Ort unterschiedliche Strukturen besitzen. Als das Universum abkühlte, konnte die Symmetrie der Frühphase, so die Theorie, in fernen Regionen auf unterschiedliche Weise gebrochen werden. Folglich konnte die kosmische Materie in diesen Regionen verschiedene Grundzustände annehmen. Kosmische Strings sind Materiekonfigurationen an den Grenzen zwischen diesen Regionen. Insofern war ihre Bildung eine unvermeidliche Konsequenz der Tatsache, daß sich verschiedene Regionen nicht auf ein und denselben Grundzustand einigen konnten.



(Abb. 5.3)
Kann sich eine Pistolenkugel, die durch ein Wurmloch in eine frühere Zeit abgefeuert wird, auf den Schützen auswirken?

Frage nach Zeitreisen in Fachbegriffe fassen: Läßt die Raumzeit geschlossene zeitartige Kurven zu - das heißt, Kurven, die wieder und wieder zu ihrem Ausgangspunkt in der Raumzeit zurückkehren? Solche Bahnen werde ich im folgenden als »Zeitschleifen« bezeichnen.

Es gibt drei Ebenen, auf denen wir nach einer Antwort auf diese Frage suchen können. Die erste ist Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, in der eine eindeutige Geschichte des Universums ohne irgendwelche Unbestimmtheit vorausgesetzt wird. Aus dieser klassischen Theorie ergibt sich ein ziemlich vollständiges Bild. Doch wie wir gesehen haben, kann diese Theorie nicht ganz richtig sein, weil wir beobachten, daß die Materie der Unschärferelation und Quantenfluktuationen unterworfen ist.

Also können wir die Frage nach Zeitreisen auf einer zweiten Ebene stellen, der einer sogenannten semiklassischen Theorie. In diesem Fall gehen wir davon aus, daß sich Materie gemäß der Quantentheorie verhält, unbestimmt und mit Quantenfluktuationen, daß aber die Raumzeit eindeutig und klassisch ist. Hier ist das Bild, das uns die heutige Physik liefert, weniger vollständig, aber wir haben immerhin eine gewisse Vorstellung, wie wir vorzugehen haben.

Schließlich wäre da noch die Quantentheorie der Gravitation, wie auch immer sie aussehen mag. Gemäß dieser Theorie, nach der nicht nur die Materie, sondern auch Zeit und Raum unbestimmt sind und fluktuieren, wäre noch nicht einmal klar, wie die Frage nach der Möglich-



(Abb. 5.4)
Läßt die Raumzeit zeitartige Kurven zu, die geschlossen sind, das heißt, immer und immer wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren?

keit oder Unmöglichkeit von Zeitreisen zu stellen ist. Vielleicht sollten wir am besten fragen, wie Menschen in Regionen, wo die Raumzeit nahezu klassisch und frei von Unbestimmtheit ist, ihre Messungen interpretieren würden. Wären sie der Meinung, daß in Regionen starker Gravitation und großer Quantenfluktuationen Zeitreisen stattgefunden hätten?

Beginnen wir mit der klassischen Theorie: Die flache Raumzeit der speziellen Relativitätstheorie (Relativität ohne Gravitation) läßt keine Zeitreisen zu. Dasselbe gilt für die ersten gekrümmten Raumzeiten, mit denen sich die Physiker nach Einsteins Veröffentlichung seiner allgemeinen Relativitätstheorie beschäftigten. Daher war es ein großer Schock für Einstein, als Kurt Gödel - anderweitig bekannt durch seinen Unvollständigkeitssatz (siehe Kasten rechts) - 1949 eine Lösung der Einstein-Gleichungen fand, die einer Raumzeit voll rotierender Materie entsprach, in der Zeitschleifen durch jeden Punkt führen (Abb. 5.4).

In der Gödelschen Lösung war die kosmologische Konstante von null verschieden. Es ist nicht genau bekannt, ob dies in der Natur zutrifft oder nicht, doch später fand man auch Zeitschleifenlösungen ohne kosmologische Konstante. Ein besonders interessanter Fall ist eine Lösung, in der sich zwei kosmische Strings mit hoher Geschwindigkeit aneinander vorbeibewegen.

DER GÖDELSCHE UNVOLLSTÄNDIGKEITSSATZ

1931 bewies der Mathematiker Kurt Gödel seinen berühmten Unvollständigkeitssatz über das Wesen der Mathematik. Danach lassen sich in jedem hinreichend umfassenden formalen Axiomensystem, wie der heutigen Mathematik, Aussagen formulieren, die auf der Grundlage der das System definierenden Axiome weder bewiesen noch widerlegt werden können. Mit anderen Worten, Gödel hat gezeigt, daß es Probleme gibt, die sich durch kein System von Regeln oder Verfahren lösen lassen. Damit legte der Gödelsche Satz grundsätzliche Grenzen für die Mathematik fest. Das löste einen großen Schock in der Gemeinschaft der Wissenschaftler aus, herrschte doch bis dahin die allgemeine Überzeugung, die Mathematik sei ein schlüssiges und vollständiges System, das auf einem einheitlichen logischen Fundament aufbaue. Zusammen mit der Heisenbergschen Unschärferelation und der Chaostheorie erlegte der Gödelsche Unvollständigkeitssatz der wissenschaftlichen Erkenntnis fundamentale Beschränkungen auf, deren volle Bedeutung erst im Laufe des 20. Jahrhunderts erkannt wurde.



Kosmische Strings sollte man nicht mit den Strings der Stringtheorie verwechseln, obwohl es durchaus eine Beziehung zwischen ihnen gibt. Es handelt sich um Objekte mit Länge, aber nur einem winzigen Querschnitt. Ihr Vorkommen wird von einigen teilchenphysikalischen Theorien vorhergesagt. Die Raumzeit außerhalb eines einzelnen kosmischen String ist flach. Doch es ist eine flache Raumzeit, aus der ein keilförmiges Stück ausgeschnitten ist, wobei sich das spitze Ende des Keils am String befindet. Das ist wie bei einem Kegel: Nehmen Sie eine große Kreisfläche aus Papier, und schneiden Sie ein Segment in Form eines Tortenstücks aus, einen Kegel mit der Spitze im Kreismittelpunkt. Legen Sie dann das ausgeschnittene Stück fort, und kleben Sie die Kanten des verbleibenden Stücks zusammen, so daß Sie einen Kegel erhalten. Er stellt die Raumzeit dar, in der der kosmische String vorhanden ist (Abb. 5.5).



(Abb. 5.5)


Da die Kegeloberfläche dasselbe flache Blatt Papier ist, mit dem Sie begonnen haben (minus dem Keil), können Sie es, vom Scheitelpunkt abgesehen, immer noch »flach« nennen. Daß es am Scheitelpunkt eine Krümmung gibt, können Sie daran erkennen, daß ein Kreis um den Scheitelpunkt einen geringeren Umfang hat als ein Kreis, der im gleichen Abstand vom Mittelpunkt auf dem ursprünglichen runden Blatt Papier gezogen würde. Mit anderen Worten, infolge des fehlenden Segments ist ein Kreis um den Scheitelpunkt kürzer als ein Kreis von gleichem Radius im flachen Raum (Abb. 5.6).

Gleiches gilt für einen kosmischen String: Der Keil, der aus der flachen Raumzeit entfernt wird, verkürzt Kreise um den String, wirkt sich aber nicht auf die Zeit und die Entfernungen entlang des String aus. Daraus folgt, daß die Raumzeit um einen einzelnen kosmischen String keine Zeitschleifen enthält, es ist in ihr also nicht möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Doch wenn ein zweiter kosmischer String vorhanden ist, der sich relativ zum ersten bewegt, ist die Zeitrichtung dieses zweiten String eine Kombination aus der Zeitrichtung und den Raumrichtungen des ersten. Das heißt, der Keil, der für den zweiten String ausgeschnitten wird, verkürzt aus der Sicht von jemandem, der sich mit dem ersten String bewegt, sowohl Entfernungen im Raum als auch die Zeitintervalle (Abb. 5.7). Bewegen sich die kosmischen Strings relativ zueinander fast mit Lichtgeschwindigkeit, dann kann die Zeitersparnis bei einer Reise um beide Strings herum so groß sein, daß man zurückkehrt, bevor man aufgebrochen ist. Mit anderen Worten, es gibt Zeitschleifen, denen man folgen kann, um in die Vergangenheit zu reisen.

Die Raumzeit kosmischer Strings enthält Materie, die eine positive Energiedichte aufweist und deren Eigenschaften mit den uns bekannten physikalischen Gesetzen konsistent sind. Doch die Krümmung, die die Zeitschleifen erzeugt, erstreckt sich unendlich weit in den Raum hinein und unendlich weit in die Vergangenheit zurück. In diesen Raumzeiten

(Abb. 5.6)

Keile mit nichtparallelen Rändern, die aus der Raumzeit entfernt worden sind




Ein Keil für einen einzelnen kosmischen String verkürzt die Entfernungen im Ruhesystem des String, wirkt sich aber nicht auf die Zeit aus.

(Abb. 5.7)



Ein zweiter Keil, der zur Konstruktion eines anderen bewegten kosmischen String ausgeschnitten wird, verkürzt die Entfernungen sowohl des Raumes als auch der Zeit im Ruhesystem des ersten kosmischen String.



(Abb. 5.8)
Selbst die fortgeschrittenste Zivilisation könnte die Raumzeit lediglich in einem endlichen Gebiet krümmen. Der Zeitreisehorizont, der Rand derjenigen Raumzeitregion, in der es möglich ist, in die eigene Vergangenheit zu reisen, wird durch Lichtstrahlen gebildet, die in einer endlichen Region ihren Anfang nehmen.

waren die Möglichkeiten zum Zeitreisen von vornherein eingebaut. Wir haben keinen Grund anzunehmen, daß unser eigenes Universum diese spezielle Art von Krümmung aufweist, und wir haben keine verlässlichen Beweise für Besucher aus der Zukunft. (Unberücksichtigt lasse ich hier die Verschwörungstheorie, nach der uns Ufos aus der Zukunft besuchen und staatliche Stellen davon wissen, aber es vertuschen. Schließlich haben sich die Behörden nicht gerade als Meister solcher Täuschungsmanöver erwiesen.) Ich gehe deshalb davon aus, daß es keine Zeitschleifen in der fernen Vergangenheit gab oder, genauer, in der Vergangenheit einer Fläche F durch die Raumzeit. Die Frage lautet dann: Könnte eine fortgeschrittene Zivilisation eine Zeitmaschine bauen? Das heißt, könnte sie die Raumzeit in der Zukunft von F so verändern (im Diagramm: die Region über der Fläche F), daß Zeitschleifen in einer endlichen Region aufrätren? Ich beschränke mich hier auf den Fall einer endlichen Region, weil die Zivilisation, egal, wie fortgeschritten sie wäre, wohl nur einen endlichen Teil des Universums unter Kontrolle haben könnte.

In der Wissenschaft liegt der Schlüssel zur Lösung eines Problems oft in seiner richtigen Formulierung. Dafür ist unser Fall ein gutes Beispiel. Um klarzustellen, was mit einer endlichen Zeitmaschine gemeint ist, habe ich auf frühere Arbeiten von mir zurückgegriffen. Zeitreisen sind möglich in einer Region der Raumzeit, in der es Zeitschleifen gibt, Bahnen, auf denen Objekte, die sich langsamer als das Licht bewegen, dank entsprechender Raumzeitkrümmung zum Ort und in die Zeit zurückkehren können, von denen sie aufgebrochen sind. Da ich von der Annahme



ausgegangen bin, daß es in der fernen Vergangenheit keine Zeitschleifen gegeben hat, muß etwas existieren, was ich »Zeitreisehorizont« nennen möchte, eine Grenze, die die Region der Zeitschleifen von der Region ohne Zeitschleifen trennt (Abb. 5.8).

Zeitreisehorizonte haben Ähnlichkeit mit den Horizonten Schwarzer Löcher. Während der Horizont eines Schwarzen Lochs von Lichtstrahlen gebildet wird, die es gerade noch vermeiden können, ins Schwarze Loch zu fallen, wird ein Zeitreisehorizont durch Lichtstrahlen definiert, die, einer Zeitschleife folgend, fast mit sich selbst zusammentreffen. Einer Zeitmaschine entspricht, was ich als »endlich erzeugter Horizont« bezeichne. Dieser Horizont besteht aus Lichtstrahlen, die alle aus einer begrenzten, endlich ausgedehnten Region kommen. Mit anderen Worten, sie kommen nicht aus dem Unendlichen oder aus einer Singularität, sondern entstehen in einer endlichen Region, jener Art von Region, von der wir wissen wollen, ob unsere erfundene fortgeschrittene Zivilisation sie herstellen kann.

Unsere endliche Zeitmaschine in dieser Weise über einen Horizont zu definieren hat den Vorteil, daß wir die mathematischen Techniken verwenden können, die Roger Penrose und ich entwickelt haben, um Singularitäten und Schwarze Löcher zu untersuchen. Sogar ohne Rückgriff auf die Einstein-Gleichungen kann ich zeigen, daß ein endlich erzeugter Horizont im allgemeinen mindestens einen Lichtstrahl enthält, der tatsächlich mit sich selbst zusammentrifft - einen Lichtstrahl, der wieder und wieder zum selben Raumzeitpunkt zurückkehrt. Jedesmal, wenn das Licht diesen Punkt passiert, ist seine Blauverschiebung größer als beim letzten Mal, so daß die Bilder blauer und blauer werden. Die Wellenkämme rücken immer dichter zusammen, und das Licht durchläuft die Schleife in immer kürzeren Intervallen seiner Zeit. Tatsächlich hätte ein solches Lichtteilchen, gemessen mit seinem eigenen Zeitmaß, nur eine endliche Geschichte. Von Teilchen, deren Bahn an einer Raumzeitsingularität endet, kennen wir so etwas bereits; hier tritt dieses Phänomen auf, obwohl das Teilchen, fern aller Singularitäten, in einer endlichen Region immer und immer wieder umläuft.

Es mag nichts Besorgniserregendes sein, wenn ein Lichtteilchen seine Geschichte in endlicher Zeit vollendete, aber ich kann beweisen, daß dasselbe Schicksal auch Objekte ereilen wird, die sich lang-



Die Frage lautet also: Könnte eine fortgeschrittene Zivilisation eine Zeitmaschine bauen?




(Abb. 5.9)
Die Gefahr von Zeitreisen

(Abb. 5.11, gegenüber)
Die Vorhersage, Schwarze Löcher strahlen und verlören Masse, bedeutet, daß infolge von Quanteneffekten negative Energie durch den Ereignishorizont in das Schwarze Loch fließt. Das Schwarze Loch kann nur an Größe verlieren, wenn die Energiedichte am Horizont negativ ist - das Vorzeichen, das erforderlich ist, um eine Zeitmaschine zu bauen.

samer als das Licht bewegen. Das könnten die Geschichten von Beobachtern sein, die vor dem Horizont in einer endlichen Region gefangen wären und immer rascher und rascher kreisten, bis sie nach endlicher Zeit Lichtgeschwindigkeit erreicht hätten. Wenn Sie also von einer schönen Außerirdischen in einer Fliegenden Untertasse zu einer Zeitreise eingeladen werden, überlegen Sie sich gut, was Sie tun. Sie könnten in eine dieser vertrackten Wiederholungsgeschichten von nur endlicher Dauer fallen (Abb. 5.9).

Diese Ergebnisse hängen nur von der Art und Weise ab, wie die Raumzeit sich krümmen müßte, damit sie in einer endlichen Region Zeitschleifen enthielte. Einsteins Gleichungen, die uns sagen, daß mit jeder Raumzeitkrümmung eine entsprechende Materieverteilung einhergehen muß, hatten wir dabei außer acht gelassen, doch wir können jetzt fragen, welche Art von Materie eine fortgeschrittene Zivilisation denn verwenden müßte, um die Raumzeit so zu krümmen, daß eine Zeitmaschine von endlicher Größe entstünde. Kann die verwendete Materie überall eine positive Energiedichte haben, wie in der oben beschriebenen Raumzeit kosmischer Strings? Wohlgemerkt: Meine Bedingung, daß die Zeitschleifen in einer endlichen Region auftreten, erfüllt die Raumzeit der bewegten kosmischen Strings nicht. Aber vielleicht liegt das ja nur daran, daß die kosmischen Strings unendlich lang sind. Man könnte auf die Idee kommen, es ließe sich möglicherweise eine endliche Zeitmaschine bauen, indem man endliche Schleifen aus kosmischen Strings verwendet und damit seine Zeitmaschine und trotzdem noch überall eine positive Energiedichte hat. Es tut mir leid, daß ich Leute wie Kip enttäuschen muß, die gern in die Vergangenheit reisen möchten, aber dieses Vorhaben läßt sich nicht so in die Tat umsetzen, daß die Energiedichte überall positiv ist. Ich kann beweisen, daß man zum Bau einer endlichen Zeitmaschine negative Energie braucht.


In der klassischen Theorie ist die Energiedichte immer positiv, daher können wir auf dieser Ebene Zeitmaschinen von endlicher Größe ausschließen. Anders ist die Situation jedoch in der semiklassischen Theorie, in der wir davon ausgehen, daß sich die Materie gemäß der Quantentheorie verhält, die Raumzeit aber wohldefiniert und klassisch ist. Wie wir gesehen haben, bedeutet die Unschärferelation der Quantentheorie, daß Felder sogar im scheinbar leeren Raum ständigen Fluktuationen unterworfen sind und eine unendliche Energiedichte besitzen. Folglich müssen wir einen unendlichen Wert abziehen, um die endliche Energiedichte zu erhalten, die wir im Universum beobachten. Diese Subtraktion kann, zumindest lokal, zu negativer Energiedichte führen. Selbst im flachen Raum könnten wir Quantenzustände finden, in denen die Energiedichte lokal negativ wird, obwohl die Gesamtenergie positiv ist. Nun können wir uns fragen, ob diese negativen Werte die Raumzeit tatsächlich veranlassen, sich in der Weise zu krümmen, daß der Bau einer endlichen Zeitmaschine möglich wird. Das ist allem Anschein nach der Fall.



(Abb. 5.11)

Wie ich in Kapitel 4 ausgeführt habe, bedeuten Quantenfluktuationen, daß sogar der scheinbar leere Raum voller virtueller Teilchenpaare ist, voller Teilchen, die zusammen erscheinen, sich auseinanderbewegen, wieder zusammenkommen und sich vernichten (Abb. 5.10). Ein Partner des virtuellen Teilchenpaars besitzt positive Energie und der andere negative Energie. Wenn ein Schwarzes Loch in der Nähe ist, kann das Teilchen mit negativer Energie hineinfallen, während das positive ins Unendliche entweicht und als Strahlung erscheint, die positive Energie aus dem Schwarzen Loch davonträgt. Die Teilchen mit negativer Energie, die hineinfallen, bewirken, daß das Schwarze Loch Masse verliert und langsam verdunstet, was seinen Ereignishorizont zum Schrumpfen bringt (Abb. 5.11).

Gewöhnliche Materie mit positiver Energiedichte hat einen anziehenden Gravitationseffekt und wölbt die Raumzeit so, daß Lichtstrahlen aufeinander zu gelenkt werden, genauso wie die große Kugel auf dem Gummituch in Kapitel 2 dafür sorgte, daß die Bahnen



(Abb. 5.10)



Mein Enkel
William Mackenzie Smith

der kleinen Kugeln immer auf die große Kugel zu gebogen wurden, niemals von ihr fort.

Daraus würde folgen, daß die Fläche des Ereignishorizontes eines Schwarzen Lochs mit der Zeit anwachsen müßte und nicht schrumpfen könnte. Der Horizont eines Schwarzen Lochs kann nur schrumpfen, wenn die Energiedichte am Horizont negativ ist und die Raumzeit so krümmt, daß die Lichtstrahlen auseinanderlaufen. Das wurde mir zum ersten Mal klar, als ich kurz nach der Geburt meiner Tochter zu Bett ging. Ich werde nicht verraten, wie lange das her ist, aber ich habe inzwischen einen Enkel.

Das »Verdunsten« von Schwarzen Löchern zeigt, daß auf der Quantenebene die Energiedichte gelegentlich negativ sein und die Raumzeit in die Richtung krümmen kann, die erforderlich wäre, um eine Zeitmaschine zu bauen. Es wäre also denkbar, daß eine sehr fortgeschrittene Zivilisation eine negative Energiedichte erzeugen könnte, die ausreichen würde, um eine Zeitmaschine für makroskopische Objekte wie Raumschiffe zu bauen. Allerdings gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen dem Horizont eines Schwarzen Lochs und dem einer Zeitmaschine. Der Horizont eines Schwarzen Lochs wird von Lichtstrahlen gebildet, die sich beliebig fortbewegen, während der Horizont einer Zeitmaschine geschlossene Lichtstrahlen enthält, die immer wieder auf den gleichen Bahnen umlaufen. Ein virtuelles Teilchen, das sich auf einer solchen geschlossenen Bahn bewegte, brächte seine Grundzustandsenergie wieder und wieder an denselben Punkt zurück. Deshalb müßte die Energiedichte am Horizont - an der Grenze der Zeitmaschine, der Region, in der man in die Vergangenheit reisen könnte - unendlich sein. Dies wird durch eingehende Berechnungen einiger Hintergründe bestätigt, die einfach genug für exakte Berechnungen sind. Eine unendliche Energiedichte am Horizont aber würde bedeuten, daß eine Person oder eine Raumsonde, die versuchte, ihn zu durchqueren, um in die Zeitmaschine zu gelangen, von einem Strahlenblitz vernichtet würde (Abb. 5.12). Die Zukunft sieht also schwarz aus für Zeitreisen - oder sollten wir lieber sagen: blendend weiß?


Die Energiedichte von Materie hängt von dem Zustand ab, in dem sie sich befindet, daher wäre eine fortgeschrittene Zivilisation vielleicht in der Lage, an der Grenze der Zeitmaschine für eine endliche Energiedichte zu sorgen, indem sie die in einer geschlossenen Schleife ständig umlaufenden virtuellen Teilchen »einfrieren« oder entfernen würde. Es ist jedoch unklar, ob eine solche Zeitmaschine stabil wäre: Die kleinste Störung, zum Beispiel ein Mensch, der den Horizont durchquerte, um in die Zeitmaschine einzutreten, könnte das Kreisen virtueller Teilchen und damit einen vernichtenden Strahlenblitz auslösen. Man sollte den Physikern Gelegenheit geben, diese Frage zu erörtern, ohne sie höhnisch auszulachen. Selbst wenn sich herausstellen sollte, daß Zeitreisen unmöglich sind, wäre es wichtig zu wissen, warum das so ist.



Um die Frage endgültig zu beantworten, müssen wir nicht nur die Quantenfluktuationen von Materiefeldern, sondern auch die der Raumzeit selbst berücksichtigen. Es ließe sich erwarten, daß daraus eine gewisse Verschwommenheit in den Bahnen von Lichtstrahlen und im gesamten Konzept der Zeitordnung erwächst. Tatsächlich könnte man die Strahlung Schwarzer Löcher so verstehen, daß Teilchen aus dem Schwarzen Loch entkommen, weil sein Horizont aufgrund von Quantenfluktuationen der Raumzeit gar nicht genau definiert ist. Nun haben wir aber keine vollständige Theorie der Quantengravitation und können deshalb über die Auswirkungen von Raumzeitfluktuationen kaum etwas sagen, sondern nur hoffen, daß uns Feynmans »Summe über alle Geschichten«, wie ich sie in Kapitel 3 dargestellt habe, einige Hinweise liefert.

Jede Geschichte ist in unserem Fall eine gekrümmte Raumzeit, die Materiefelder enthält. Da wir dabei die Summe über alle möglichen Geschichten berechnen müssen, nicht nur über diejenigen, die Einstein-Gleichungen erfüllen, muß die Summe auch Raumzeiten einschließen, deren Krümmung für Reisen in die Vergangenheit ausreicht (Abb. 5.13, S. 156). Damit stellt sich die Frage, warum dann eigentlich nicht überall Zeitreisen stattfinden. Die Antwort lautet: Sie finden überall statt, allerdings auf mikroskopischer Ebene, so daß wir sie nicht bemerken. Wenn wir Feynmans Methode der


(Abb. 5.12)
Vielleicht würde man durch einen Strahlenblitz ausgelöscht werden, wenn man den Zeitreisehorizont durchquerte.



(Abb. 5.13)
Die Feynmansche »Summe über Geschichten« muß auch Geschichten einschließen, in denen Teilchen in der Zeit zurückreisen, und sogar solche Geschichten, die geschlossene Schleifen in Zeit und Raum sind.

über Geschichten auf ein Teilchen anwenden, müssen wir auch die Geschichten berücksichtigen, in denen sich das Teilchen schneller als das Licht und sogar rückwärts in der Zeit bewegt. Vor allem gibt es Geschichten, in denen das Teilchen in einer geschlossenen Schleife der Zeit und des Raums immer und immer wieder umläuft. Es wäre wie in dem Film Und täglich grüßt das Murmeltier, in dem ein Fernsehjournalist immer erneut denselben Tag erlebt (Abb. 5.14).


Man kann Teilchen mit Schleifen-Geschichten nicht direkt mittels eines Teilchendetektors beobachten, doch ihre indirekten Effekte sind in zahlreichen Experimenten gemessen worden. Ein solcher Effekt ist eine kleine Verschiebung der Frequenz des Lichts, das von Wasserstoffatomen emittiert wird. Ursache dieser Verschiebung sind Elektronen, die sich in geschlossenen Schleifen bewegen. Ein anderer ist eine geringfügige Kraft zwischen parallelen Metallplatten, die dadurch hervorgerufen wird, daß dort im Verhältnis zur Region draußen weniger Geschichten mit geschlossenen Schleifen hineinpassen - eine andere äquivalente Interpretation des Casimir-Effekts. Damit ist die Existenz von Schleifen-Geschichten experimentell bestätigt (Abb. 5.15).




(Abb. 5.14)

Man könnte darüber streiten, ob Teilchen mit Schleifen-Geschichten etwas mit der Raumzeitkrümmung zu tun haben, weil sie auch vor einem unbewegten Hintergrund wie einer flachen Raumzeit vorkommen. Doch in den letzten Jahren haben wir festgestellt, daß physikalische Phänomene häufig duale Beschreibungen von gleicher Gültigkeit besitzen. Es ist egal, ob wir sagen, ein Teilchen bewege sich in einer geschlossenen Schleife vor einem unbewegten Hintergrund, oder aber, das Teilchen bleibe unbewegt, während Raum und Zeit in seiner Umgebung fluktuierten. Das hängt einfach davon ab, ob Sie zunächst die Summe über die Teilchenwege berechnen und dann die Summe über gekrümmte Raumzeiten oder umgekehrt.

Offenbar erlaubt die Quantentheorie also Zeitreisen auf mikroskopischer Skala. Doch die eignen sich kaum für Science-fiction-Geschichten, wo jemand beispielsweise in die Vergangenheit reist und seinen Großvater umbringt. Die Frage lautet also: Kann die Wahrscheinlichkeit in der Summe über Geschichten bei Raumzeiten mit makroskopischen Zeitschleifen Maxima aufweisen?



(Abb. 5.15)



(Abb. 5.16)
Das Einstein-Universum ist wie ein Zylinder: Es ist endlich im Raum und konstant in der Zeit. Dank seiner endlichen Größe kann es überall mit weniger als der Lichtgeschwindigkeit rotieren.


Wir können diese Frage untersuchen, indem wir die Summe über Geschichten von Materiefeldern in einer Reihe von Hintergrund-Raumzeiten betrachten, von denen jede bessere Bedingungen für die Bildung von Zeitschleifen bietet als die vorige. Man kann erwarten, daß etwas Dramatisches geschieht, wenn erstmals Zeitschleifen auftreten. Das hat sich tatsächlich an einem einfachen Beispiel gezeigt, das ich zusammen mit meinem Doktoranden Michael Cassidy untersucht habe.

Die Hintergrund-Raumzeiten, die wir untersucht haben, sind eng verwandt mit dem sogenannten Einstein-Universum, der Raumzeit, die Einstein vorgeschlagen hat, als er, wie in Kapitel 1 geschildert, noch der Meinung war, das Universum sei zeitlich unveränderlich, insbesondere weder in Expansion noch in Kontraktion begriffen. Im Einstein-Universum verläuft die Zeit von der unendlich fernen Vergangenheit in die unendlich ferne Zukunft. Doch die Raumdimensionen sind nur von endlicher Ausdehnung und in sich geschlossen, ähnlich wie die Erdoberfläche in sich geschlossen ist, allerdings mit einer zusätzlichen Raumdimension. Man kann sich diese Raumzeit als Zylinder vorstellen, dessen Längsachse der Zeitdimension und dessen Querschnitt den drei Raumdimensionen entspricht (Abb. 5.16).

Das Einstein-Universum stellt nicht das Universum dar, in dem wir leben, weil es nicht expandiert. Trotzdem kann man es für die Erörterung von Zeitreisen sehr gut als Hintergrund verwenden, weil es so einfach ist, daß sich die Summe über Geschichten explizit ausrechnen läßt. Wenden wir uns einen Moment lang von den Zeitreisen ab und betrachten statt dessen die Materie in einem Einstein-Universum, das um eine Achse rotiert. Wenn Sie sich auf der Achse befinden, bleiben Sie stets auf demselben Raumpunkt, so als stünden Sie im Mittelpunkt eines Kinderkarussells. Doch wenn Sie sich nicht auf der Achse befinden, bewegen Sie sich durch den Raum, während Sie sich um die Achse drehen. Je größer die Entfernung zur Achse ist, desto rascher bewegen Sie sich (Abb. 5.17). Wäre das Universum räumlich unendlich, dann müßten Punkte, die weit genug von der Achse entfernt wären, schneller als das Licht rotieren. Doch da das Einstein-Universum in den Raumrichtungen endlich ist, gibt es eine kritische Rotationsgeschwindigkeit, unterhalb derer kein Teil des Universums schneller als das Licht rotiert.

Betrachten wir nun die Summe über Teilchengeschichten in einem rotierenden Einstein-Universum. Bei langsamer Rotation gibt es viele verschiedene Bahnen, die ein Teilchen, dem eine gegebene Energiemenge zur Verfügung steht, einschlagen kann. Daher ergibt die Summe über alle Teilchengeschichten bei diesem Hintergrund eine große Amplitude. In der Summe über alle gekrümmten Raumzeitgeschichten ist die Wahrscheinlichkeit für diese spezielle Raumzeit recht hoch - das heißt, sie gehört zu den wahrscheinlicheren Geschichten. Doch wenn sich die Rotationsgeschwindigkeit des Einstein-Universums dem kritischen Wert an-

ROTATION IM FLACHEN RAUM



nähert, so daß seine äußeren Ränder Lichtgeschwindigkeit erreichen, gibt es nur noch eine Teilchenbahn auf diesem Rand, die klassisch zulässig ist, diejenige nämlich, die einer Bewegung mit Lichtgeschwindigkeit entspricht. Das heißt, die Summe über Teilchengeschichten ist klein. Damit ist die Wahrscheinlichkeit dieser Hintergründe gering in der Summe über alle gekrümmten Raumzeitgeschichten. Mit anderen Worten, sie sind am unwahrscheinlichsten.

Was haben rotierende Einstein-Universen mit Zeitreisen und Zeitschleifen zu tun? Die Antwort lautet, sie sind mathematisch äquivalent mit anderen Hintergründen, die Zeitschleifen erlauben. Diese anderen Hintergründe sind Universen, die sich in zwei Raumrichtungen ausdehnen. In die dritte Raumrichtung expandieren die Universen nicht, denn sie ist periodisch, das heißt, wenn Sie eine gewisse Entfernung in dieser Richtung zurücklegen, kommen Sie wieder dort an, wo Sie aufgebrochen sind. Doch die periodische Raumrichtung dieser Universen hat noch eine weitere, sehr ungewöhnliche Eigenschaft: Jedesmal, wenn Sie einen Umlauf in der dritten Raumrichtung absolvieren, erhöht sich Ihre Geschwindigkeit in der ersten oder zweiten Richtung (Abb. 5.18, S. 160).


(Abb. 5.17)
Im flachen Raum werden sich Regionen eines in starrer Rotation befindlichen Körpers fern von der Achse schneller als das Licht bewegen.

CHRONOLOGIE-SCHUTZTHESE

Die physikalischen Gesetze wirken so zusammen, daß Zeitreisen makroskopischer Objekte in die Vergangenheit verhindert werden.



HINTERGRUND MIT GESCHLOSSENEN ZEITARTIGEN KURVEN



(Abb. 5.18)

Ist die Erhöhung der Geschwindigkeit gering, so gibt es keine Zeitschleifen. Betrachten wir jedoch eine Folge von Hintergründen mit steigenden Geschwindigkeitszuwächsen. Von einer bestimmten Zuwachsrate an, die wir die kritische Zuwachsrate nennen, treten Zeitschleifen auf. Es überrascht nicht sonderlich, daß dieser kritische Geschwindigkeitszuwachs der kritischen Rotationsgeschwindigkeit der Einstein-Universen entspricht. Da Berechnungen der Summe über Geschichten für diese Hintergründe mathematisch äquivalent sind, ergibt sich der Schluß, daß die Wahrscheinlichkeit dieser Hintergründe gegen null geht, wenn sie sich der Krümmung nähern, die für die Existenz von Zeitschleifen erforderlich ist. Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, eine hinreichende Krümmung für eine Zeitmaschine zu haben, ist null. Das spricht für die Chronologieschutzvermutung, von der am Ende von Kapitel 2 die Rede war: Die Gesetze der Physik wirken so zusammen, daß Zeitreisen makroskopischer Objekte in die Vergangenheit verhindert werden.

Zwar erlaubt die Summe über Geschichten Zeitschleifen, doch ihre Wahrscheinlichkeiten sind außerordentlich gering. Ausgehend von den oben erwähnten Dualitätsargumenten halte ich die

Wahrscheinlichkeit, daß Kip Thorne in die Vergangenheit reisen und seinen Großvater umbringen kann, für kleiner als eins zu zehn mit einer Billion Billionen Billionen Billionen Nullen dahinter.

Das ist eine ziemlich geringe Wahrscheinlichkeit, aber wenn Sie sich das Bild von Kip genau ansehen, erkennen Sie an den Rändern vielleicht eine leichte Verschwommenheit. Die entspricht der geringen Wahrscheinlichkeit, daß irgendein Schuft aus der Zukunft in der Zeit zurückgereist ist und Kips Großvater umgebracht hat, so daß Kip in Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist.

Als Spieler, die wir sind, würden Kip und ich darauf natürlich gern einen Einsatz riskieren. Leider können wir diesmal nicht miteinander wetten, weil wir auf der gleichen Seite stehen. Und mit jemand anders würde ich nicht wetten. Er könnte aus der Zukunft kommen und wissen, daß es Zeitreisen gibt.

Womöglich fragen Sie sich, ob dieses Kapitel nicht zum großen staatlichen Vertuschungsmanöver in Sachen Zeitreisen gehört. Vielleicht haben Sie recht.

Die Wahrscheinlichkeit, daß Kip in die Vergangenheit reisen und seinen Großvater umbringen könnte, ist $10^{-10^{60}}$. In Worten: geringer als eine 1, geteilt durch eine 10 mit einer Billion Billionen Billionen Billionen Billionen Nullen dahinter.



KAPITEL 6


UNSERE ZUKUNFT: STAR TREK ODER NICHT

*Wie sich biologisches und elektronisches Leben
in immer schnellerem Tempo zu wachsender Komplexität entfaltet*



(Abb. 6.1)

BEVÖLKERUNGSWACHSTUM




Newton, Einstein, Commander Data und ich bei einem Pokerspiel in einer Szene aus Star Trek.


Star Trek verdankt seine Beliebtheit dem Umstand, daß es eine so sichere und tröstliche Zukunftsvision liefert. Ich bin selbst ein wenig ein Star-Trek-Fan, daher war ich leicht zu überreden, an einer Episode teilzunehmen, in der ich mit Newton, Einstein und Commander Data pokerte. Ich habe ihnen allen das Geld aus der Tasche gezogen, doch leider kam Alarmstufe Rot, so daß ich meinen Gewinn nicht einstreichen konnte.

Star Trek zeigt eine Gesellschaft, die hinsichtlich Wissenschaft, Technik und sozialer Organisation der unseren weit voraus ist. (Letzteres ist sicher nicht besonders schwer.) In der Zeit zwischen dem Hier und Jetzt und jener fernen Zukunft müssen große Umwälzungen stattgefunden haben, begleitet von entsprechenden Spannungen und Unruhen. Doch zu der Zeit, da Star Trek spielt, wird ein Zustand von Wissenschaft, Technik und gesellschaftlicher Organisation vorausgesetzt, der nahezu vollkommen ist.

Ich möchte dieses Bild in Frage stellen, weil ich meine Zweifel habe, ob wir jemals einen endgültigen Steady State - einen stationären Zustand - in unserer wissenschaftlichen und technischen Entwicklung erreichen werden. In keiner Phase während der rund zehntausend Jahre seit der letzten Eiszeit hat sich die Menschheit in einem Zustand konstanten Wissens und unveränderter Technik befunden. Es hat einige Rückschritte gegeben, etwa das Mittelalter nach dem Niedergang des Römischen Reiches, doch die Weltbevölkerung, die einen Maßstab abgibt für unsere technische Fähigkeit, uns am Leben zu erhalten und zu ernähren, zeigt eine stetig ansteigende Kurve, der nur der Schwarze Tod ein paar Dellen zufügen konnte (Abb. 6.1).



Weltweiter Stromverbrauch



Weltweite Veröffentlichung wissenschaftlicher Artikel

(Abb. 6.2)


Links: Der weltweite Energiegesamtverbrauch in Milliarden Tonnen SKE (Steinkohleneinheit), wobei 1 Tonne SKE = 8,13 MW/h ist.

Rechts: Die Zahl der jährlich veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel. 1900: 9000 Artikel, 1950: 90 000 Artikel, 2000: 900 000 Artikel.

In den letzten zweihundert Jahren ist das Bevölkerungswachstum exponentiell geworden, das heißt, Jahr für Jahr nimmt die Weltbevölkerung um den gleichen Prozentsatz zu. Gegenwärtig liegt die jährliche Wachstumsrate bei 1,9 Prozent. Das klingt vielleicht nicht sehr dramatisch, bedeutet aber, daß sich die Weltbevölkerung alle vierzig Jahre verdoppelt.

Weitere Maßstäbe für die technische Entwicklung in jüngerer Zeit sind der Stromverbrauch und die Zahl der wissenschaftlichen Fachartikel (Abb. 6.2). Auch sie zeigen ein exponentielles Wachstum mit einer Verdopplung in weniger als vierzig Jahren. Nichts deutet darauf hin, daß die wissenschaftliche und technische Entwicklung sich in naher Zukunft verlangsamen und zum Stillstand kommen wird - gewiß nicht zur Zeit von *Star Trek*, das in einer nicht gar so fernen Zukunft spielen soll. Allerdings kann sich das gegenwärtige exponentielle Wachstum im nächsten Jahrtausend nicht ungebremst fortsetzen, würde doch sonst, wie das Bild auf Seite 167 zeigt, die Weltbevölkerung im Jahr 2600 Schulter an Schulter stehen und der Stromverbrauch die Erde zum Glühen bringen.

Würde man ständig alle Bücher, die neu veröffentlicht werden, hintereinanderlegen, müßten Sie neben der so entstehenden Schlange mit fast hundertfünfzig Stundenkilometern herfahren, um mit ihrem Ende Schritt zu halten. Natürlich würden im Jahre 2600 neue künstlerische und



Im Jahr 2600 würde die Weltbevölkerung Schulter an Schulter stehen und der Stromverbrauch die Erde zum Glühen bringen.

wissenschaftliche Arbeiten in elektronischer Form erscheinen und nicht mehr auf Papier. Dennoch, setzte sich das exponentielle Wachstum unvermindert fort, würden auf meinem Teilgebiet der theoretischen Physik zehn Artikel pro Sekunde erscheinen, und niemand hätte mehr die Zeit, sie alle zu lesen.

Offensichtlich also kann es mit dem gegenwärtigen exponentiellen Wachstum nicht unendlich weitergehen. Aber was wird geschehen? Eine Möglichkeit wäre, daß wir uns durch irgendeine Katastrophe, etwa einen Atomkrieg, vollkommen auslöschen. Es gibt einen traurigen Witz, dem zufolge Außerirdische bisher nur deshalb keinen Kontakt mit uns aufgenommen haben, weil Zivilisationen, die unser Entwicklungsstadium erreicht haben, instabil werden und sich selbst zerstören. Doch ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Ich glaube nicht daran, daß die Menschheit es so weit gebracht haben soll, nur um sich dann ausgerechnet in einem Moment auszulöschen, wo es richtig interessant wird.

Die *Star-Trek*-Vision der Zukunft - daß wir ein fortgeschrittenes, aber im wesentlichen statisches Entwicklungsniveau erreichen - könnte sich allerdings in Hinblick auf unser Wissen über die Gesetze bewahrheiten, die das Universum bestimmen. Wie ich im nächsten



(Abb. 6.31)
Das Handlungsgerüst von Star Trek beruht darauf, daß die Enterprise in der Lage ist, sich mit Warp-Antrieb sehr viel rascher als das Licht fortzubewegen. Doch wenn die Chronologieschutzthese richtig ist, müssen wir die Milchstraße mit raketenbetriebenen Raumschiffen erforschen, die langsamer als das Licht vorankommen.

Kapitel ausführen werde, gibt es möglicherweise eine endgültige Theorie, die wir in nicht allzu ferner Zukunft entdecken könnten. Von dieser endgültigen Theorie wird es abhängen, ob sich der *Star-Trek*-Traum vom Warp-Antrieb verwirklichen läßt. Nach heutigem Wissensstand müssen wir die Milchstraße mit hohem Zeitaufwand und mühsam erkunden, indem wir Raumschiffe verwenden, die langsamer als das Licht vorankommen, aber da wir noch keine vollständige vereinheitlichte Theorie haben, können wir den Warp-Antrieb auch nicht vollständig ausschließen (Abb. 6.3).

Andererseits kennen wir bereits die physikalischen Gesetze, die für so gut wie alle Situationen gelten, ausgenommen die allerextremsten: die Gesetze, denen die Mannschaft der *Enterprise* - wenn auch nicht das Raumschiff selbst - unterworfen ist. Und trotzdem hat es nicht den

Anschein, als würden wir in dem Gebrauch, den wir von diesen Gesetzen machen, oder in der Komplexität der Systeme, die wir mit ihnen erzeugen können, jemals einen stationären Zustand erreichen. Mit dieser Komplexität werde ich mich auf den restlichen Seiten dieses Kapitels befassen.

Das bei weitem komplexeste System, das wir kennen, ist unser Körper. Das Leben scheint in den Urmeeren entstanden zu sein, die die Erde vor vier Milliarden Jahren bedeckten. Wie das geschehen ist, wissen wir nicht. Vielleicht haben sich einfach durch Zufallskollisionen zwischen Atomen Makromoleküle gebildet, die sich selbst reproduzieren konnten und sich zu komplizierteren Strukturen zusammengesetzt haben. Was wir wissen, ist, daß sich vor dreieinhalb Milliarden Jahren das äußerst komplexe DNS-Molekül gebildet hat.



Die DNS ist die Grundlage für alles Leben auf der Erde. Ihre Struktur ist eine Doppelhelix, die aussieht wie eine Wendeltreppe und 1953 von Francis Crick und James Watson im Cavendish-Laboratorium der Universität Cambridge entdeckt wurde. Die beiden Stränge der Doppelhelix sind durch Basenpaare verbunden, die den Stufen einer Wendeltreppe ähneln. Vier Basen sind an ihrem Aufbau beteiligt: Cytosin, Guanin, Thymin und Adenin. Die Reihenfolge, in der die verschiedenen Basen im Verlauf der Wendeltreppe auftreten, trägt die genetische Information, die es dem DNS-Molekül ermöglicht, einen Organismus aufzubauen und sich zu reproduzieren. Wenn die DNS Kopien ihrer selbst anfertigt, treten gelegentlich Fehler in der Reihenfolge der Basenpaare entlang der Wendeltreppe auf. In den meisten Fällen ist die solchermaßen veränderte DNS nicht oder nur in verringertem Maße fähig, sich zu reproduzieren, was zur Folge hat, daß derartige genetische Fehler oder Mutationen, wie sie heißen, aussterben. Doch in einigen wenigen Fällen erhöht die Mutation die Aussichten der DNS, zu überleben und sich zu reproduzieren. Solche Veränderungen im genetischen Code werden begünstigt. Auf diese Weise entwickelt sich der Informationsgehalt in der Sequenz der Basenpaare allmählich zu immer größerer Komplexität (Abb. 6.4, S. 170).

Da die biologische Evolution im Prinzip eine Zufallswanderung durch den Raum aller genetischen Möglichkeiten ist, vollzieht sie sich sehr langsam. Die Komplexität oder die Zahl der Informationsbits, die in der DNS kodiert sind, entspricht ungefähr der Zahl der Basenpaare im Molekül. In den ersten rund zwei Milliarden Jahren dürfte die Zuwachsrate der Komplexität etwa ein Informationsbit pro hundert Jahren betragen haben. Die Zuwachsrate der DNS-Komplexität stieg allmählich auf rund ein Bit pro Jahr an, ein Standard, der während der letzten Jahrmillionen galt. Doch dann, vor etwa sechs- bis achttausend Jahren, vollzog sich ein neuer, wichtiger





(Abb. 6.4)
FORTSCHREITENDE EVOLUTION
 Rechts sehen Sie computergenerierte Biomorphe, die sich in einem Programm des Biologen Richard Dawkins entwickelt haben. Das Überleben bestimmter Stammlinien hing von einfachen Merkmalen ab - etwa »interessant«, »anders« oder »insektenartig«..
 Von einem einzigen Bildpunkt ausgehend, entwickelten sich die frühen Zufallsgenerationen in einem Prozeß, der der natürlichen Selektion ähnelte. Dawkins züchtete eine insektenartige Form bereits im Laufe der bemerkenswert kleinen Zahl von 29 Generationen (mit einer Reihe evolutionärer Sackgasen).



Die Entwicklung von Komplexität seit der Entstehung der Erde (nicht maßstabsgerecht).

Schritt: Die Schriftsprache entwickelte sich. Von nun an konnten Informationen von einer Generation an die nächste weitergegeben werden, ohne daß man warten mußte, bis der überaus langsame Prozeß von Zufallsmutationen und natürlicher Selektion sie in die DNS-Sequenz kodierte. Das Maß an Komplexität stieg enorm an. Ein einziger Schmachtschinken könnte die Informationen enthalten, die den DNS-Unterschied zwischen Affen und Menschen ausmachen, und eine dreißigbändige Enzyklopädie könnte die gesamte DNS-Sequenz des Menschen wiedergeben (Abb. 6.5).

Noch wichtiger ist, daß sich die Informationen in Büchern rasch aktualisieren lassen. Die Rate, mit der die menschliche DNS gegenwärtig von der biologischen Evolution aktualisiert wird, beträgt ungefähr ein Bit pro Jahr. Hingegen werden jedes Jahr zweihunderttausend neue Bücher publiziert, das heißt, es entstehen pro Sekunde über eine Millionen Bit neuer Information. Natürlich ist der größte Teil dieser Information Müll, doch selbst wenn im Schnitt nur jedes millionste Bit von Nutzen ist, vollzieht sich dieser Prozeß immer noch hunderttausendmal so schnell wie die biologische Evolution.



(Abb. 6.5)



Die Züchtung von Embryonen außerhalb des menschlichen Körpers wird größere Gehirne und damit höhere Intelligenzleistungen ermöglichen.

Diese Datenübertragung durch externe, nichtbiologische Mittel hat dazu geführt, daß die Menschheit die Welt beherrscht und die menschliche Bevölkerung exponentiell anwächst. Doch jetzt stehen wir an der Schwelle eines neuen Zeitalters, in dem wir in der Lage sein werden, die Komplexität unserer inneren Datenbank, der DNS, zu erhöhen, ohne abwarten zu müssen, daß der langsame Prozeß der biologischen Evolution dafür sorgt. In den letzten zehntausend Jahren hat es keine bedeutende Veränderung in der menschlichen DNS gegeben, doch in den nächsten tausend werden wir sie wahrscheinlich vollkommen umgestalten können. Natürlich werden viele Menschen verlangen, daß man gentechnische Eingriffe am Menschen verbietet, aber es ist zweifelhaft, ob wir es werden verhindern können. Gentechnische Veränderung von Pflanzen und Tieren wird man aus wirtschaftlichen Gründen gestatten, und mit Sicherheit wird irgend jemand diese Methoden am Menschen erproben. Wenn wir keine totalitäre Weltordnung bekommen, wird irgend jemand irgendwo Menschen gentechnisch »veredeln«.

Natürlich wird die Veredelung einiger Menschen zu großen sozialen und politischen Problemen hinsichtlich der nichtveredelten Menschen führen. Ich habe nicht die Absicht, die gentechnische Veränderung des Menschen als eine erstrebenswerte Entwicklung zu preisen, sondern möchte nur feststellen, daß sie stattfinden wird, ob wir es wollen oder nicht. Deshalb überzeugen mich Science-fiction-Visionen wie *Star Trek* nicht, in denen die Menschen in einer vierhundert Jahre entfernten Zukunft praktisch unverändert sind. Ich denke, die Menschheit und ihre DNS werden sehr rasch sehr viel komplexer werden. Wir sollten uns klarmachen, daß die Wahrscheinlichkeit für eine solche Entwicklung spricht, und uns überlegen, wie wir mit ihr umgehen wollen.

In gewisser Hinsicht muß die Menschheit ihre geistigen und körperlichen Eigenschaften sogar verbessern, wenn sie mit der immer komplexer werdenden Welt fertig werden und neuen Herausforderungen wie der Raumfahrt gewachsen sein will. Auch das Bestreben, die Überlegenheit biologischer Systeme gegenüber den elektronischen zu bewahren, erfordert eine Steigerung der menschlichen Komplexität. Im Augenblick liegt der einzige Vorteil der Computer in ihrer Geschwindigkeit, aber sie lassen noch keinerlei Anzeichen von Intelligenz erkennen. Das ist keine Überraschung, denn unsere heutigen Rechner sind weniger komplex als das Gehirn eines Regenwurms, einer Spezies, die nicht gerade für ihre Geistesblitze bekannt ist.


Doch Computer gehorchen dem Mooreschen Gesetz: Ihre Geschwindigkeit und Komplexität verdoppeln sich alle achtzehn Mona-



Gegenwärtig wird die Rechenleistung unserer Computer von dem Gehirn eines schlichten Regenwurms übertroffen.



(Abb. 6.6)



Das exponentielle Wachstum der Rechenleistung von Produkten eines CPU-Herstellers, von 1972 bis zu einer vorsichtigen Schätzung für das Jahr 2007. Die Zahl hinter der Bezeichnung des Chips gibt die Rechenoperationen pro Sekunde an.



Neuronale Implantate werden für verbesserte Gedächtnisleistungen und die Speicherung kompletter Informationspakete sorgen, etwa das perfekte Erlernen einer Sprache oder des Inhalts dieses Buches in Minutenschnelle. Dergestalt veränderte Menschen werden kaum noch Ähnlichkeit mit uns haben.

te (Abb. 6.6, S. 174). Auch das ist eine dieser exponentiellen Wachstumsraten, die ganz offensichtlich nicht endlos andauern können. Wahrscheinlich aber wird sie sich fortsetzen, bis Computer eine ähnliche Komplexität wie das menschliche Gehirn besitzen. Einige Menschen behaupten, Computer würden niemals in der Lage sein, echte Intelligenz zu entwickeln, was auch immer das sein mag. Doch wenn komplizierte chemische Moleküle im Menschen so zusammenwirken können, daß sie diesen mit Intelligenz ausstatten, dann sehe ich nicht ein, was ebenso komplizierte elektronische Schaltkreise daran hindern sollte, Computer zu intelligentem Verhalten zu befähigen. Und sobald die Computer einmal intelligent sind, können sie wahrscheinlich Computer von noch größerer Komplexität und Intelligenz konstruieren.

Gibt es für diese Zunahme an biologischer und elektronischer Komplexität eine natürliche Grenze? Im biologischen Bereich war die Grenze der menschlichen Intelligenz bisher durch die Größe des Gehirns vorgegeben, das noch durch den Geburtskanal passen muß. Nachdem ich der Geburt meiner drei Kinder beigewohnt habe, weiß ich, wie schwer es ist, den Kopf herauszubekommen. Aber ich schätze, daß es uns im Laufe der nächsten hundert Jahre gelingen wird, Föten außerhalb des menschlichen Körpers wachsen zu lassen, so daß diese Einschränkung entfallen wird. Letztlich werden die Versuche, das menschliche Gehirn gentechnisch zu vergrößern, auf das Problem stoßen, daß die chemischen Botenstoffe des Körpers,



EINE KURZE GESCHICHTE DES UNIVERSUMS

EREIGNISSE (nicht maßstabsgerecht)

0,00003 Milliarden Jahre.
Der Urknall und ein inflationäres Universum, das feurig und lichtundurchlässig ist.

Entkopplung von Materie und Energie. Das Universum wird transparent

1 Milliarde Jahre.
Materiehaufen bilden Protogalaxien, die schwere Kerne synthetisieren.


3 Milliarden Jahre.
Galaxien, die vom Hubble-Weltraumteleskop bei seiner »Deep Field Exploration« aufgenommen wurden.

Es bilden sich neue Galaxien wie unsere eigene mit schwereren Kernen.

Entstehung unseres Sonnensystems mit Planeten und ihren Umlaufbahnen.

Vor 3,5 Milliarden Jahren erscheinen die ersten Lebensformen.

0,0005 Milliarden Jahre vor unserer Zeit: Auftreten der ersten Menschen.



(Abb. 6.71) Menschen gibt es erst seit einem winzigen Bruchteil der Geschichte des Universums. (Wäre dieses Schaubild maßstabsgerecht und gäbe man die Dauer menschlicher Existenz durch einen Balken von sieben Zentimeter Länge wieder, wäre die gesamte Geschichte des Universums mehr als einen Kilometer lang.) Jedes außerirdische Leben, dem wir begegnen würden, wäre wahrscheinlich weit primitiver oder weit fortgeschrittener als wir.

die für unsere geistige Aktivität sorgen, relativ langsam sind. Das heißt, alle weiteren Komplexitätszuwächse des Gehirns würden auf Kosten der Geschwindigkeit gehen. Wir können schlagfertig oder sehr intelligent sein, aber nicht beides. Trotzdem denke ich, daß wir erheblich intelligenter werden können als die meisten Figuren in *Star Trek* - was ja auch nicht weiter schwierig ist.

Auch bei elektronischen Schaltkreisen werden wir uns zwischen Komplexität und Geschwindigkeit entscheiden müssen. In diesem Falle sind die Signale jedoch elektrisch, das heißt, sie breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus, die natürlich viel höher ist als die Geschwindigkeit der chemischen Übertragung von Information. Trotzdem erweist sich die Lichtgeschwindigkeit bereits heute als praktische Hürde für die Entwicklung schnellerer Computer. Noch kann man Abhilfe schaffen, indem man die Schaltkreise verkleinert, doch schließlich wird die atomare Struktur der Materie eine letzte Grenze setzen. Allerdings wird es noch eine Zeitlang dauern, bis wir an diese Barriere gelangen.

Eine andere Möglichkeit, die Komplexität elektronischer Schaltkreise bei gleichbleibender Geschwindigkeit zu erhöhen, ist die Nachahmung des menschlichen Gehirns. Das Gehirn hat nicht nur eine Zentraleinheit (CPU), die alle Befehle nacheinander verarbeitet. Vielmehr verfügt es über Millionen Prozessoren, die gleichzeitig zusammenarbeiten. Solche Systeme mit massiven parallelen Rechenoperationen werden auch die Zukunft der elektronischen Intelligenz bestimmen.

Unter der Voraussetzung, daß wir uns in den nächsten hundert Jahren nicht selbst zerstören, werden wir zunächst zu den Planeten des Sonnensystems aufbrechen und dann zu den benachbarten Sternen. Aber es wird nicht sein wie in *Star Trek* oder *Babylon 5*, mit einer neuen Spezies von Fastmenschen in nahezu jedem Sternensystem. In ihrer gegenwärtigen Form gibt es die Menschheit erst seit zwei Millionen Jahren, während seit dem Urknall rund fünfzehn Milliarden Jahre vergangen sind (Abb. 6.7).



DIE BIOLOGISCH-ELEKTRONISCHE SCHNITTSTELLE

Schon in zwanzig Jahren könnte ein Tausend-Dollar-Computer so komplex wie das menschliche Gehirn sein. Vielleicht werden Parallelprozessoren die Funktionen unseres Gehirns nachahmen und dafür sorgen, daß sich Computer intelligent und bewußt verhalten.


Neuronale Implantate könnten weitaus schnellere Schnittstellen zwischen Gehirn und Computern schaffen und auf diese Weise den Abstand zwischen biologischer und elektronischer Intelligenz aufheben.

Bereits in naher Zukunft werden die meisten geschäftlichen Transaktionen wahrscheinlich zwischen Cyberpersönlichkeiten über das Internet abgewickelt werden.

Schon in zehn Jahren werden sich viele von uns für eine virtuelle Existenz im Netz sowie für Cyberfreundschaften und Cyberbeziehungen entscheiden.

Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms wird zweifellos große medizinische Fortschritte mit sich bringen, uns aber auch in die Lage versetzen, die Komplexität der menschlichen DNS-Struktur im Laufe der nächsten Jahrhunderte erheblich zu steigern. Die Gentechnik könnte die menschliche Evolution ersetzen, indem sie den Bauplan des Menschen verändert, was völlig neue ethische Fragen aufwerfen wird.

Raumfahrten über unser Sonnensystem hinaus werden vermutlich gar mit gentechnisch veränderten Menschen oder mit unbemannten, computergesteuerten Raumsonden möglich sein.



Hat Intelligenz eine langfristige Überlebenschance?

Selbst wenn sich also Leben in anderen Sternensystemen entwickelt haben sollte, ist die Wahrscheinlichkeit, daß wir es in einem menschenähnlichen Stadium antreffen, sehr gering. Die außerirdischen Lebensformen, auf die wir stoßen könnten, werden entweder sehr viel primitiver oder sehr viel fortgeschrittener sein. Sind die Außerirdischen fortgeschrittener, stellt sich die Frage, warum sie sich nicht über die Milchstraße verbreitet und die Erde besucht haben. Wären Außerirdische hier gewesen, hätten wir es bemerkt: Der Besuch hätte mehr Ähnlichkeit mit den Film *Independence Day* gehabt als mit *E.T.*


Wie also ist dieses Ausbleiben außerirdischer Besucher zu erklären? Es wäre denkbar, daß es im Weltall eine weit fortgeschrittene Lebensform gibt, die von unserer Existenz weiß, aber es vorzieht, uns in unseren primitiven Säften schmoren zu lassen. Allerdings ist es zweifelhaft, ob sie so viel Rücksicht gegenüber einer niederen Lebensform walten ließen: Kümmern sich die Menschen in der Regel darum, wie viele Insekten und Regenwürmer sie unter ihren Füßen zerquetschen? Eine vernünftiger Erklärung lautet, daß entweder die Entwicklung von Leben auf anderen Planeten oder die Entwicklung von Intelligenz in diesen Lebewesen eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit besitzt. Da wir uns für intelligent halten - worüber sich streiten läßt -, neigen wir dazu, Intelligenz als eine unvermeidliche Konsequenz der Evolution anzusehen, eine Auffassung, die in Frage gestellt werden kann. Es steht keineswegs fest, daß Intelligenz einen großen Überlebenswert hat. Bakterien kommen sehr gut ohne Intelligenz zurecht und würden selbst dann überleben, wenn uns unsere sogenannte Intelligenz eines Tages dazu veranlassen sollte, uns in einem Atomkrieg auszulöschen. Wenn wir die Milchstraße erkunden, werden wir also vielleicht auf primitive Lebensformen stoßen, aber wahrscheinlich nicht auf Wesen wie uns.


Die Zukunft der Wissenschaft wird wenig Ähnlichkeit mit dem tröstlichen Bild haben, das *Star Trek* zeichnet: ein Universum, das von vielen humanoiden Rassen bevölkert wird, mit einer fortgeschrittenen, aber im wesentlichen statischen Wissenschaft und Technik. Ich denke vielmehr, daß wir auf uns allein gestellt sein und über eine rasch anwachsende biologische und elektronische Komplexität verfügen werden. Davon wird in den nächsten hundert Jahren noch nicht viel zu spüren sein - das ist der Zeitraum, über den sich in dieser Hinsicht halbwegs zuverlässige Vorhersagen machen lassen. Doch am Ende des nächsten Jahrtausends, wenn die Menschheit es denn erleben sollte, wird sich die reale Welt von *Star Trek* grundlegend unterscheiden.

KAPITEL 7

SCHÖNE NEUE BRANWELT

*Leben wir auf einer Bran,
oder sind wir einfach Hologramme?*






(Abb. 7.1)
 Die M-Theorie ist wie ein Puzzle. Die Teile am Rand sind verhältnismäßig leicht zu erkennen und zusammenzufügen, aber wir wissen nicht recht, was in der Mitte geschieht, wo wir nicht näherungsweise annehmen können, der eine oder andere Parameter des Modells sei klein.

Wie wird unsere Entdeckungsreise in Zukunft verlaufen? Werden wir Erfolg haben mit der Suche nach der Weltformel, nach einer vollständigen, vereinheitlichten Theorie, die die Grundlagen des Universums und all dessen, was in ihm enthalten ist, vollständig erklärt? Wie in Kapitel 2 erläutert, haben wir mit der M-Theorie möglicherweise schon die Theorie für Alles gefunden. Diese Theorie hat, zumindest soweit wir wissen, nicht nur eine einzige Formulierung. Vielmehr haben wir ein ganzes Netz auf den ersten Blick verschiedener Theorien entdeckt, die alle Näherungen der gleichen fundamentalen Theorie zu sein scheinen, jede nützlich für Berechnungen in unterschiedlichen Situationen, so wie Newtons Gravitationsgesetz eine Näherung der allgemeinen Relativitätstheorie Einsteins ist, brauchbar in Situationen mit schwachen Gravitationsfeldern. Die M-Theorie ist wie ein Puzzle: Am leichtesten lassen sich die Teile an den Rändern erkennen und zusammenfügen, also diejenigen Bereiche der M-Theorie, in denen bestimmte Parameter der Theorie klein sind. Wir haben jetzt eine ziemlich genaue Vorstellung von diesen Rändern, doch in der Mitte des M-Theorie-Puzzles klafft noch ein großes Loch. Wir wissen nicht, was dort vor sich geht (Abb. 7. 1). Solange wir dieses Loch nicht gefüllt haben, dürfen wir wahrlich nicht behaupten, wir hätten die Weltformel entdeckt.

Was befindet sich im Zentrum der M-Theorie? Werden wir Drachen (oder ähnlich exotische Geschöpfe) entdecken, wie sie auf den weißen Flecken alter Karten abgebildet sind? In der Vergangenheit sind wir immer wieder auf unerwartete neue Phänomene gestoßen, sobald wir den Bereich unserer Beobachtungen auf kleinere Skalen ausgedehnt haben. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben wir die Vorgänge in der Natur auf den Größenskalen der klassischen Physik verstanden, die von interstellaren Entfernungen bis zu rund einem hundertstel Millimeter reichen. Die klassische Physik ging von der Annahme aus, die Materie sei ein kontinuierliches Medium mit Eigenschaften wie Elastizität und Viskosität, doch dann häuften sich die Indizien, die darauf hindeuteten, daß Materie nicht homogen, sondern körnig ist, daß sie aus winzigen diskreten Bausteinen, den





(Abb. 7.2)
Rechts: Das klassische unteilbare Atom.
Ganz rechts: Ein Atom mit Elektronen, die einen Kern aus Protonen und Neutronen umkreisen.




(Abb. 7.3)
Oben: Ein Proton besteht aus zwei up-Quarks, jedes mit einer elektrischen Ladung von plus zwei Drittel, und einem down-Quark mit einer Ladung von minus ein Drittel. Unten: Ein Neutron besteht aus zwei down-Quarks, jedes mit einer Ladung von minus ein Drittel, und einem u p-Quark, das eine Ladung von plus zwei Drittel besitzt.


Atomen, besteht. Das Wort »Atom« kommt aus dem Griechischen und bedeutet »unteilbar«, aber es stellte sich rasch heraus, daß auch die Atome nicht unteilbar sind, sondern aus Elektronen bestehen, die einen Kern aus Protonen und Neutronen umkreisen (Abb. 7.2). Die atomphysikalische Forschung in den ersten dreißig Jahren des 20. Jahrhunderts erweiterte unser Verständnis bis hin zu Größenskalen von weniger als einem millionstel Millimeter. Dann entdeckten wir, daß Protonen und Neutronen aus noch kleineren Teilchen bestehen, den Quarks (Abb. 7.3).

Die jüngste Forschung in der Kern- und Hochenergiephysik hat uns zu Längenskalen vorstoßen lassen, die noch einmal um einen Faktor von einer Milliarde kleiner sind. Es mag vielleicht so aussehen, als könnten wir den Weg ins Innere der Natur endlos fortsetzen und Strukturen auf immer kleineren und kleineren Skalen entdecken. Doch diese Reihe hat genauso ein Ende wie die Reihe der russischen Matryoschkas, die in immer kleineren Matryoschkas enthalten sind (Abb. 7.4).

Irgendwann gelangen wir zu der kleinsten Puppe, die sich nicht mehr öffnen läßt. In der Physik heißt die kleinste Puppe Planck-Länge. Um zu noch kürzeren Abständen vorzudringen, müßte man einem Sondenteilchen so viel Energie zuführen, daß sich darum herum der Ereignishorizont eines winzigen Schwarzen Lochs ausbilden würde. Der Horizont wiederum entzöge die kleineren Abstände, die wir untersuchen wollten, unseren Blicken. Die fundamentale Planck-Länge in der M-Theorie kennen wir nicht genau, doch möglicherweise ist sie nicht größer als ein Millimeter geteilt durch hunderttausend Milliarden Milliarden Milliar-



(Abb. 7.4) Jede Puppe steht für ein theoretisches Naturverständnis bis hinab zu einer bestimmten Längenskala. Jede enthält eine kleinere Puppe, das heißt, eine Theorie, die die Natur auf noch kleineren Skalen beschreibt. Aber es gibt eine kleinste fundamentale Länge in der Physik, die Planck-Länge, eine Skala, auf der die Natur möglicherweise durch die M-Theorie beschrieben wird.



(Abb. 7.5)
 Ein Beschleuniger, der erforderlich ist, um Aufschluß über so kleine Abstände wie die Planck-Länge zu geben, wäre größer als der Durchmesser des Sonnensystems.


den. Es ist nicht geplant, Teilchenbeschleuniger zu bauen, die so kleine Abstände erfassen könnten. Solche Beschleuniger müßten größer als das Sonnensystem sein und hätten im gegenwärtigen finanziellen Klima ziemlich schlechte Aussichten, bewilligt zu werden (Abb. 7.5).

Allerdings gibt es eine hochinteressante neue Entwicklung, die es möglich erscheinen läßt, daß wir zumindest einige Drachen der M-Theorie leichter (und kostengünstiger) entdecken könnten. Wie ich in den Kapiteln 2 und 3 ausgeführt habe, besitzt die Raumzeit im M-theoretischen Netz mathematischer Modelle zehn oder elf Dimensionen. Bis in jüngste Zeit dachte man, die sechs oder sieben zusätzlichen Dimensionen seien alle sehr eng zusammengerollt. Das Erscheinungsbild solcher Dimensionen wäre dem eines menschlichen Haars analog (Abb. 7.6): Wenn Sie ein Haar unter einem Vergrößerungsglas betrachten, können Sie erkennen, daß es auch eine gewisse Dicke besitzt, doch mit bloßem Auge sehen Sie nur seine Länge und keine weitere Dimension. Ähnlich könnte es sich mit der Raumzeit verhalten: Auf menschlicher, atom- oder sogar kernphysikalischer Größenskala könnte sie vierdimensional und fast flach erscheinen. Würden wir jedoch unter Verwendung außerordentlich energiereicher Teilchen sehr kurze Abstände unter-



Sondenteilchen, die über eine hinreichend hohe Energie verfügen, könnten den Nachweis erbringen, daß die Raumzeit mehr als vier Dimensionen besitzt.

(Abb. 7.6)
 Für das bloße Auge sieht ein Haar wie eine Linie aus. Es scheint nur eine Dimension zu haben: die Länge. Entsprechend könnte sich die Raumzeit, die uns vierdimensional erscheint, als zehn- oder elfdimensional erweisen, wenn sie mit sehr energiereichen Teilchen erforscht wird.




(Abb. 7.7)
BRANWELTEN
Die elektrischen Kräfte wären auf die Bran beschränkt und nähmen in dem Maße ab, das erforderlich wäre, um Elektronen mit stabilen Orbits um Atomkerne auszustatten.

suchen, müßte deutlich werden, daß die Raumzeit zehn- oder elfdimensional ist.

Wären alle zusätzlichen Dimensionen sehr klein, dann wäre es äußerst schwierig, sie auf diese Art nachzuweisen. Doch kürzlich wurde die Vermutung geäußert, eine der Zusatzdimensionen könnte vergleichsweise groß oder sogar unendlich ausgedehnt sein. Diese Idee hat (zumindest für einen Positivisten wie mich) den großen Vorteil, daß sie sich von der nächsten Generation der Teilchenbeschleuniger oder durch hochempfindliche kurzreichweitige Messungen der Gravitationskraft erfassen läßt. Derartige Beobachtungen könnten entweder zu dem Beweis führen, daß die These falsch ist, oder das Vorhandensein anderer Dimensionen experimentell bestätigen.

Große Zusatzdimensionen sind eine faszinierende neue Entwicklung bei unserer Suche nach dem endgültigen Modell oder der endgültigen Theorie. Sie würden darauf schließen lassen, daß wir auf einer vierdimensionalen Oberfläche oder Bran in einer höherdimensionalen Raumzeit leben.




(Abb. 7.8)
Die Gravitation würde nicht nur entlang der Bran wirken, sondern sich auch in die zusätzlichen Dimensionen ausbreiten und daher mit wachsender Entfernung rascher abnehmen als in vier Dimensionen.

Materie und nichtgravitative Kräfte wie die elektrische Kraft wären auf die Bran beschränkt. Daher würde sich alles, was nicht mit Gravitation zu tun hätte, verhalten, als befände es sich in einer vierdimensionalen Welt. Insbesondere die elektrische Kraft zwischen dem Kern und den Elektronen, die ihn umkreisen, nähme mit wachsender Entfernung in genau dem Maße ab, wie es erforderlich ist, damit die Elektronen nicht in den Kern fielen und die Atome stabil blieben (Abb. 7.7).

Das würde sich mit dem in Kapitel 3 beschriebenen anthropischen Prinzip decken, dem zufolge das Universum für intelligentes Leben geeignet sein muß. Wären die Atome nicht stabil, gäbe es uns nicht, die wir das Universum beobachten und fragen, warum es in vierdimensionaler Gestalt erscheint.

Auf der anderen Seite durchdränge die Gravitation als Auswirkung der Raumzeitkrümmung das gesamte Gebiet der höherdimensionalen Raumzeit, was bedeuten würde, daß die Gravitation sich anders verhielte als andere Kräfte, die wir kennen. Da sie sich auch in den Zusatzdimensionen ausbreiten würde, nähme die Gravita-




*Abb. 7.9)
Eine raschere Abnahme der Gravitationskraft bei größeren Abständen würde bedeuten, daß Planetenbahnen instabil wären. Die Planeten stürzten entweder in die Sonne (a) oder entfernten sich ganz aus ihrer Anziehung (b).*

tationskraft, die von einer Masse ausgeht, mit der Entfernung schneller ab als erwartet (Abb. 7.8, S. 189).

Wenn diese raschere Abnahme der Gravitationskraft auf astronomischen Größenskalen einträte, hätte dies Auswirkungen auf die Umlaufbahnen der Planeten. Wie in Kapitel 3 erwähnt, wären die veränderten Umlaufbahnen instabil - entweder würden die Planeten in die Sonne stürzen oder in die Dunkelheit und Kälte des interstellaren Raums entweichen (Abb. 7.9).


Das geschähe jedoch nicht, wenn die Zusatzdimensionen an einer anderen Bran endeten, die nicht weit von derjenigen entfernt wäre, auf der wir leben. Dann könnte sich die Gravitation über Entfernungen, die größer als der Abstand der Branen wären, nicht frei ausbreiten, sondern wäre wie die elektrischen Kräfte in der Nähe unserer Bran gefangen und würde sich nunmehr so verhalten, daß die planetarischen Umlaufbahnen stabil wären (Abb. 7.10).



*(Abb. 7.10)
Eine zweite Bran in der Nähe unserer Branwelt würde die Gravitation daran hindern, sich weit in die zusätzlichen Dimensionen auszubreiten, und dazu führen, daß die Gravitation bei Entfernungen, die größer als der Branabstand sind, in einem Maße abfiel, wie es bei vier Dimensionen zu erwarten wäre.*




(Abb. 7.11)
DAS CAVENDISH-EXPERIMENT
 Zwei kleine Bleikugeln (A) sind mit einer Hantel verbunden (B). Diese Anordnung ist frei an einem Torsionsfaden (D) aufgehängt. Ein Laserstrahl (E) fällt auf einen kleinen Spiegel (C), der auf der Hantel angebracht ist, und wird von diesem auf einen geeichten Sichtschirm (F) reflektiert. Jede kleine Drehung der Hantel kann so durch die Bewegung des Laserpunktes auf dem Sichtschirm genau nachgewiesen werden. In der Nähe der kleineren Bleikugeln sind zwei größeren Bleikugeln (G1) auf einer drehbaren Stange angebracht. Große und kleine Bleikugeln ziehen sich mittels der Schwerkraft an. Dieser Kraft wirkt der verdrehte Torsionsfaden entgegen. Dem Gleichgewichtszustand entspricht eine bestimmte Position des Laserpunktes auf dem Schirm. Werden die großen Bleikugeln auf ihrer Stange gedreht und nun gerade von der anderen Seite an die kleinen Bleikugeln herangeführt (G2), wirkt wiederum ihre Schwerkraft, allerdings nun von der anderen Seite. Nach einigen Oszillationen der Hantel stellt sich ein neuer Gleichgewichtszustand ein, der einem neuen Ort des Laserpunktes auf dem Schirm entspricht. Der Vergleich der verschiedenen Positionen des Laserpunktes läßt Rückschlüsse auf die zwischen großen und kleinen Bleikugeln wirkende Schwerkraft zu.



Andererseits nähme die Gravitation bei Abständen, die kleiner wären als der Abstand der Branen, rascher ab. Die äußerst geringe Gravitationskraft zwischen schweren Objekten ist im Labor exakt gemessen worden, aber die Experimente hätten die Effekte von Branen, die weniger als ein paar Millimeter voneinander entfernt sind, noch nicht entdecken können. Gegenwärtig werden neue Messungen bei kürzeren Abständen durchgeführt (Abb. 7.11).

In dieser Branwelt würden wir auf einer Bran leben, aber es gäbe eine weitere »Schattenbran« ganz in der Nähe. Da das Licht auf die Branen eingeschränkt wäre und sich nicht im Raum zwischen ihnen ausbreiten könnte, wären wir nicht in der Lage, die Schattenwelt zu sehen. Aber wir könnten den Gravitationseinfluß von Materie auf der Schattenbran spüren. In unserer Bran hätte es den Anschein, als würden solche Gravitationskräfte durch wahrhaft »dunkle« Ursachen hervorgerufen - dunkel, weil sie nur durch ihre Gravitationswirkung zu entdecken wären (Abb. 7.12). Um die Geschwindigkeit erklären zu können, müssen wir annehmen, daß es mehr Masse als die der beobachtbaren Materie gibt. Diese fehlende Masse könnte von irgendeiner exotischen Teilchenart in unserer Welt gestellt werden, etwa von WIMPs, schwach wechselwirkenden massereichen Teilchen) oder Axionen, speziellen, sehr leichten Ele-



(Abb. 7.12)
 Im Branwelt-Szenario könnten Planeten eine dunkle Masse auf einer Schattenbran umkreisen, weil sich die Gravitationskraft in die zusätzlichen Dimensionen ausbreitet.




INDIZIEN FÜR DIE EXISTENZ DUNKLER MATERIE

Verschiedene kosmologische Beobachtungen legen nachdrücklich nahe, daß es sehr viel mehr Materie in unserer Milchstraße und anderen Galaxien geben muß, als wir sehen. Am überzeugendsten ist die Beobachtung, daß die Sterne in den äußeren Regionen von Spiralgalaxien wie der unsrigen viel zu schnell kreisen, um von der Gravitationsanziehung der für uns sichtbaren Sterne in ihren Bahnen gehalten werden zu können (vgl. Abbildung gegenüber). Wie wir seit den siebziger Jahren wissen, gibt es ein Mißverhältnis zwischen den beobachteten Rotationsgeschwindigkeiten der Sterne in den äußeren Regionen von Spiralgalaxien (im Diagramm durch die Punkte angegeben) und den Bahngeschwindigkeiten, die wir nach den Newtonschen Gesetzen von der Verteilung der sichtbaren Sterne in der Galaxie erwarten würden (die durchgezogene Kurve im Diagramm). Diese Diskrepanz läßt darauf schließen, daß es noch sehr viel mehr Materie in den äußeren Bereichen der Spiralgalaxien geben muß.

ROTATIONSKURVE FÜR SPIRALGALAXIE NGC3198


Albada & Sancisi 1986



DIE BESCHAFFENHEIT DUNKLER MATERIE

Kosmologen sind heute der Meinung, daß zwar die zentralen Bereiche der Spiralgalaxien größtenteils aus gewöhnlichen Sternen bestehen, daß hingegen die Masse ihrer Außenbezirke überwiegend von dunkler Materie herrührt, die wir nicht direkt sehen können. Eines der fundamentalen Probleme für die heutige Kosmologie besteht darin, herauszufinden, wie die dominante Form der dunklen Materie in diesen äußeren Regionen von Galaxien beschaffen ist. Bis in die späten siebziger Jahre hinein nahm man gewöhnlich an, diese dunkle Materie sei gewöhnliche Materie aus Protonen, Neutronen und Elektronen in irgendeiner schwerer zu entdeckenden Form, vielleicht in Gestalt von Gaswolken oder MACHOs - »massereichen kompakten Halo-Objekten« wie Weißen Zwergen, Neutronensternen oder sogar Schwarzen Löchern.

Doch neuere Untersuchungen zur Galaxienbildung haben die Kosmologen zu der Annahme geführt, ein erheblicher Bruchteil der dunklen Materie müsse in anderer Form als der gewöhnlicher Materie vorliegen. Vielleicht erwächst sie aus den Massen sehr leichter Elementarteilchen, etwa Axionen und Neutrinos. Möglicherweise besteht sie sogar aus noch exotischeren Teilchenarten wie zum Beispiel den WIMPs - »weakly interacting massive particles«, also »schwach Wechselwirkenden massereichen Teilchen« -, die von den neueren Elementarteilchentheorien vorhergesagt werden, aber experimentell noch nicht nachgewiesen worden sind.




Das Niemandsland der Zusatzdimension zwischen den Branen

(Abb. 7.13) Wir könnten eine Schattengalaxie auf einer Schattenbran nicht sehen, weil sich das Licht, im Gegensatz zur Gravitation, nicht in die zusätzlichen Dimensionen ausbreiten würde. Es erschiene uns daher, als würde die Rotation unserer Galaxie durch dunkle Materie beeinflusst werden, die wir nicht sehen könnten.

mentarteilchen. Aber fehlende Masse könnte auch ein Hinweis auf die Existenz einer Schattenwelt sein, die Materie enthält. Vielleicht beherbergt sie Schattenmenschen, die sich bei dem Versuch, die Umlaufbahnen ihrer Schattensterne um das Zentrum der Schattengalaxie zu erklären, den Kopf über die Masse zerbrecen, die ihrer Welt zu fehlen scheint (Abb. 7.13).

Würden die Zusatzdimensionen nicht an einer zweiten Bran enden, böte sich als eine andere Möglichkeit, daß sie unendlich ausgedehnt, aber extrem gekrümmt wären wie ein Sattel (Abb. 7.14). Wie Lisa Randall und Raman Sundrum gezeigt haben, würde diese Art von Krümmung ganz ähnlich wie eine zweite Bran wirken: Auf der Bran wäre der Gravitationseinfluß eines Objekts auf einen kleinen Bezirk in der Nachbar-



Diese eine Linie ist unsere Branwelt

schaft der Bran eingegrenzt und würde sich nicht unendlich in die Extradimensionen ausbreiten. Wie im Modell der Schattenbran hätte das Gravitationsfeld die richtige Entfernungabhängigkeit, die die Planetenbahnen und die Labormessungen der Gravitationskraft erklären könnte, allerdings würde sich die Gravitation bei kurzen Abständen rascher verändern.

Es gibt allerdings einen wichtigen Unterschied zwischen dem Modell von Randall und Sundrum und dem Modell der Schattenbran. Körper, die sich unter dem Einfluß von Gravitation bewegen, können Gravitationswellen erzeugen, geringe Änderungen der Krümmung, die sich mit Lichtgeschwindigkeit in der Raumzeit ausbreiten. Wie die elektromagnetischen Wellen des Licht müßten Gravitations-

(Abb. 7.14) Im Randall-Sundrum-Modell gibt es nur eine Bran (hier nur eindimensional dargestellt). Die zusätzlichen Dimensionen erstrecken sich ins Unendliche, sind aber gekrümmt wie ein Sattel. Diese Krümmung verhindert, daß sich die Gravitationsfelder von Materie auf der Bran in die Extradimensionen ausbreiten.



Zwei Neutronensterne, die einander in stetig geringer werdendem Abstand umkreisen




Kurve und Daten für den Doppelpulsar PSR 1913+16

DOPPEL PULSARE

Die allgemeine Relativitätstheorie sagt vorher, daß schwere Körper, die sich unter dem Einfluß der Schwerkraft bewegen, Gravitationswellen aussenden. Wie Lichtwellen tragen auch Gravitationswellen Energie von den Objekten fort, die sie emittieren. Allerdings ist der Energieverlust gewöhnlich außerordentlich gering und daher schwer zu beobachten. Beispielsweise veranlaßt die Emission von Gravitationswellen die Erde, sich in einer langsamen spiralförmigen Bewegung auf die Sonne zu bewegen, allerdings wird es bis zu ihrer Kollision noch weitere 10^{27} Jahre dauern! Doch 1975 entdeckten Russell Hulse und Joseph Taylor den Doppelpulsar PSR 1913+16, ein Doppelpulsarsystem, das aus zwei kompakten Neutronensternen besteht, die einander mit einem

maximalen Abstand von nur einem Sonnenradius umkreisen. Nach der allgemeinen Relativitätstheorie bedeutet diese rasche Bewegung, daß die Umlaufzeit des Systems merkbar abnehmen müßte, da es durch die Emission von starken Gravitationswellen stetig an Energie verliert. Die von der allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagte Änderungsrate deckt sich hervorragend mit den sorgfältigen Beobachtungen, die Hulse und Taylor in bezug auf die Bahnparameter vorgenommen haben und die zeigen, daß sich die Umlaufzeit seit 1975 um mehr als zehn Sekunden verkürzt hat. 1993 erhielten sie für diese Bestätigung der allgemeinen Relativitätstheorie den Nobelpreis.



(Abb. 7.15) Im Randall-Sundrum-Modell können kurzwellige Gravitationswellen Energie von Quellen auf der Bran davontragen und scheinbare Verstöße gegen den Energieerhaltungssatz bewirken.

wellen Energie tragen, eine Vorhersage, die durch Beobachtungen des Doppelpulsars PSR 1913+16 bestätigt worden ist.

Lebten wir wirklich auf einer Bran in einer Raumzeit mit zusätzlichen Dimensionen, würden sich die Gravitationswellen, die die Bewegung von Körpern auf der Bran erzeugten, in die anderen Dimensionen ausbreiten. Gäbe es eine zweite Bran, würden die Wellen von ihr reflektiert werden und zwischen den beiden Branen gefangen sein. Gäbe es dagegen, wie im Randall-Sundrum-Modell, nur eine Bran und wären die Zusatzdimensionen unendlich ausgedehnt, könnten die Gravitationswellen ganz entweichen und aus unserer Branwelt Energie davontragen (Abb. 7.15).


Das wäre ein schwerer Schlag für eines unserer physikalischen Grundgesetze: den Energieerhaltungssatz, nach dem die Gesamt-

energie im Universum immer gleich bleibt; sie kann weder zu noch abnehmen. Allerdings scheint es nur ein Verstoß gegen das Gesetz zu sein, weil unsere Sicht der Ereignisse auf die Bran beschränkt ist. Ein Engel, der die Zusatzdimensionen sehen könnte, wüßte, daß sich die Energiemenge nicht verändert, sondern nur anders verteilt hätte.

Die Gravitationswellen, die von zwei einander umkreisenden Sternen hervorgerufen werden, hätten eine Wellenlänge, die erheblich länger wäre als der Radius der sattelförmigen Krümmung in den Zusatzdimensionen. Daher wären die Wellen - wie die Gravitationskräfte - überwiegend auf einen kleinen Bezirk in der Nachbarschaft der Bran eingegrenzt, das heißt, sie würden sich nicht wesentlich in die Zusatzdimensionen verflüchtigen oder der Bran viel Energie entführen. Andererseits könnten Gravitationswellen, deren Wellenlänge kürzer als die Krümmungsradien der Extradimensionen wäre, leicht aus der Nachbarschaft der Bran entweichen.

Die einzige denkbare Quelle von größeren Mengen solcher kurzwelligen Gravitationswellen sind Schwarze Löcher. Ein Schwarzes Loch auf der Bran ragt auch in die Zusatzdimensionen hinein. Wenn es klein ist, hat es eine fast runde Form, das heißt, es würde ungefähr so weit in die Extradimensionen reichen, wie es Platz auf der Bran beanspruchte. Hingegen nähme ein großes Schwarzes Loch auf der Bran eher die Form eines »Schwarzen Pfannkuchens« an, der auf die Nachbarschaft der Bran beschränkt wäre und sich in weit größerem Maße auf der Bran ausbreitete, als er in die Zusatzdimensionen hineinragte (Abb. 7.16).

Wie in Kapitel 4 dargelegt, folgt aus der Quantentheorie, daß Schwarze Löcher nicht vollkommen schwarz sind: Wie heiße Körper emittieren sie Teilchen und Strahlung aller Art. Die Teilchen und die Strahlung würden wie das Licht entlang der Bran ausgesandt, weil Materie und nichtgravitative Kräfte wie die Elektrizität auf die Bran beschränkt wären. Doch Schwarze Löcher emittieren auch Gravitationswellen. Die wären nicht auf die Bran eingegrenzt, sondern würden sich auch in die Extradimensionen ausbreiten. Wäre das Schwarze Loch groß und pfannkuchenartig, blieben die Gravitationswellen in der Nähe der Bran. In diesem Fall verlöre das Schwarze Loch Energie (und folglich Masse, wie aus $E = mc^2$ hervorgeht) mit genau jener Rate, wie sie bei einem Schwarzen Loch in einer vierdimensionalen Raumzeit zu erwarten ist. Das Schwarze Loch würde also langsam verdunsten und schrumpfen, bis es kleiner wäre als der Krümmungsradius der sattelartig gekrümmten Extradimensionen. Von nun an entwichen die vom Schwarzen Loch emittierten Gravitationswellen ungehindert in die zusätzlichen Dimensionen.



(Abb. 7.16)
Ein Schwarzes Loch in unserer Welt auf der Bran würde sich in die Zusatzdimensionen ausdehnen. Wäre es klein, dann wäre es fast rund, doch ein großes Schwarzes Loch auf der Bran würde, bezieht man die Extradimensionen ein, wie ein abgeflachtes, pfannkuchenartiges Gebilde aussehen.



(Abb. 7.17)
Die Bildung einer Branwelt könnte der Entstehung einer Dampfblase in kochendem Wasser ähneln.

Ein Beobachter auf der Bran hätte den Eindruck, das Schwarze Loch emittierte »dunkle Strahlung«, Strahlung, die sich auf der Bran nicht direkt beobachten ließe, auf deren Vorhandensein jedoch der Umstand hinwies, daß das Schwarze Loch Masse verlöre.

Dies würde bedeuten, daß der letzte Strahlungsausbruch eines verdunstenden Schwarzen Lochs weniger energetisch erschiene, als er tatsächlich wäre. Das könnte der Grund sein, warum wir bislang keine Ausbrüche von Gammastrahlen beobachtet haben, die wir sterbenden Schwarzen Löchern zuschreiben könnten - allerdings sollten wir diesen »Nachweis« der Extradimensionen nicht überbewerten, denn es gibt noch eine andere, prosaischere Erklärung, die da lautet, daß einfach nicht viele Schwarze Löcher existieren, die massearm genug sind, um im gegenwärtigen Entwicklungsstadium des Universums zu verdunsten.

Die Strahlung von Schwarzen Löchern in einer Branwelt entsteht durch Quantenfluktuationen von Teilchen auf und jenseits einer Bran, doch Branen sind, wie alles im Universum, selbst Quantenfluktuationen unterworfen. Diese Fluktuationen können das spontane Entstehen und Verschwinden von Branen bewirken. Die Quantenschöpfung einer Bran hätte eine gewisse Ähnlichkeit mit der Blasenbildung in kochendem Wasser. Flüssiges Wasser besteht aus Milliarden und Abermilliarden dicht gepackter H₂O-Moleküle, die mit ihren nächsten Nachbarn locker verbunden sind. Wenn sich das Wasser erwärmt, bewegen sich die Moleküle schneller und prallen voneinander ab. Hin und wieder erhalten sie durch diese Stöße so hohe Geschwindigkeiten, daß in einer Gruppe von Molekülen die Bindungen zwischen ihnen abreißen und sich eine kleine Dampfblase bildet, die von Wasser umgeben ist. Die Blase wächst oder schrumpft, wie es der Zufall will: Entweder gesellen sich noch weitere Moleküle aus der Flüssigkeit dem Dampf hinzu oder umgekehrt. Die meisten kleinen Dampfblasen kollabieren wieder zu Flüssigkeit, doch einige wenige erreichen eine bestimmte kritische Größe, jenseits derer die Blasen fast mit Sicherheit weiter wachsen. Das sind die großen expandierenden Blasen, die wir mit bloßem Auge im kochendem Wasser beobachten können (Abb. 7.17).

Das Verhalten von Branwelten wäre ähnlich. Dank der Unschärferelation könnten Branwelten wie Blasen aus dem Nichts auftauchen, wobei die Bran die Fläche der Blase und das Innere der höherdimensionalen Raum wäre. Sehr kleine Blasen würden meist wieder zu nichts zusammenstürzen, doch eine Blase, die durch Quantenfluktuationen über eine bestimmte kritische Größe anwüchse, würde sich wahrscheinlich weiter ausdehnen. Menschen wie wir, die auf






der Bran lebten, würden meinen, das Universum expandiere. Es wäre so, als malte man Galaxien auf die Oberfläche eines Ballons und bliese ihn dann auf. Die Galaxien würden auseinanderdriften, doch keine Galaxie ließe sich als Zentrum der Expansionsbewegung bestimmen. Hoffen wir, daß niemand mit einer kosmischen Nadel in die Blase piekst.

Nach der in Kapitel 3 dargestellten Kein-Rand-Hypothese hätte die spontane Entstehung einer Branwelt eine Geschichte in der imaginären Zeit, die einer Nußschale ähnelte, das heißt, sie wäre eine vierdimensionale Kugelfläche, ähnlich der Oberfläche der Erde, aber mit zwei zusätzlichen Dimensionen. Der entscheidende Unterschied läge darin, daß die in Kapitel 3 beschriebene Nußschale im wesentlichen hohl wäre. Die vierdimensionale Kugelfläche bildete keine Grenze von irgend etwas, noch nicht einmal von leerem Raum, und die anderen sechs oder sieben Dimensionen der Raumzeit, die die M-Theorie vorhersagt, wären alle noch kleiner zusammengewickelt als die Nußschale. In dem neuen Modell der Branwelt wäre die Nußschale jedoch gefüllt: Die Geschichte der Bran, auf der wir lebten, wäre eine vierdimensionale Kugelfläche, die die Grenze einer fünfdimensionalen Blase bildete, während die restlichen fünf oder sechs Dimensionen sehr eng aufgewickelt wären (Abb. 7.18).

Diese Geschichte der Bran in imaginärer Zeit würde ihre Geschichte in reeller Zeit bestimmen. In reeller Zeit würde die Bran, wie in Kapitel 3 beschrieben, in beschleunigter inflationärer Weise expandieren. Eine vollkommen glatte und runde Nußschale wäre die wahrscheinlichste Geschichte der Blase in imaginärer Zeit. Doch sie entspräche einer Bran, die in reeller Zeit ewig und inflationär expandierte. Auf einer solchen Bran würden sich keine Galaxien bilden und damit auch keine intelligenten Lebensformen entwickeln. Zwar wären Geschichten in imaginärer Zeit, die nicht vollkommen glatt und rund wären, etwas weniger wahrscheinlich. Sie haben aber die Möglichkeit, einer Geschichte in reeller Zeit zu entsprechen, bei der die Bran zwar zunächst eine Phase beschleunigter inflationärer Expansion durchlaufen, dann aber ihr Expansionsstempo verringert hätte. Während der abgebremsten Expansion hätten sich Galaxien bilden und daraufhin möglicherweise intelligente Lebensformen entwickeln können. Nach dem anthropischen Prinzip können nur diejenigen Nußschalen, die kleine Ausbeulungen aufweisen, von intelligenten Wesen beobachtet werden, die sich fragen, warum der Ursprung des Universums nicht vollkommen glatt war.

Mit der Expansion der Bran wüchse auch das Volumen des höherdimensionalen Raums in ihrem Innern. Schließlich gäbe es eine enorme Blase, umgeben von der Bran, auf der wir lebten. Aber leben wir wirklich auf einer Bran? Nach dem in Kapitel 2 beschriebenen holografi-




Eine Hohlkugel



Eine gefüllte Kugel

(Abb. 7.18)

Der Branwelt-Entwurf vom Ursprung des Universums unterscheidet sich von dem in Kapitel 3 erörterten dadurch, daß die abgeflachte vierdimensionale Kugel oder Nußschale nicht mehr vollkommen leer, sondern mit einer fünften Dimension gefüllt ist.



HOLOGRAPHIE
 Die Holographie verschlüsselt die Information einer Raumregion auf einer Fläche, die eine Dimension weniger aufweist. Das scheint eine Eigenschaft der Gravitation zu sein, wie der Umstand zeigt, daß die Fläche des Ereignishorizonts zur Zahl der inneren Zustände eines Schwarzen Lochs proportional ist. In einem Branwelt-Modell wäre die Holographie eine Eins-zu-eins-Entsprechung zwischen Zuständen in unserer vierdimensionalen Welt und Zuständen in höheren Dimensionen. Aus positivistischer Sicht kann man nicht entscheiden, welche Beschreibung fundamentaler ist.

schen Prinzip kann die Information über das, was in einer Region der Raumzeit geschieht, auf ihrem Rand kodiert werden. So bilden wir uns vielleicht ein, wir lebten in einer vierdimensionalen Welt, weil wir Schatten sind, die durch das Geschehen im Innern der Blase auf die Bran geworfen werden. Doch aus positivistischer Sicht können wir nicht fragen: Was ist Wirklichkeit, Bran oder Blase? Beide sind mathematische Modelle, die unsere Beobachtungen beschreiben. Es steht uns frei, das jeweils geeignetere Modell zu verwenden.

Was liegt außerhalb der Bran? Da gibt es mehrere Möglichkeiten (Abb. 7.19):

1. Vielleicht existiert gar kein Außerhalb. Eine Dampfblase ist zwar von Wasser umgeben, doch handelt es sich hier nur um einen Vergleich, der uns helfen soll, uns den Ursprung des Universums vorzustellen. Man könnte sich ein mathematisches Modell denken, das nur eine Bran wäre, mit einem höherdimensionalen Raum im Innern, aber absolut nichts draußen, noch nicht einmal leerem Raum. Die Vorhersagen des Modells lassen sich ohne Rückgriff darauf berechnen, was außerhalb der Bran liegt.

2. Es ließe sich auch ein mathematisches Modell denken, in dem die Außenseite einer Blase an der Außenseite einer gleichen, von innen nach außen gekehrten Blase klebte. Tatsächlich ist dieses Modell mathematisch äquivalent zu der oben erörterten Möglichkeit - es gäbe nichts außerhalb der Blase -, aber der Unterschied hätte psychologische Bedeutung: Menschen fühlen sich im Mittelpunkt der Raumzeit glücklicher als an ihrem Rand. Für einen Positivisten gibt es jedoch keinen Unterschied zwischen den Möglichkeiten 1 und 2.

3. Die Blase könnte in einen Raum hineinragen, der kein Spiegelbild dessen wäre, was sich in der Blase befände. Diese Möglichkeit unterscheidet sich von den beiden oben beschriebenen und hat mehr Ähnlichkeit mit dem Fall des kochenden Wassers. Andere Blasen könnten sich bilden und expandieren. Wenn eine von ihnen mit der Blase, in der wir lebten, zusammenstieße und verschmolze, wäre das Ergebnis katastrophal. Manche haben sogar die Vermutung geäußert, der Urknall selbst sei durch eine Kollision zwischen Branen hervorgerufen worden.

Branwelt-Modelle wie diese sind ein beliebtes aktuelles Forschungsthema. Zwar sind sie äußerst spekulativ, doch machen sie neuartige Aussagen über die Welt, die sich durch Beobachtung überprüfen lassen. Sie könnten erklären, warum die Gravitation so schwach erscheint. Während die Gravitation in der grundlegenden Theorie sehr stark sein könnte, hätte die Ausbreitung der Gravitation in die zusätzlichen Dimensionen zur Folge, daß die Schwerkraft in großen Entfernungen auf der Bran, auf der wir lebten, gering wäre.

Dies würde bedeuten, daß die Planck-Länge, der kleinste Abstand, den wir erfassen können, ohne automatisch ein Schwarzes Loch zu erzeugen, erheblich größer wäre, als man angesichts der schwachen Gravitation auf unserer vierdimensionalen Bran vermuten würde. Die kleinste Matroschka wäre also gar nicht so winzig; sie könnte sich durchaus in Reichweite zukünftiger Teilchenbeschleuniger befinden. Vielleicht hätten wir sogar schon die kleinste Matroschka entdeckt, die fundamentale Planck-Länge, wenn die Vereinigten Staaten nicht 1994 in einem Anfall von Armutsanst den Bau des SSC - Superconducting Super Collider (Supraleitender Superbeschleuniger) - gestoppt hätten, obwohl er schon halb fertig war. Ge-

(Abb. 7.19)



1. Eine Bran/Blase mit einem höherdimensionalen Raum im Innern und nichts, noch nicht einmal leerem Raum, außerhalb.


Diese Flächen sind vollständig aufeinandergeklebt



2. Eine Möglichkeit, bei der die Außenseite einer Bran/Blase an die Außenseite einer anderen Blase geklebt wird.




3. Eine Bran/Blase dehnt sich in einen Raum aus, der nicht das Spiegelbild dessen ist, was sich im Innern befindet. In einem solchen Szenario könnten sich andere Blasen bilden und expandieren.



genwärtig werden andere Teilchenbeschleuniger wie der LHC (Large Hadron Collider - Großer Hadronen-Speicherring) in Genf gebaut (Abb. 7.20). Mit diesen und anderen Beobachtungen, etwa der kosmischen Hintergrundstrahlung, können wir vielleicht entscheiden, ob wir auf einer Bran leben oder nicht. Falls ja, so liegt es vermutlich daran, daß das anthropische Prinzip geeignete Branmodelle aus dem riesigen Zoo der Universen auswählt, die die M-Theorie zuläßt. In Anlehnung an Miranda aus Shakespeares Sturm könnten wir sagen:

*Schöne neue Branwelt,
Die solche Bürger trägt!*

Das ist das Universum *in nuce*.



GLOSSAR

Absoluter Nullpunkt

Die niedrigste mögliche Temperatur, ungefähr -273 Grad auf der Celsiusskala und 0 Grad auf der *Kelvinskala*. Bei dieser Temperatur besitzen Stoffe keine Wärmeenergie.

Absolute Zeit

Die Vorstellung, es könne ein universelle Uhr geben. Einsteins *Relativitätstheorie* zeigte, daß es keine solche Uhr geben kann.

Allgemeine Relativitätstheorie

Einsteins Theorie, die auf der Idee beruht, daß die physikalischen Gesetze für alle *Beobachter* die gleichen sein müssen, unabhängig von ihrem Bewegungszustand. Sie erklärt die *Gravitationskraft* als Auswirkung der Krümmung einer vierdimensionalen Raumzeit.

Amplitude

Die maximale Höhe eines Wellenbergs oder die maximale Tiefe eines Wellentals. Anfangsbedingungen Daten, die den Ausgangszustand eines physikalischen Systems beschreiben.

Anthropisches Prinzip

Die Vorstellung, wir nähmen das Universum wahr, wie es ist, weil niemand vorhanden wäre, es zu betrachten, wenn es in irgendeiner Weise anders wäre.

Antiteilchen

Jede Art von Materieteilchen hat ein entsprechendes Antiteilchen gleicher Masse, aber entgegengesetzter Ladung. Wenn ein Teilchen mit seinem Antiteilchen zusammenstößt, ver-

nichten sie sich gegenseitig, so daß nur Energie übrigbleibt.

Äther

Ein hypothetisches nichtmaterielles Medium, von dem man einst annahm, es fülle den gesamten Raum aus. Die Idee, ein solches Medium sei für die Ausbreitung elektromagnetischer Strahlung erforderlich, ist nicht mehr haltbar.

Atom

Der Grundbaustein gewöhnlicher Materie, bestehend aus einem winzigen *Kern (Protonen und Neutronen)*, der von *Elektronen* umkreist wird.

Aufgewickelte Dimension

Eine räumliche Dimension, die so klein aufgerollt oder anderweitig von so geringer Ausdehnung ist, daß sie sich der direkten Wahrnehmung entzieht.

Beobachter

Ein Mensch oder ein Gerät, der oder das die physikalischen Eigenschaften eines Systems mißt.

Beschleunigung

Eine Veränderung im Geschwindigkeitsbetrag oder in der Bewegungsrichtung eines Objekts.

Blaerverschiebung

Die durch den *Doppler-Effekt* verursachte Verkürzung der Wellenlänge einer *Strahlung*, wenn sich *Beobachter* und Strahlenquelle aufeinander zu bewegen.

Boson

Ein Teilchen oder das Schwingungsmuster eines String mit einem ganzzahligen *Spin*.

Bran

Ausgedehnte Objekte, wie sie in der *Stringtheorie* vorkommen. Eine 1-Bran ist ein *String*, eine 2-Bran eine Membran, eine 3-Bran hat drei ausgedehnte Dimensionen und so fort. Allgemeiner: Eine p-Bran hat p Dimensionen.

Branwelt

Eine vierdimensionale Fläche oder *Bran* in einer höherdimensionalen *Raumzeit*.

Casimir-Effekt

Der »Unterdruck« zwischen zwei flachen, parallelen Metallplatten, die sich nahe beieinander im Vakuum befinden. Der Druck geht gewissermaßen auf eine Verringerung der üblichen Anzahl von *virtuellen Teilchen* im Raum zwischen den Platten zurück.

Chronologieschutzthese

Die These, die Gesetze der Physik wirkten so zusammen, daß Vergangenheitszeitreisen *makroskopischer* Objekte verhindert werden.

DNS

Desoxyribonukleinsäure. Zwei Stränge DNS bilden eine Doppelhelix, die durch Basenpaare dergestalt verbunden ist, daß sie wie eine Wendeltreppe aussieht. In der DNS sind alle Informationen kodiert, die erforderlich sind, um Leben hervorzubringen.

Doppler-Effekt

Veränderungen der *Wellenlänge*, wie sie ein *Beobachter* wahrnimmt, der sich relativ zur Strahlenquelle bewegt.

Dualität

Eine Entsprechung zwischen Theorien, die verschieden scheinen, aber zu den gleichen physikalischen Ergebnissen führen.

Dunkle Materie

Materie in Galaxien und Galaxienhaufen - möglicherweise auch zwischen Galaxienhaufen -, die nicht direkt beobachtet werden kann, aber durch ihre Gravitation nachweisbar ist. Bis zu neunzig Prozent der Materie im Universum ist dunkle Materie.

Elektrische Ladung

Eigenschaft eines Teilchens, dank deren es andere Teilchen abstoßen (oder anziehen) kann, die eine elektrische Ladung mit gleichem (oder entgegengesetztem) Vorzeichen haben.

Elektromagnetische Kraft

Die Kraft zwischen Teilchen mit *elektrischer Ladung* gleichen (oder entgegengesetzten) Vorzeichens.

Elektromagnetische Welle

Eine wellenartige Störung in einem *elektromagnetischen Feld*. Alle Wellen des elektromagnetischen Spektrums breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus, so zum Beispiel das sichtbare Licht, Röntgenstrahlen, Mikrowellen, Infrarotlicht usw.

Elektron

Ein *Elementarteilchen* mit negativer *elektrischer Ladung*. Die Hülle, die den *Kern* eines *Atoms* umgibt, besteht aus Elektronen.

Elementarteilchen

Ein Teilchen, von dem man annimmt, es könne nicht weiter geteilt werden.

Energieerhaltung

Das Naturgesetz, nach dem Energie (oder die ihr äquivalente Masse) weder erschaffen noch vernichtet werden kann.

Entropie

Ein Maß für die Unordnung eines physikalischen Systems: die Anzahl jener verschiedenen Möglichkeiten, die mikroskopischen Bestandteile des Systems anzuordnen, die zum selben *makroskopischen* Erscheinungsbild führen.

Ereignis

Ein Punkt in der *Raumzeit*. Ereignisse sind durch Angabe eines Ortes und eines Zeitpunkts definiert.

Ereignishorizont

Der Rand eines Schwarzen Lochs; die Grenze der Region, aus der nichts mehr in die Unendlichkeit entweichen kann.

Feld

Ein Gebilde, das an allen Punkten der *Raumzeit* definiert ist, im Gegensatz etwa zu einem Teilchen, das zu einer bestimmten Zeit nur an einem Punkt vorhanden ist. Felder können Kraftwirkungen übertragen, vgl. *Gravitationsfeld*.

Fermion

Ein Teilchen oder ein Schwingungsmuster eines String mit halbzahligen *Spin* ($1/2, 3/2, \dots$); gewöhnlich ein Materieteilchen.

Freier Raum

Ein Teil des Vakuums, das vollkommen frei von *Feldern* ist, das heißt, in dem keine Kräfte wirken.

Frequenz

Bei einer Welle die Zahl der abgeschlossenen Zyklen pro Sekunde.

Gewicht

Die Kraft, die durch ein *Gravitationsfeld* auf einen Körper ausgeübt wird. Sie ist zur Masse proportional, aber nicht mit ihr identisch.

Grassmann-Zahlen

Zahlen, die antikommutieren, das heißt, für je zwei Grassmann-Zahlen a und b gilt $a \times b = -b \times a$.

Gravitationsfeld

Das Feld, durch das die Gravitation ihren Einfluß geltend macht.

Gravitationskraft

Die schwächste der vier fundamentalen Naturkräfte; wirkt zwischen massebehafteten Objekten.

Gravitationswelle

Eine wellenartige Störung in einem *Gravitationsfeld*.

Großer Endkollaps

Ein mögliches Szenario für das Ende des Universums, bei dem der gesamte Raum und alle Materie zu einer Singularität zusammenstürzen.

Große vereinheitlichte Theorie

Eine Theorie, die die Beschreibung der *elektromagnetischen*, der starken und der schwachen Kraft in einem einzigen theoretischen Rahmen vereinigt.

Grundzustand

Derjenige Zustand eines Systems mit minimaler Energie.

Holographisches Prinzip

Die Idee, daß die Quantenzustände eines Systems in einer Region der *Raumzeit* auf der Grenze dieser Region kodiert sein könnten.

Imaginäre Zahl

Abstrakte mathematische Konstruktion: eine Zahl, deren Quadrat negativ ist. Reelle und imaginäre Zahlen kann man sich so vorstellen, daß sie die Positionen von Punkten auf einer Ebene bezeichnen, und zwar dergestalt, daß die imaginären Zahlen gewissermaßen rechtwinklig zu den reellen Zahlen liegen.

Imaginäre Zeit

Zeit, die mit Hilfe von *imaginären Zahlen* gemessen wird.

Inflation

Ein kurzer Zeitraum beschleunigter Expansion, in deren Verlauf die Größe des sehr frühen Universums um einen enormen Faktor anwuchs.

Interferenzmuster

Wellenmuster, das sich ergibt, wenn sich Wellen überlagern, die zu verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Orten aus emittiert werden.

Kein-Rand-Bedingung

Die Idee, daß das Universum von endlicher Ausdehnung ist, aber in der *imaginären Zeit* keinen Rand besitzt.

Kelvin

Eine Temperaturskala, auf der die Temperaturen relativ zum absoluten Nullpunkt angegeben werden.

Kern

Der zentrale Teil eines *Atoms*, der

aus *Protonen* und *Neutronen* besteht und durch die *starke Kraft* zusammengehalten wird.

Kernfusion

Prozeß, in dessen Verlauf zwei Kerne zusammenstoßen und sich zu einem größeren und schwereren Kern vereinigen.

Kernspaltung

Prozeß, in dessen Verlauf ein *Kern* unter Freisetzung von Energie in zwei oder mehr kleinere Kerne zerfällt.

Klassische Theorie

Theorie, die auf den physikalischen Konzepten aus der *Zeit* vor der *Relativitätstheorie* und der *Quantenmechanik* beruht. Klassische Theorien gehen davon aus, daß man Objekten wohldefinierte Positionen und Geschwindigkeiten zuordnen kann. Wie die Heisenbergsche *Unschärferelation* zeigt, ist das auf sehr kleinen Größenskalen nicht mehr möglich.

Kosmische Hintergrundstrahlung

Die *Strahlung* des frühen heißen Universums; jetzt ist sie so *rotverschoben*, daß sie nicht als Licht in Erscheinung tritt, sondern als Mikrowellenstrahlung (Wellenlängen von einigen Zentimetern).

Kosmologie

Die Lehre vom Universum als Ganzem.

Kosmologische Konstante

Ein mathematisches Hilfsmittel, mit dem Einstein dem Universum eine inhärente Expansionstendenz einbauen wollte, damit die *allgemeine Relativitätstheorie* ein statisches Universum vorhersagen konnte.

Kosmischer String

Ein langes, schweres Objekt mit einem winzigen Querschnitt, wie es während der frühen Stadien des Universums entstanden sein könnte. Heute könnte sich ein einzelner solcher String durch das gesamte Universum erstrecken.

Lichtjahr

Die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt.

Lichtkegel

Eine dreidimensionale Fläche in der *Raumzeit*, gebildet durch die Gesamtheit aller Lichtbahnen, die durch ein gegebenes Ereignis gehen.

Lichtsekunde

Die Entfernung, die das Licht in einer Sekunde zurücklegt.

Lorentz-Kontraktion

Phänomen, das sich aus der speziellen *Relativitätstheorie* ergibt: Ein bewegtes Objekt erscheint in seiner Bewegungsrichtung verkürzt.

Magnetfeld

Das Feld, das magnetische Kräfte vermittelt.

Makroskopisch

Größenskalen, die größer oder gleich den typischen Ausdehnungen in unserer Alltagswelt sind, das heißt Längen bis hinab zu rund 0,01 mm; Abstände unterhalb dieser Grenze bezeichnet man als mikroskopisch.

Masse

Die »Materiequantität« in einem Körper; seine Trägheit oder sein Widerstand gegen *Beschleunigung im freien Raum*

Maxwell-Feld

Mathematische Formulierung der Gesetze, welche die Eigenschaften von Elektrizität, Magnetismus und Licht beschreiben; faßt Gesetze zusammen, die bereits vorher von Gauß, Faraday und Ampere formuliert worden waren.

Mooreches Gesetz

Gesetz, nach dem sich die Leistungsfähigkeit von Computern alle achtzehn Monate verdoppelt. Natürlich kann es nicht unbegrenzt gelten.

M-Theorie

Theorie, die die verschiedenen *Stringtheorien* in einem übergeordneten Rahmen vereinigt. Offenbar hat sie elf Raumzeitdimensionen, obwohl viele Eigenschaften noch nicht ganz verstanden werden.

Nackte Singularität

Eine *Raumzeitsingularität*, die nicht von einem *Schwarzen Loch* umgeben und daher für einen fernen *Beobachter* sichtbar ist.

Neutrino

Ladungslose Teilchenart, die nur der *schwachen Kraft* unterworfen ist.

Neutron

Eine ungeladene Teilchenart, die dem *Proton* sehr ähnlich ist und ungefähr die Hälfte aller Teilchen in einem *Atomkern* stellt. Besteht aus drei Quarks (zwei down, ein up).

Newtonsche Bewegungsgesetze

Gesetze, die, auf dem Begriff von absolutem Raum und absoluter Zeit fußend, die Bewegung von Körpern beschreiben. Sie beherrschten das physikalische Weltbild, bis Einstein die *spezielle Relativitätstheorie* entwickelte.

Newtonsches Gravitationsgesetz

Gesetz, nach dem die Anziehungskraft zwischen zwei Körpern proportional zum Produkt ihrer Massen und umgekehrt proportional zu ihrem Abstand ist. Aus heutiger Sicht ein Grenzfall der allgemeinen Relativitätstheorie.

Pauli-Prinzip

Das physikalische Gesetz, nach dem zwei identische Teilchen mit halbzahligem Spin (in den Grenzen der Unschärferelation) nicht dieselbe Position und dieselbe Geschwindigkeit haben können.

p-Bran

Siehe Bran.

Photoelektrischer Effekt

Phänomen, bei dem Elektronen aus einer metallischen Oberfläche hinausgeschleudert werden, wenn sie Licht ausgesetzt werden.

Photon

Ein *Lichtquant*, so etwas wie das kleinste Energiepaket des elektromagnetischen Feldes.

Planck-Länge

Rund 10^{-35} Meter. Die Größe eines typischen String in der Stringtheorie.

Plancksches Wirkungsquantum

Eckpfeiler der Unschärferelation - das Produkt der Unschärfe in Position und Geschwindigkeit muß größer als das Plancksche Wirkungsquantum sein. Es wird durch das Symbol h oder \hbar bezeichnet.

Plancksches Quantenprinzip

Die Idee, daß elektromagnetische Energie (beispielsweise Licht) nur in diskreten *Quanten* emittiert oder absorbiert werden kann.

Planck-Zeit

Rund 10^{-43} Sekunden. Die Zeit, die das Licht braucht, um eine Planck-Länge zurückzulegen.

Positivistischer Ansatz

Der Gedanke, daß eine wissenschaftliche Theorie ein mathematisches Modell ist, das die Beobachtungen beschreibt und kodifiziert.

Positron

Das positiv geladene *Antiteilchen* des *Elektrons*.

Proton

Ein positiv geladenes Teilchen, das dem *Neutron* sehr ähnlich ist und etwa die Hälfte der Masse eines Atomkerns ausmacht. Es besteht aus drei Quarks (zwei up und ein down).

Quantenmechanik

Theorie, die aus *Plancks Quantenprinzip* und Heisenbergs *Unschärferelation* entwickelt wurde.

Quant

Die unteilbare Einheit, in der Wellen absorbiert und emittiert werden können.

Quantengravitation

Eine Theorie, die die *Quantenmechanik* mit der *allgemeinen Relativitätstheorie* vereinigt. Die *Stringtheorie* ist ein Beispiel für eine Theorie der Quantengravitation.

Quark

Ein geladenes Elementarteilchen, auf das die *starke Kraft* einwirkt. Gibt es in sechs Arten (up, down, charm, strange, top, bottom), jede davon in drei »Farben« (rot, grün, blau).

Radioaktivität

Der spontane Zerfall eines Atomkerns einer Art in den einer anderen Art.

Randall-Sundrum-Modell

Die Theorie, daß wir auf einer *Bran* in einem unendlich großen fünfdimensionalen Raum leben, der negativ gekrümmt ist wie ein Sattel.

Randbedingungen

Der Anfangszustand eines physikalischen Systems oder, allgemeiner, der Zustand eines Systems an einem Zeit oder Raumrand.

Raumzeit

Der vierdimensionale Raum, dessen Punkte *Ereignisse* sind.

Relativitätstheorie

Siehe allgemeine Relativitätstheorie; spezielle Relativitätstheorie.

Rotverschiebung

Durch den *Doppler-Effekt* bedingte Rotfärbung der *Strahlung*, wenn sich Strahlenquelle und *Beobachter* voneinander entfernen.

Schrödinger-Gleichung

Gleichung, die die zeitliche Entwicklung der *Wellenfunktion* in der *Quantenmechanik* bestimmt.

Schwache Kraft

Die zweitschwächste der vier funda-

mentalener Naturkräfte mit sehr kurzer Reichweite. Sie wirkt auf alle Materieteilchen ein, aber nicht auf die Kraftteilchen.

Schwarzes Loch

Region der *Raumzeit*, aus der nichts, noch nicht einmal Licht, entweichen kann, weil die Gravitation so stark ist.

Singularität

Punkt in der *Raumzeit*, an dem die Raumzeitkrümmung unendlich wird.

Singularitätentheorem

Theorem, nach dem *Singularitäten* unter bestimmten Umständen zwingend auftreten müssen, etwa am Anfang des Universums.

Sonnenfinsternis

Findet statt, wenn sich der Mond zwischen Erde und Sonne schiebt und sein Schatten auf der Erde eine Dunkelheit verursacht, die gewöhnlich nur einige Minuten andauert. 1919 lieferte eine Sonnenfinsternis, die von Westafrika aus beobachtet wurde, den zweifelsfreien Beweis für die Richtigkeit der *allgemeinen Relativitätstheorie*.

Spektrum

Die Gesamtheit der Teilwellen unterschiedlicher *Frequenz*, aus denen eine Welle besteht. Der sichtbare Teil des Spektrums der Sonnenstrahlung ist manchmal als Regenbogen zu sehen.

Spezielle Relativitätstheorie

Einsteins Theorie, die auf dem Gedanken beruht, daß die physikalischen Gesetze in Abwesenheit von *Gravitationsfeldern* für alle *Beobachter*, egal, wie sie sich bewegen, gleich sein sollten.

Spin

Eine innere Eigenschaft von *Elementarteilchen*; quantenmechanisches Analogon der Vorstellung, daß sich Teilchen wie mikroskopische Kreisel um sich selbst drehen.

Standardmodell der Kosmologie

Modell der Entwicklung unseres Universums, das die *Urknalltheorie* mit dem *Standardmodell der Teilchenphysik* verknüpft.

Standardmodell der Teilchenphysik

Die quantentheoretische Beschreibung der drei nichtgravitativen Kräfte und ihrer Effekte auf Materie.

Starke Kraft

Die stärkste der vier fundamentalen Naturkräfte, aber mit der effektiv kürzesten Reichweite. Sie hält die Quarks in *Protonen* und *Neutronen* zusammen und ist auch dafür verantwortlich, daß sich Protonen und *Neutronen* zu *Atomkernen* verbinden.

Stationärer Zustand

Ein Zustand, der sich mit der Zeit nicht verändert.

Strahlung

Energie, die von Wellen oder Teilchen davongetragen wird.

String

Fundamentales eindimensionales Objekt; wesentlicher Bestandteil der *Stringtheorie*.

Stringtheorie

Physikalische Theorie, in der Teilchen als Schwingungszustände von Strings beschrieben werden. Vereint *Quantenmechanik* und *allgemeine Relativitätstheorie*. Auch als Superstringtheorie bezeichnet.

Supergravitation

Gruppe von Theorien, die die allgemeine *Relativitätstheorie* und die *Supersymmetrie* vereinigen.

Supersymmetrie

Prinzip, das die Eigenschaften von Teilchen mit unterschiedlichen *Spins* miteinander in Beziehung setzt.

Tachyon

Ein Teilchen, dessen quadrierte Masse negativ ist.

Teilchenbeschleuniger

Eine Anlage, die elektrisch geladene Teilchen beschleunigt und ihnen dadurch Energie zuführt.

Thermodynamik

Gesetze, die im 19. Jahrhundert ausgearbeitet wurden, um Wärme, Arbeit, Energie, *Entropie* und ihre Wechselbeziehungen in einem physikalischen System zu beschreiben.

Unendlichkeit

Ein Bereich oder eine Zahl, die unbeschränkt und endlos ist.

Unschärferelation

Das von Heisenberg formulierte Prinzip, nach dem sich der Ort und die Geschwindigkeit eines Teilchens nicht gleichzeitig exakt bestimmen lassen. Je genauer man eines kennt, desto größer die Ungewißheit in bezug auf das andere.

Urknall

Die *Singularität* zu Beginn des Universums vor rund fünfzehn Milliarden Jahren.

Vakuumergie

Energie, die selbst im scheinbar leeren Raum vorhanden ist. Merkwürdigerweise wäre die Anwesenheit von Vakuumergie im Gegensatz zur Anwesenheit von *Masse* in der Lage, die Expansion des Universums zu beschleunigen.

Vereinheitlichte Theorie

Jede Theorie, die alle vier Grundkräfte und alle Materie in einem einzigen, einheitlichen theoretischen Rahmen beschreibt.

Virtuelles Teilchen

In der *Quantenmechanik* ein Teilchen, das nicht direkt nachgewiesen werden kann, dessen Vorhandensein aber indirekt meßbare Effekte hat. Siehe auch *Casimir-Effekt*.

Wellenfunktion

Wahrscheinlichkeitswelle; grundlegendes Objekt der *Quantenmechanik*.

Wellenlänge

Die Entfernung zwischen zwei aufeinander folgenden Wellentälern oder Wellenbergen.

Welle-Teilchen-Dualismus

Quantenmechanisches Konzept, nach dem Materie sowohl Teilchen- als auch Welleneigenschaften hat; Teilchen können sich wie Wellen verhalten und umgekehrt.

Wissenschaftlicher Determinismus

Uhrwerkkonzeption des Universums von Laplace, der meinte, das vollständige Wissen um den Zustand des Universums biete die Voraussetzung, den vollständigen Zustand zu früheren oder künftigen Zeitpunkten vorherzusagen.

Wurmloch

Eine dünne Röhre in der *Raumzeit*, die weit entfernte Regionen des Universums miteinander verbindet. Wurmlöcher könnten auch Verbindungen zu Parallel- oder Babyuniversen sein sowie die Möglichkeit zu Zeitreisen bieten.

Yang-Mills-Theorie

Eine Erweiterung der Maxwellschen Feldtheorie (siehe *Maxwell-Feld*), mit deren Hilfe sich Kräfte wie die *schwache* und die *starke Kraft* beschreiben lassen.

Zeitdehnung

Phänomen in der *speziellen Relativitätstheorie*, daß sich der Zeitfluß aus Sicht eines äußeren *Beobachters* für Objekte in Bewegung oder in einem starken *Gravitationsfeld* verlangsamt.

Zeitschleife

Eine Bahn in der *Raumzeit*, entlang derer ein Objekt eine Reise in seine eigene Vergangenheit unternehmen kann.

Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik

Gesetz, nach dem die *Entropie* stets anwächst.

ZUM LESEN
EMPFOHLEN

Es gibt viele populärwissenschaftliche Bücher, von denen manche, wie *Das elegante Universum*, sehr gut sind und andere (die ich hier nicht nennen möchte) von bedauerenswerter Einfalt. Ich schränke meine Liste deshalb auf Autoren ein, die selbst wichtige Forschungsbeiträge geleistet haben, so daß ihre Bücher authentische Erfahrungen vermitteln. Ich bitte all jene um Nachsicht, die ich aufgrund meiner Unkenntnis vergessen habe.

Albert Einstein, *Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie*, Wiesbaden: Vieweg, 1997.
Richard Feynman, *Vom Wesen physikalischer Gesetze*, München: Piper, 2000 (4. Auflage).

Brian Greene, *Das elegante Universum: Superstrings, verborgene Dimensionen und die Suche nach der Weltformel*, Berlin: Berlin Verlag, 1999.

Alan H. Guth, *Die Geburt des Kosmos aus dem Nichts: Die Theorie des inflationären Universums*, München: Droemer Knauer, 1999.

Martin J. Rees, *Our Cosmic Habitat*, Princeton: Princeton University Press, 2001.

Martin J. Rees, *Just Six Numbers: The Deep Forces that Shape the Universe*, New York: Basic Books, 2000.

Kip Thorne, *Gekrümmter Raum und verbogene Zeit: Einsteins Vermächtnis*, München: Droemer Knauer, 1996.

Steven Weinberg, *Die ersten drei Minuten: Der Ursprung des Universums*, München: Piper, 2000 (3. Auflage der Neuausgabe).

ABBILDUNGS-
NACHWEIS

Stewart Cohen Pictures 6
AKG Photo, London 13
Los Alamos National Library 21
Science Photo Library 31
Harry Burnett/Archiv des California Institute of Technology 35
Archiv des California Institute of Technology 11,27,34,90
British Library, London 43
Professor Stephen Hawking 63, 115, 126,129,154
NASA 76,78 (Spiralgalaxie NGC 4414, elliptische Galaxie NGC 147) 79, 121, 124
Vatikanische Museen und Galerien, Vatikan, Italien, Bridgeman Art Library 77
G. F. Benedict, McDonald Observatory (Balkenspiralgalaxie NGC 4314) 78
Jason Ware 84
Mount Wilson Observatory 85
Floyd Clark/Archiv des California Institute of Technology 91
NASA/CXC/SAO/ H. Marshall u. a. 120
Viacom Consumer Products, Star Trek. Alle Rechte vorbehalten 137, 165
Kip Thorne 141,161
Neal Shearer 155,203
Richard Dawkins 170
Filmplakat Independence Day Copyright © 2001 by 20th Century Fox. Mit freundlicher Genehmigung der 20th Century Fox Publishing Rights, eines Unternehmens der 20th Century Fox Licensing, Inc. Alle Rechte vorbehalten 177
Filmplakat E.T. Copyright © 2001 by Universal Studios. Mit freundlicher Genehmigung der Universal Studios Publishing Rights, eines Un-

ternehmens der Universal Studios Licensing, Inc. Alle Rechte vorbehalten 177

Alle anderen Abbildungen sind für dieses Buch entwickelte Originalillustrationen von Malcolm Godwin, Moonrunner Design Ltd., Großbritannien.

REGISTER

Absoluter Nullpunkt 128,210
Alpher, Ralph 86
Anfangsbedingungen 92,140f, 210
anthropische Linie 106
anthropisches Prinzip 93-95,106, 189, 204, 208, 210 (→ Evolution, biologische; Leben, intelligentes)
- schwaches 92, 94
- starkes 94
Antimaterie 86 (← Materie)
Antinomie der reinen Vernunft 42,49
Antiquarks 86 (← Quarks)
Antiteilchen 86, 153, 210, 213 (← Teilchen)
Astrologie Ulf, 130
Astronaut 32,124f (→ Schwarzes Loch)
Äther 12,14,17,210
-Theorie des 14. Atom 96, 210f
- klassisches 184
Atomkerne 86,184,188,214 (→ Kerne)
Atomphysik 185
Aufwärtsgeschwindigkeit 118f
Augustinus 43
Außerirdische 152, 167 (→ Zivilisation, fortgeschrittene)
- Ausbleiben ihres Besuches 179
- fortgeschrittener als Menschen 176f, 179
- primitiver als Menschen 176f
Axion 195f

Beobachter 29, 71, 111, 210
- auf einer → Bran 200
- durch die → Zeit zurückblickender 44,48
→ Ereignishorizont 128
- in relativer Bewegung 17,24, 116f
→ Lichtgeschwindigkeit 14
- Naturgesetze 17,19 (→ Relativitätstheorie, allgemeine)
→ Raumschiff 14
→ Schwarzes Loch 124
- Teilchenspin 131f

- Zeitmessung 117f
Beschleunigung 25,210 (→ Gravitationsfeld)
Bevölkerungswachstum, exponentielles 164-166,173
Bewegung, relative 17,24f, 116f
Bewegungsgesetze, Newtonsche 91,213
Bindungsenergie, nukleare 22
Biomorphe 170
Blase → Bran/Blase
Blauverschiebung 83f, 151,210 (→ Rotverschiebung)
Bohr, Niels 120
Boltzmann-Konstante 71,126
Bosonen 58, 60
Bran 199f, 210,213f (→ p-Bran; Schattenbran)
- l-Bran 63,197,210
- 2-Bran 63,196, 199,210
- auf der wir leben 206,208
- außerhalb der 207
- elektrische Kräfte 188
- Gravitationswirkung 189
- inflationäre Expansion 204
- Quantenschöpfung 203
→ Schwarzes Loch auf der 200f
- vierdimensionale Kugeloberfläche 188, 207 (→ Nußschale)
Bran/Blase 206f
Branen 188 (→ p-Bran)
- einander durchdringende 133
Branen-Abstand 190-192
Branen-Demokratie 62
Branwelt 191,197,199,210
- Dampfblasen-Analogie 202f
- spontane Entstehung 204
→ Universum, Ursprung 204
Branwelt-Modell 193,206-208

Casimir-Effekt 54f, 156,210,215
Cassidy, Michael 158
Cavendish-Experiment 192
Chaladnikow, Isaak 44,49

Chaostheorie 147
Chronologieschutzthese 72,158, 160, 210
Compoundkern 22f
Computer 173 (→ Intelligenz, elektronische)
- intelligentes Verhalten 173,175,178
Cosmic Background Explorer (COBE) 102f
CPU → Zentraleinheit
Crick, Francis 169
Cyberpersönlichkeit 178

Dampfblase 202f(→Bran-...)
Darwin, Charles 65
Data 137,165
Datenübertragung, künstliche 173
Dawkins, Richard 170
de-Sitter-Lösung 128 (→ Feldgleichung)
Deep Field Exploration 176 (→ Hubble-Teleskop)
Determinismus, wissenschaftlicher 112f, 124, 126, 130, 133,215
- Einschränkung 134
- Quantenversion 117,137
Dichtefluktuations 129 (→ Dichte; Energiedichte; Materiedichte; Universum, Dichte)
Dimensionen (→ Zusatzdimensionen)
- acht 96
- aufgewickelte 62f,210
- ausgedehnte 63
- drei 95f, 98
- flache 62,96,98
- neun/zehn 96
- vier 191 (→ Raumzeit)
- zehn/elf 186-188
- zwei 72
Dirac, Paul 32,51
DNS 169,210
- Aktualisierung 171
- Komplexität 169,173,175,178 (→ Komplexitätssteigerung)

Doppelinflation 95
 Doppel-Pulsare 198
 -PSR 1913+16 198f
 Doppler-Effekt 82f, 210f
 -Lichtwellen 83
 Doppler-Verschiebungen 84
 Dualität 62, 64, 211
 dunkle Materie 194-196,211
 - Indizien für 194

Enterprise 137,168f (→ Raumschiff, *Star Trek*)
 E-heterotisch 64f, 183 (→ M-Theorie)
 Einstein, Albert 12-35, 41f, 65, 67, 84, 87f, 105,119f, 131,137,147,165,210,212
 Einstein-Gleichungen 23,44, 140, 143, 146f, 151f (→Feldgleichung; Relativitätstheorie, allgemeine)
 Einstein-Rosen-Podolsky-Gedankenexperiment 132
 Einstein-Universum 158,160
 - Hintergrund für → Zeitreisen 158
 - rotierendes 158f
 elektrische Kraft 22,51,189f
 Elektrodynamik 120
 Elektromagnetismus 51,53f,58, 211
 Elektron 32,59,86,189,195,210f, 213 (← Positron)
 - Orbitale 96,188
 - unendlicher Wert 53
 Elektron-Positron-Paar 59
 Elementarteilchen 59f, 92,195,214 (→ Teilchen)
 - sehr leichte 196 (→ Axion)
 Elementarteilchentheorie 195
 Embryonenzüchtung 172,175
 Energie 20, 22f, 65 (→ Masse)
 -negative 152
 - niedrigster Zustand 53
 - null 53
 - positive 44,130,148,153
 Energiedichte 54f
 -endliche 154

-negative 152-154 (→ Zeitmaschine)
 -positive 152f
 -unendliche 152
 Energieerhaltungssatz 200, 211
 -Verstoß gegen 199f
 Energiegesamtverbrauch, weltweiter 166
 Energie-Masse-Äquivalenz 20,22f
 Energieverteilung 43 (→ Materieverteilung)
 Entropie 71,211,215
 - maximale 72
 Entwicklung, technische 166
 Erde 14,17,24,78
 - beschleunigte 25
 - entkommendes Licht 119
 - fläche 25
 - Oberfläche ohne Grenzen 91
 Erdumdrehung 15,19
 Ereignishorizont 71,119,123, 125,129f, 152,184,211 (→ Schwarzes Loch)
 - Fläche 154,206
 - schrumpfender 153f
 Euklid 27
 Evolution, biologische 65,92,169
 → Intelligenz 179
 Existenz, virtuelle 178

Feldgleichungen 119,121,128 (→Einstein-Gleichungen)
 - de-Sitter-Lösung 128
 Fermion 58,60,211
 Feynman, Richard 54, 88,91 f, 120
 Feynman-Geschichten 91,93,155 (→ Geschichten-...)
 Feynmansche Regel 94
 FitzGerald, George 14 Fluchtgeschwindigkeit 119

Galaxien 77,79, 176, 194,211 (→ Spiralgalaxie)
 - Aussehen 44

- Bildung 177,195
 - früherer Zeiten 46
 - gleichmäßig im Raum verteilte 80
 - Gravitationsanziehung zwischen 103
 - NGC4151 124
 - Rotation 196 Galaxien, ferne 29,128
 - Positionsbestimmung 79
 - Vergangenheit des → Universums 44,46,48
 Galaxien, Fortbewegung 29,83f, 203 (→ Universum, Expansion)
 -abgebrumste 103,204
 - Zentrum der Expansionsbewegung 203
 Galaxiendichte 79
 Galilei, Galileo 111
 Gammastrahlung 23,203
 Gamov, George 86
 Gedächtnisleistung, verbesserte 175
 Gehirn, menschliches
 - gentechnisch vergrößertes 175
 - Komplexität/Geschwindigkeit 175
 - Nachahmung 176,178
 - Schnittstelle zum Computer 178
 Genom, menschliches 178
 gentechnische Eingriffe 173,175
 Geschichten (→ Feynman-Geschichten; Teilchengeschichten; Universum, Geschichten)
 → Beobachter 68,128,152
 → Bran 204
 - kontinuierliche 59
 - multiple 88
 → Raumzeitkrümmung 155
 - »Summe über alle« 91 f, 155f, 158,160
 Geschichtenvielfalt 95,98
 Glatzensatz → Keine-Haare-Theorem
 Gödel, Kurt 147
 Gödelscher Unvollständigkeitsatz 147

Grassmann-Dimension 57,60
 Grassmann-Variable 57
 Gravitationsanziehung 54,124, 153
 Gravitationseffekt 54
 Gravitationsenergie 99
 Gravitationsfeld 22,24,119,126, 197, 211,214
 - Beschleunigung 24f
 - Newtonsches 26
 - Planeten im 42
 - schwaches 183
 Gravitationsgesetz, Newtonsches 22, 112,183,213
 Gravitationskollaps 120
 Gravitationskonstante, Newtonsche 71,119
 Gravitationskraft 24,26,58, 96,118, 197,200,210f, 214 (→ Supergravitationstheorie)
 - Abnahme 190,192
 - Ausbreitung 189,191,193,207 (→ Zusatzdimensionen)
 - »dunkle« Ursachen 192
 - Informationsverschlüsselung 206 (→ Holographie)
 - klassische 51
 - Messung 188
 - schwache 207
 - starke 207
 - verknüpft mit → Quantentheorie 60 (→ Quantengravitation)
 - verknüpft mit → Raumzeitkrümmung 27
 - zusätzliche 103
 Gravitationsquelle 54,104
 Gravitationswellen 197 f, 200,211
 -kurzweilige 199
 → Schwarzes Loch als Quelle 200
 Große Vereinheitlichte Theorie (GUT) 86,211
 Größenskala
 - kernphysikalische 186
 - klassische Physik 183
 Großer Endkollaps 104,211 (→ Universum, Kontraktion)
 Großer Hadronen-Speicherring 62,208

(→ Teilchenbeschleuniger)
 Grossmann, Marcel 26
 Großvaterparadoxon 144,161
 Grundzustandsenergie 54,57f, 60
 Grundzustandsfluktuation 53-55,57
 Gummituch-Analogie 42f, 153

Hadronen 86 (→ Großer Hadronen-Speicherring)
 Hartle, Jim 90
 Heisenberg, Werner 32,50f, 53,147, 212,215
 Heisenberg-Ungleichung 51 (→Unschärferelation) Hertog, Thomas 8 Hubert, David 27
 Hintergrundstrahlung, kosmische 30, 44,46,48, 86,106,128f, 208
 Holographisches Prinzip 71-73,206,212
 Horizont 71f, 123f, 126,129,154 (→Ereignishorizont; Schwarzes Loch; Zeitreisehorizont)
 - endlich erzeugter 151
 → Energiedichte, unendliche 154
 Hubble, Edwin 81,84f
 Hubble-Gesetz 85
 Hubble-Konstante 85 (→ Universum, Expansion)
 Hubble-Teleskop 77,176
 Hülse, Russell 198
 Humason, Milton 84
 Hyperinflation 101 (→ Inflation; Universum, inflationäres)

Imaginäre Zahlen → Zahlen
 imaginäre Zeit → Zeit; Universum, Geschichten
 Implantate, neuronale 175,178
 Inflation 99-101,212 (→ Doppelinflation; Universum, inflationäres)
 - als Naturgesetz 101,107
 Informationspakete 175
 Informationsspeicherung 70,135,137

Informationsverlust 137 (→ Schwarzes Loch)
 Informationsverschlüsselung 206 (→ Holographie)
 Informationsweitergabe 171
 -Aktualisierung 171
 - mit → Lichtgeschwindigkeit 176
 Intelligenz 94,111,169
 - elektronische 173,175,177f (→ Computer)
 - Grenze 175
 - menschliche 173,176,178
 - Überlebenschance 179
 Israel, Werner 120

Kant, Immanuel 40,42,49 Keil 148f
 Keine-Haare-Theorem 120,126
 Kein-Rand-Bedingung 92,94, 204, 212
 Kerne 22,86,189,210,212 (→ Atomkerne)
 - schwere 86
 Kernfusion 33,212
 Kernkraft
 - schwache 54
 - starke 54
 Kernphysik 185
 Kernreaktion 30
 Kettenreaktion, nukleare 21,23
 Klassische Theorie 51, 67f, 87,146, 152,212
 Komplexitätssteigerung 169-171,179
 → Computer 173,175
 → DNS-Molekül 169, 173,175,178
 - elektronische Schaltkreise 176
 - Gehirn, menschliches 175
 - Geschwindigkeit 175f
 - Grenze 173,175
 Kopernikus, Nikolaus 111
 Kosmische Hintergrundstrahlung 20, 44,46, 48,86, 106, 128f, 208, 212
 - Spektrum 46
 Kosmischer → String 146-149,212

- endliche Schleifen 152
 - Keil 148
 → Raumzeit um 148
 - unendlich langer 152
 kosmologische Konstante
 29,54,57, 105,147,212
 kritische Masse 23

Lamb, Charles 39
 Laplace, Pierre Simon Marquis
 de 112f, 116,133
 Leben, intelligentes 93f,
 111,169 (→ anthropisches
 Prinzip: Evolution, biologische)
 - außerirdisches 176f (→ Außerirdische)
 - Entwicklung 95f, 204
 - fortgeschritteneres 176f
 - primitiveres 176f, 179
 Lemaitre, George 30
 Leptonen 86
 Lichtäther → Äther
 Lichtbahnen 46,122,155
 - gekrümmte 29, 44 (→ Lichtstrahlen, aufeinander zu gelenkte)
 Lichtgeschwindigkeit 14,23,51,
 71, 119,143,148,152, 158
 → Beobachter 17,20
 - langsamer als 152, 158, 168
 - lokale 144
 - Messung von Unterschieden
 16
 - nahezu 19
 - relative 16
 - schneller als 159, 168
 Lichtkegel 48f, 212
 Lichtquanten 32
 - Energiegehalt 50
 Lichtstrahlen 12
 - aufeinander zu gelenkte 44,47-
 49, 123, 153
 - auseinanderlaufende 154
 → Zeitreisehorizont 150
 Lifschitz, Jewgenij 44, 49
 Lorentz, Hendrik 14,17

MACHO (massereiche
 kompakte Halo-Objekte) 195
 Magnetismus 22, 51
 Makromoleküle 169
 Manhattan Project 21,120
 Masse 212,215 (→ Relativitätstheorie)
 - fehlende 192,196
 - und Energie 20,22,27 (→ Energie-Masse-Äquivalenz)
 Masseverlust → Schwarzes
 Loch
 Materie 148 (→ dunkle Materie)
 ← Antimaterie 86
 - Anziehungseffekt 29
 - beobachtbare 192
 - körnige 184
 - quantentheoretisches Verhalten
 152
 - symmetrische Phase 146
 Materiedichte 46,48,106
 (→ Vakuumenergie)
 - unendliche 44,49 (→ Singularität)
 Materieenergie 99
 Materieverteilung 43,106,152
 Matroschka 184,207
 Maxwell, James Clerk 51,54
 Maxwell-Feld 51,212,215
 Menschen 176
 - gentechnisch veränderte 173,
 175,178
 - »veredelte« 173
 - unveränderte 173
 Michell, John 118f, 123
 Michelson, Albert 14
 Michelson-Morley-Experiment
 14
 Michelson-Morley-Interferometer
 16
 Mikrowellenfrequenzen 46f
 Mikrowellenhintergrundstrahlung
 100 (→ Kosmische Hintergrundstrahlung)
 Mikrowellenkarte 103
 Milchstraße 77f, 194
 - Durchquerung 143, 168, 179
 (→ Raumfahrt)

Mills, Robert 54
 Modell, mathematisches
 39,42,44, 51, 62, 66 (→ Theorie, wissenschaftliche)
 - eine → Bran 207
 - M-theoretisches Netz 186
 → Schwarzes Loch 135
 → Zeit, imaginäre 66f
 → Zeit und Raum 39f, 42 (→ Relativitätstheorie, allgemeine)
 Mooresches Gesetz 173,213
 Morley, Edward 14
 M-Theorie 62, 64, 96, 182f, 185,
 204, 208,213
 → Drachen« 182f, 186
 Mutationen 169

Natürliche Selektion 170
 Neutrino 195,213
 Neutron 22, 86, 184, 195,
 210,213f
 - freies 23
 - gebundenes 23
 Neutronenstern 195
 Newton, Isaac 22, 24, 40, 43,
 111f, 116, 119,137, 165, 183
 Newtonsche Physik 116, 119
 nichtgravitative Kräfte 189, 214
 Nukleare Bindungsenergie 22
 Nullgeodäte 140
 Nullpunktschwingung 53,126
 Nußschale 75,107,204 (→ Bran,
 vierdimensionale Kugelfläche)
 - fünfte Dimension 204
 - Shakespeare 77, 107
 o-heterorisch 64f, 183 (→ M-Theorie)
 Oppenheimer, Robert 120
 Parallelprozessoren 178
 p-Bran 61,133f, 210, 213 (→ Bran)
 - Durchdringung von 133
 - »effektive Theorie« 135
 - Informationsspeicherung 135,
 137
 - Strahlung 137

- Teilchenabsorption 135
 → Wellenfunktion, zukünftige
 137
 p-Branen-Modell 135,137
 Pendelschwingung 52f
 Penrose, Roger 31,49,51,
 87,90,151
 Penzias, Arno 86
 Pfadintegralmethode 91
 Photino 58
 Photoelektrischer Effekt 32, 213
 Photon 58f, 86, 213
 Physik, klassische 183, 185
 Planck, Max 32,50
 Planck-Ära 86
 Planck-Länge 184f, 207f, 213
 Plancksche Konstante 126
 Plancksches Quantenprinzip 213
 Plancksches Wirkungsquantum
 50-52, 71
 Planck-Zeit 213 Planeten
 → Gravitationsfeld 42
 - in die Sonne stürzende 96f,
 190
 - Umlaufbahnen 96,190
 Podolsky, Boris 131
 Popper, Karl 39
 Positivismus 39, 62, 67, 135,
 188, 206f, 213
 Positron 59,213f (← Elektron)
 Preskill, John 140
 Protogalaxien 176 (→ Galaxien)
 Proton 22f, 184,195
 Punktteilchen 59
 Quanten 50,213
 - diskrete 213
 Quanteneffekte 152
 Quantenelektrodynamik 113,120
 Quantenfeldtheorie 59
 Quantenfluktuation 105,146f,
 153-155,203
 Quantengravitation 51,60,
 146,213 (→ Stringtheorie)
 - und Thermodynamik 71
 → holographisches Prinzip 71
 Quantenhypothese 32, 50
 Quantenmechanik 32, 34, 114,
 212f

Quantenpendel 53
 Quantenstrahlung 128
 Quantentheoretisches Schwingungssystem 53
 Quantentheorie 32, 50, 52,
 65,105, 126,146,200
 - der Gravitation 51,146
 (→ Quantengravitation)
 → Determinismus 116
 - imaginäre Zeitrichtung 68
 - Lächerlichkeit 131
 → Maxwell-Feld 51
 → Vorhersage 53,116
 - von → Einstein abgelehnte 87
 - Unbestimmtheit 51
 Quantenzustände 152,212
 Quarks 86,184,213f (← Antiquarks)
 Quasar 86,120f, 124
 - 3C273 120

Radioquelle, quasistellare 120
 (→ Quasar)
 Radiowellen 12
 Randall, Lisa 196f
 Randall-Sundrum-Modell 197,
 199,214
 Randbedingungen 91 f, 214
 Raumfahrt 173, 178 (→ Raumschiff)
 Raumschiff (→ *Enterprise*; *Star Trek*)
 → Lichtgeschwindigkeit 14,19
 - schneller als Licht 168
 → Stern, kollabierender 125
 - Wurmlochöffnung 145
 → Zeitreisen 142
 → Zwillingenproblem 19
 Raumzeit 42, 104, 214
 - flache 57, 116f, 124, 135, 140,
 147 (← Raumzeitkrümmung)
 - höherdimensionale 186-
 188,210
 - imaginäre 68f, 71 (→ Zeit, imaginäre)
 - Informationsverlust 137
 - klassische 146f, 152
 → kosmischer Strings 152

- reale 68
 → Singularität 51
 - Unbestimmtheit, frei von 147
 - verzerrte 137
 - vierdimensionale 26, 67,117,
 187, 200,210,214 (→ Energie-Masse-Äquivalenz)
 - zeitartige Kurven 147
 → Zusatzdimensionen 187,199
 - Zylinder-Analogie 118,158
 Raumzeitfluktuationen 155 (→ Quantenfluktuationen)
 Raumzeitgeschichten,
 gekrümmte (→ Geschichten)
 - Summe über 158
 Raumzeit-Hintergrund 60,157f
 - flacher 61
 - gekrümmter 61
 Raumzeitkräuselung 103
 Raumzeitkrümmung 25f, 29, 32,
 44,47,51,65,72, 144,150,152,
 210
 - für endliche → Zeitmaschine
 152
 - globale Struktur 44
 → Materieverteilung 152
 - nicht entkommendes Licht 31 f
 → Raumschiffbewegung 142,
 144
 - Sonnenfinsternis 27
 - Sonnenmasse 29
 - Theorie 27, 147
 - von → Materie bewirkte 47,
 119, 122, 143
 - von → Zeitschleifen erzeugte
 148
 - Zeitreisemöglichkeit 148
 Raumzeitregion 31,54,119,
 147,150, 212
 → endliche 151f
 → Gravitation, starke 147
 - klassische 51
 - Rand 206
 Raumzeitsingularität 151 (→ Singularität)
 Rechenoperationen, massiv
 parallele 176f
 Relativitätstheorie, allgemeine
 12,22, 30, 34,41-44,

54, 84, 86, 117, 120, 140, 147, 183, 198, 210, 212, 214 (→ Raumzeit...)
 → Beobachter 19
 - Bestätigung 27,198
 →Geschichten, multiple 88
 →Gravitationskraft 43,51
 - Grundlage für →Zeitreisen 141,146
 - Lösung für Gleichungen 119-121 (→ Schwarzes Loch)
 → mathematisches Modell 44, 49
 - nicht mehr geltende 49, 87 (→Singularität)
 → Universum, Ursprung 29
 - unvereinbar mit → Quantentheorie 32
 →Vorhersagen 31
 → Zeit, Ende 31f,44, 124
 - Zeitmessung 143
 Relativitätstheorie, spezielle 12,22, 27, 116f, 143,147,214
 Riemann, Bernhard 26
 Rosen, Nathan 131
 Rotationsgeschwindigkeit 160
 - kritische 158,160
 Rotverschiebung 83-85,214 (→ Blauverschiebung)
 Roulette 88f
 Rückwärtslichtkegel 44,46f,49
 Ruhe, absolute 19

Sattel 9lf,196f, 214
 Schaltkreise, elektronische 176
 Schattenbran 192f, 196f (→ Bran)
 Schattengalaxie 196
 Schleife, geschlossene 157 (→Teilchengeschichten)
 Schleifen-Geschichten 156 (→Geschichten)
 Schnittstelle, biologisch-elektronische 178
 Schrödinger, Erwin 32,51
 Schrödinger-Gleichung 115f, 118,124, 126,130,133,137,214 (→Wellenfunktion)

- Vorhersagen 117
 »Schwarzer Pfannkuchen« 200
 Schwarzes Loch 31,65,118-121, 124, 151,184,195,214 (→ Ereignishorizont; Horizont)
 - Astronaut 32,124
 - aus → p-Branen zusammengesetztes 134
 - Begriffsprägung 120
 - Emission von → Gravitationswellen 200
 - Endstadium 129
 - hineinstürzende Materie 120
 - Informationsverlust im 70, 129f, 137
 - innere Zustände 206
 → Keine-Haare-Theorem 120, 126
 - kugelförmiges 119
 - Masseverlust 129f, 152,200, 203
 - nicht entkommendes Licht 122 (→ Teilchenpaar, virtuelles)
 - nicht vollkommen schwarz 200
 - Rand 123,211
 - Rotationsgeschwindigkeit 126
 - schrumpfendes 129
 -Schwarzschild-Typ 119
 - Sonnenmassen 128
 → Strahlung 126,132,152,203
 -Temperatur 126,128
 - verdunstendes 203
 -Verdunstung 154
 - vollständiges Verschwinden 130
 → Zeit, Ende 31 f
 Schwarzlochentropie 70-72 (→ Entropie)
 Schwarzschild, Karl 119,121
 Schwarzschild-Lösung 119
 Schwerkraft → Gravitation
 Schwinger, Julian 54
 Shearer, Neel 8
 Singularität 44,49,51,69,122-124, 151,211,214(→ Urknall-Singularität)
 - Dichte, unendliche 44,49
 - nackte 140,213
 - Nähe 51

Singularitätstheorem 51,214
 Slipher, Vesto 81,84
 Sondenteilchen 187
 Sonne 124, 190
 - als → Schwarzes Loch 124
 - entkommendes Licht 119
 Sonnenfinsternis 27,29,214
 Sonnenmasse, doppelte 121f
 Sonnenradius 198
 Sonnensystem 117,177
 Spin 214f (→ Teilchenspin)
 - entgegengesetzter 131f
 - ganzzahliger 58
 - halbzahliger 58
 Spiralgalaxie 77,195
 NGC3198 194
 - NGC4414 78
StarTrek 24, 77, 165-168,173, 175, 179 (→ *Enterprise*, Raumschiff)
 - unveränderte Menschen 173
 Stationärer Zustand 165,169
 Stern 42, 77, 80f, 86, 93
 - ausgebrannter 104
 - dunkler 119,123 (→ Schwarzes Loch)
 - entkommendes Licht 118
 - ewig existierender 81
 - gewöhnlicher 195
 →Gravitationsfeld 121
 - Kollaps 33,122,125
 - kritischer Radius 123,125
 - massereicher 42,119f, 122
 → Raumzeitkrümmung 33
 - Rotationsgeschwindigkeit 194
 - schrumpfender 31,123,125
 - stabiler 122
 → Urknall 84
 - Verteilung sichtbarer Sterne 194
 - Wärmeverlust 122
 Sternensystem 177
 Strahlenblitz 154f
 Strahlung 32,46f, 129,214 (→ Mikrowellenstrahlung)
 - »dunkle« 200
 - elektromagnetische 52,210
 - Energieentzug 129
 → Schwarzes Loch 126,132,

152,203
 String 62,210,214
 - eindimensionaler 60
 - Kräuselungen 60
 - Zeitrichtung 148
 Strings, kosmische → Kosmischer String
 Stringschleife, geschlossene 60, 134
 Stringschwingung 60
 Stringtheorie 60,147,210,214
 - keine →Unendlichkeiten 65
 - supersymmetrische 60 (→ Superstringtheorie)
 String-Weltfläche 59
 Strominger, Andrew 134
 Summe über alle Geschichten → Geschichten
 Sundrum, Raman 196f
 Supergravitationstheorie 57,60,65,214
 - supersymmetrische 60
 - zehn-/elfdimensionale 62, 64,183
 Supernova 106
 »Superpartner« 57f
 Superstringtheorie 60, 65
 - fünf verschiedene 60f, 64f
 →»Theorie für Alles« 60
 Supersymmetrie 57,106,214
 Supraleitender Superbeschleuniger 208
 Symmetrie 57
 Taylor, Joseph 198
 Teilchen 112,210s (← Antiteilchen;
 → Elementarteilchen)
 - auf → Lichtgeschwindigkeit beschleunigtes 20
 - eindimensionale → Strings 59
 - energiereiche 186f
 - nulldimensionale Punkte 59
 - Partnerteilchen 57
 - Position/Geschwindigkeit 50f, 113f (→ Unschärferelation)
 - Verhaltensmodelle 59
 - Vernichtung 153
 - virtuelle 126 (→ Schwarzes Loch)

Teilchenbeschleuniger 188,208,215 (→ Großer Hadronen-Speicherring)
 - größer als Durchmesser des Sonnensystems 186
 - zukünftige 207
 Teilchendetektor 156
 Teilchengeschichten
 - geschlossene Schleifen 156f
 -Summeüber 155f, 158(->Geschichten)
 Teilchenpaar, virtuelles 127, 130, 135, 153f,215 (→ Schwarzes Loch)
 - »eingefrorenes« 154
 - emittiertes 126f, 130,132
 - hineinfalles 127,130,133f
 Teilchenspin 56f, 131f
 »Theorie für Alles« 7,60
 Theorie, wissenschaftliche 39 (→ Klassische Theorie; Modell, mathematisches; Positivismus)
 - allumfassende 7,60,88
 - der »verborgenen Variablen« 115
 - endgültige 168,188
 - grobvereinheitlichte 86,164, 183,185
 → Modell, mathematisches 39
 → Raumzeitkrümmung 27 (→ Relativitätstheorie, allgemeine)
 - semiklassische 146,152
 - teilchenphysikalische 148
 Thermodynamik 71,215 (Energieerhaltungssatz; Entropie)
 Thorne Kip 140f, 152,160f
 Tomonaga, Shinichiro 54
 Totpunkt 117
 Townsend, Paul 61,63
 TypI 64f, 183
 TypIIA 64f, 183
 TypIIB 64f, 183

Uhr 14

- im Flugzeug 17
 - universelle 210

Unbestimmtheit 115
 Unendlichkeit 40,54,57, 119,123,151
 - Eliminierung 54, 57f, 60
 - Randbedingungen 91 f
 Universum
 - Abkühlung 86,146
 - als Casino 87f
 - beobachtetes 49 (→ Beobachter)
 - Dichte 29, 44, 86f, 104
 - Ende 104
 - Erschaffung 44
 - ewig existierendes 29
 - Grenze 88
 - GröÙe Null 69
 - in der → Zeit sich verändern- des 79
 - in sich geschlossenes 93, 95
 - Kontraktion 29f,44,158
 → Leben, intelligentes 189
 - offenes 95
 - Randbedingungen 88,90,93 (→ Kein-Rand-Bedingung)
 - statisches 27,29,79,81
 - transparentes 176
 - unendliches 77,79,81,158
 - Ursprung 29, 32, 69, 84,204, 207
 - vollständige Beschreibung 12
 Universum, Anfang 31,84,87,94,100
 - Beweis für 90
 - in imaginärer → Zeit 69, 71
 -mit → Urknall 31,86f
 Universum, Expansion 29,31, 44, 83, 95,107,146,158, 160, 212,215 (→Galaxien, Fortbewegung)
 - Beschleunigung 104
 - ewige 95
 - Geschwindigkeit 85,98,128
 - gleichförmige 30
 - in imaginärer → Zeit 69
 -Verlangsamung 101
 - zu rasche 1290
 Universum, frühes 100,128, 146, 212 (→ Urknall)
 - dichtes, heißes 86,146,212

Universum, Geschichten 88,90, 92,98
 - Ende 103
 - geschlossene Flächen 93
 - glatte 102
 - in → imaginärer Zeit 66,91-93, 98, 100,107,204
 - in reeller → Zeit 66,91,98,101, 103,107,204
 - Kugel-Analogie 100f
 - ohne Unbestimmtheit 146
 - (un)wahrscheinliche 102
 Universum, inflationäres 99-103, 128, 176
 (→Doppelinflation)
 Unschärferelation 50,87,102, 113, 115,126,133,146f, 152, 203,212,215
 -Verletzung 52,126
 Unvollständigkeitsatz 147
 Uran 22f
 Urknall 29f, 32, 88, 94,176,215
 (→ Universum, Anfang)
 - 2,7-Grad-Strahlung 128
 - Kollision zwischen →Branen 207
 Urknall-Modell 86,100,214
 Urknall-Singularität 48,86

Vafa, Cumrun 134
 Vakuumenergie 85,104-107,215
 (→ Materiedichte)
 Vakuumfluktuation 126
 Vereinheitlichter Theoretischer Rahmen 64,183,215
 Vergangenheit
 - birnenförmige 49
 - unendliche 44
 virtuelles Teilchen
 →Teilchenpaar, virtuelles
 Vorhersage 31,39,112,130, 133
 - Beobachtung, Übereinstimmung 39
 - zukünftiger →Wellenfunktion 116f, 124,132,137

Wachstum, exponentielles
 →Computer 173-175
 - DNS-Komplexität 169
 (→DNS-Molekül)
 - Energieverbrauch 166f
 - Weltbevölkerung 164-166
 - wissenschaftliche Artikel 166f
 Wahrscheinlichkeitsverteilung 53
 - Teilchengeschwindigkeit 114f
 Wärmestrahlung 129f
 Watson, James 169
 Wechselwirkung 54,59
 Wechselwirkungspunkt 59
 Weißer Zwerg 195
 Wellenfunktion 114f, 126,129f, 132, 215
 - deterministische Entwicklung 117f
 - Messung 133
 - rückwärts entwickelte 130
 - Verlust eines Teils 130f (→ Schwarzes Loch, Informationsverlust)
 - Vorhersage zukünftiger 116f, 124, 132,137
 Wellenlänge 52,82,210,215
 - hochfrequente 50
 - niederfrequente 50
 - Platten 55
 - rote 83 (→Rotverschiebung)
 Wellenzug 114f
 Weltbevölkerung 167
 Weltformel 7, 183
 Weltlinie 67
 Wheeler, John 91,120f
 Wilson, Robert 86
 WIMPS (schwach wechselwirkende massereiche Teilchen) 194f
 Wurmloch 118,141
 - flaches 144
 - Pistolenkugel 146
 → Raumschiff 143

Yang, Chen Ning 54
 Yang-Mills-Theorie 54,57,215

Zahlen
 - imaginäre 65-67
 - positive reelle 67
 Zeit (→Beobachter; Raumzeit)
 - absolute 19,22, 116f, 119,210, 213
 - Alltagsbegriff der 116
 - als Eisenbahngleis 38-40
 - anwachsende 118
 - fluktuierende 146
 - Form 41,43
 - konstante 124, 128
 - mit Raum verknüpfte 41
 - Newtons 40,43
 - persönliche 22
 - reale 68,71,90
 - Richtung 41
 - stillstehende 117 (→ Zeit, Ende)
 - unabhängige 43
 - unbestimmte 146
 - Verlust eines Teils 130f (→ Schwarzes Loch, Informationsverlust)
 - vom Raum getrennte 40
 Zeit, Anfang 31f, 39, 43f, 49, 51, 84
 - im →Urknall 49, 84
 -Vorhersage 44
 Zeit, Ende 31f, 39,43f,49,51, 71, 124
 - Platten 55
 - rote 83 (→Rotverschiebung)
 Zeit, Form 41,43,68
 - birnenförmige 49
 Zeit, imaginäre 65-68, 90, 92, 212 (→ Geschichte des Universums; Universum, Anfang; Zeitrichtung)
 - Breitengrade 69, 71
 - Zunahme 69,71
 Zeit-Abstand-Diagramm 124
 Zeitmaschine 150
 - endliche 150,152f
 - endlose 151
 Zeitrand 90
 Zeitreise 159,161,215
 - als praktische Möglichkeit 141
 - auf zweiter Ebene 146
 - Gefahr von 152

- in die Vergangenheit 72,144, 152, 156
 - makroskopische
 -mikroskopische 155,157
 - Unmöglichkeit 147,154
 Zeitreishorizont 150f, 155
 Zeitrichtung 68
 - Erdkugel-Analogie 69
 - imaginäre 68f
 Zeitschleife 146-148, 150-152, 159f, 215
 -makroskopische 157
 - Reise in die Vergangenheit 148,156
 Zentraleinheit (CPU) 174, 176
 Zivilisation, fortgeschrittene 150f, 154
 Zukunft 183
 - Besucher aus der 150
 (→Zivilisation, fortgeschrittene)
 - *Star-Trek*-Vision 167
 - unendliche 44
 Zusatzdimensionen 62,133, 186, 189, 196f, 201 (→ Dimensionen)
 - extrem gekrümmte 196,200
 -Gravitationsausbreitung 189, 191, 193,197,207 (→ Gravitation)
 - »Nachweis« 203
 - sehr kleine 188
 - sichtbare 200
 - unendlich ausgedehnte 188, 196, 199
 - zwischen den → Branen 196
 Zwillingenproblem 17, 19,144

IMPRESSUM

Die Originalausgabe erscheint im Herbst 2001 unter dem Titel »The Universe in a Nutshell« im Verlag Bantam Books, New York.

Der Verlag dankt Markus Pössel vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik für seine engagierte Hilfe bei der Übersetzung des Buches.

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schluck GmbH, 30827 Garbsen.

1. Auflage 2001
 Copyright
 © 2001 by Stephen Hawking
 Originalillustrationen
 © 2001 by Moonrunner Design Ltd. UK and The Book Laboratory' Inc.
 Für die deutschsprachige Ausgabe
 Copyright
 © 2001 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg
www.hoffmann-und-campe.de

Schutzumschlaggestaltung:
 Katja Maasböl

Illustration:
 Malcolm Godwin, Moonrunner Design Ltd., Großbritannien

Satz und Aufbau:
 Prill Partners I producing, Berlin

Druck und Bindung:
 MOHN Media • Mohndruck GmbH, Gütersloh
 Printed in Germany
 ISBN 3-455-09345-0